




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2771/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2771/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2771/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2771/A



2771/A

no. 152

N. XIV  
16/8

13

coll.  
d.

16/8

16/8

16/8

16/8

16/8

16/8




152. GESNER, C. *Historia plantarum et vires ex Dioscoride, Paulo Aegineta, Theophrasto, Plinio et recentioribus Graecis*. 8 leaves, 262 pp. Printer's device. 12mo. Half calf. Paris, Richardus, 1541.

Frs. 35.—

Pritzel 3297. Second edition published in the same year as the Basel first edition of this important botanical work. Gesner's *historia plantarum* is a student's handbook of botany, giving the genera in alphabetic order—a sort of pocket dictionary of plants.—First and last leaves waterstained, small hole in the margin of the first leaf, otherwise a good copy. — Rare.







46989  
Nem. 194.

**HISTORIA PLAN-  
TARVM ET VIRES EX  
DIOSCORIDE, PAVLO AEGI-  
META, Theophrasto, Plinio, & recetio-  
ribus Græcis, iuxta elementorū ordinē.**

**PER CONRADVM GES-  
nerum Tigurinum.**

Adiecta ad marginē nomenclatura, qua  
singulas herbas officinæ, herbarij, &  
vulgus Gallicum efferre solent.



**PARISIIS**  
**Apud Guilielmum Richardum sub pingui**  
**gallina.**

1541



# HENRICO BILLINGO

Corradus Gesnerus.

S. D.

E  
GO QV IDEM satis gna-  
rus, Henrice charissimè, in  
quibus quantisq; negotiorū  
hoc imprimis tempore ver-  
seris, haud temperare tamē  
mihi potui, quin qualicunq; tandem indicio  
meum in te amorē, qui haftenus pectore la-  
tuit, palām profiterer. Quod cū in praesentia  
qua fieret alia ratione non haberē, quod ha-  
bui solum, superioribus diebus plantarū mi-  
hi congestam historiam ad te mittere volui.  
Acquisimū enim tibi vt ascriberetur existi-  
maui, non modò tuorū erga me officiorum  
nomine, quāuis id maxime; sed etiam quod  
cum studiosorum omniū amator & admira-  
tor sis vnicus, occasionem tibi quoq; sine me-  
liorum literarum lectione vllam effluere nō  
patiaris, comprimis quidem sacrarum, post  
quas, vt nec alios bonos authores, ita neque  
medicos inspicere aliquando piget. Accessit  
alia causa hāc tibi nuncupandi, vt si luctu ni-  
mio premerēre tristioris fortis, qua te tuosq;  
per familiq; vestre funera nuper exerceri Deo  
visum est, iucūdiore hoc, si possem, argumē-  
to, inde auocarem. Huc facit etiam fortuna  
tua (quam hīc non vt vulgus, sed prouidētia



10  
diuinæ œconomam, seu promā condāmque  
accipio) quę cū tibi hortos & prædia donaue  
rit amplissima, simul agriculturæ & planta  
rum studiū iniecit, quo quidē ipso inter ne  
gotiosa huius vitę studia, vix dici vllū potest  
bonis viris coniunctius familiariūsq;. Philo  
sophi quidem inter alia liberalisanimi signa  
recēsent, animalibus delectari, præcipuē pul  
chri quippiā mirandīq; habentibus, idq; iu  
cunditatis solum gratia. Ego verò longē ma  
gis collaudauerim, qui pulcherrimis plantis  
ac peregrinis oblectantur. Nam & liberalitas  
in huiusmodi existit, qui dum non suæ, sed  
cōmunis vtilitatis rationem habent, sumpti  
bus nullis parcunt, vndecūq; terrarum plan  
tis peregrinis, pulchris, admirandis, iucūdis,  
salubribus, arboribus, fruticibus herbis ex a  
lieno orbe magno studio, magnis sumptibus  
conquisitis, ornādo ditandōque nostrū. Sed  
iam nostrę plantarū historiæ, vel potius tuę,  
rationē tibi explicabo. Cū superioribus men  
sibus suauissimā patriam Tigurū inuisssem,  
salutandi gratia semel atq; iterū doctissimū  
virū Christophorum Clauerū vrbis nostrę  
archiatrum accessi. is cum varia colloquenti  
bus nobis, medicinæ studiosis rem vtilem fa  
cturū diceret, si quis simplicium medicami  
num ē Dioscoride quidem descriptiones, fa  
cultates autē ex Aegineta cōscriberet: placuit  
mibi tum id cōsiliū, & iam prius in mentem

A ii



sæpe venerat. Mox igitur non hoc solû præ-  
stare conatus sum, sed ordinẽ alphabeti secu-  
tus, reliqua etiam Simplicia adieci, quę Dio-  
scoridi omiſsa in frequẽti sunt ac celebri hu-  
ius temporis medicorum vſu, barbaris mon-  
strata primũ, & à recentioribus Gręcis in ſuã  
linguã transfuſa, à quibus ego huc transcrip-  
ſi, doctiſſimi viri Ruellii interpretatione  
plerunq; vſus. Fuit autem præcipuũ ſcribendi  
inſtitutũ, vt ſtudioſi medicinæ enchiridion  
haberent circumlatu facillimum, etiam ruri,  
Dioscoride quem antehac circũferebant, bre-  
uius, melius, locupletius, & quoniam ordina-  
tim ſcriptum commodius, laborioſo inquire-  
di tædio vacans, mole nulla, nõ omiſſis mul-  
tis aliis præclaris apud Arabes medicinis ſim-  
plicibus. Melius autẽ dixi, quod ex Agineta  
plerunq; (qui Galeni compendiũ eſt, aut vt  
alii loquuntur, ſimia) nonnunquam ex ipſo  
Galeno, aut Aëtio facultates aſcripſerim in  
genere primas, ſecundas, & tertias, vt illi vel  
omnes vel aliquas tantum memorauerunt.  
Hoc autẽ, priores dico & vniuerſales ceu par-  
ticulariũ virtutum fontes quosdam deſcribe-  
re, rationalis tãtum artificis eſt: particulares  
verò tradere, magis empirici. Præterea ex his  
quidem generalia inuenire difficillimũ: ex  
generalibus verò alias omnes inde manan-  
tes, cuius exercitato in Galeni methodo fa-  
cile fuerit. Porro hic ſolum plantarum hi-



storiā mitto, vt quā minimū sit enchi-  
ridion, & ruri prācipuē commodissimū. Mit-  
tam proximis diebus reliqua etiam, quę prę-  
ter plātas sunt simplicia. in Marginibus Ger-  
manica, sicut Græca, non addidi, quod aliū,  
vt nosti, ex professo scripserim librum de plan-  
tarum nomenclaturis, nostra, Gallorū, Græ-  
corum, & Romanorū linguis, sed nudis no-  
minibus absq; viriū & ipsarum descriptionis  
historia. Liberet de aliis pluribus in primis  
vero pulcherrimi liberalissimiq; plantarum  
studii laudibus te affari, nisi vitio mihi dan-  
dum metuerē, quod breui libello promisso  
longiorem quā pro eius portione, neq; de  
necessariis rebus epistolam pręfixissem: quā-  
obrē nihil amplius addam, quā vt animo,  
quo soles omnia, candidissimo his acceptis  
a Conrado tuo mortaliū omnium tui aman-  
tissimo, maiora in posterū expectes. Vale.  
Christus Opt. Max. te cum grauissimo viro  
patre tuo in Reipub. & bonorum studiorum  
salutem, incolumem quā diutissimē tuca-  
tur. Iterum vale. Lausannæ. ix. Augusti.

A iii



# INDEX.

## A

<b>A</b> Gasyllis	14.28	Balsamum	33.6
Agnus	256.24	Barbula hirci	34.25
Alcibiadiōi	17.23	Barba senilis	10.22
Alus	228.12	Bathypicron	2.6
Amaracus	180.29	Bdellium	34.29
Amaranton	91.20	Bellis	35.15
Anchusa	139.6. & seq.	Bellius	ibidem
Anarrhinon	22.5	Beta	35.18
Anaxyris	131.24	Betula	36.14
ἀνδραχυνάγρια	1125.8	Betonica	35.28
Anthericon	114.27	Blattaria	39.27
Antirrhinon	22.5	Blitum	37.2
Anthyllion	13.23	Boleti	37.4
Antimalum	147.11	Botrys	37.16
Apiastrum	22.29	Bolchon	34.29
Arrhenogonum	187.21	Brassica	37.18
Aronia	151.16	Brassica	23.31
Arcturon	25.10	Bryon	56.10, & 158.13
Ascyroides	28.18	Bryonia	257.8
Asparagus	29.19	Brytanica	38.16
Astragalus	30.18	Bucheides	216.29
Atractylis	30.29	Bucinus	85.22
Attriplex	31.	Buglossus	38.22
Auena	31.10	Bulbina	39.2
		Bulbus esculentus	39.10
		Bulbus vomitorius	39.15
<b>B</b> Accharis	32.5	Balapathum	38.29
Ballote	32.26	Bunium	39.22
Balaustium	32.18		



# INDEX

Buphtalmon	40.6	Centunculus	71.6
Bupleurum	40.14	Chamaeacte	212.26
Buselinum	41.3	Chamecissō, 57.6.64.14	
Butomus	40.21	Chamaedrys	57.21.
Buxus	41.6	& 252.7	
C			
Acacia	41.11	Characias	246.13
Cactus	41.22	Chironium	91.19
Calamintha	42.17	Chrysanthemon, ibidē	
Calamus odoratus,	41.23	Chrysolachanos	31.7
Calathiana	42.1	Cibotium	96.23
Calcifraga	42.9	Cici	205.29
Cachla	40.6	Cichorion	60.27
Caltha	41.10.61.13	Circæa	147.13
Calthula	42.17	Citharon	69.13
Calyx	17.17	Cissaron	69.12
Cammoron	5.21	Cissanthemon	64.4
Cancamon.	43.21	Cissophyllon, ibidem	
Canaria	43.6	Clematitis	27.16
Cannabis	43.16	Colocynthis	65.9
Canna Indica	51.3	Coris	78.12
Canopon	44.11	Coriandrum	78.2
Cantabrica	44.12	Cornus	78.20
Caphura	44.20	Conferua	77.6
Cardamina	230.3	Confiligo	77.12
Carnabum	27.2	Conuoluolus	77.24
Carnabadium	ibidem	Conyza	77.28
Cassitas	51.22	Corianum	78.2
Cedria	52.29	Coronopus	79.1
Cedrides	53.9	Corruda	29.21
		Costus	29.8



# INDEX

Cotonea	80.1	Daucus	84.20
Crataegonum	80.4	Dictamnus	85.25
Crithmum	80.13	Delphinium	85.11
Crocodilion	82.28	Dicoccos	261.1
Crocus	81.7	Diospyros, vel diosporos.	
Cromphena	229.15	86.14	261.1
Croton	205.29	Dipsacus	86.17
Cucurbita	81.1	Dodecatheos	86.30
Cucumis	81.4	Dolichi	186.25
Cuminum	83.4	Donax	114.15
Cunila	77.28	Dorias	90.17
& 84.6, 170.7		Dorycnion	87.5
Cunilago	77.28	Dorypetron	136.6
Cupressus	83.27	Draba	25.1, & 87.23
Cymbalion	258.20	Dracunculus	87.31
Cynocrabe	23.21, & 67.1	Dryophonium	88.16
Cynoctionon	6.2	Dryopteris	88.25
Cynomoron	24.2	Dulcis radix	89.1
Cynosarchis	169.5	E	
Cyparissias	246.10	EBenus	89.14
Cytinus	69.20	Ebulus	212.3
D		Elate	91.9, & 175.20
DAcylitis	27.9	Elaterium	81.20
Damascena	197.30	Elelisphacon	212.8
Damasonio	10.23, & 85.1	Eleophyllum	187.15
Daphnitis	50.17, ziger	Eruca sylvestris	95.27
cognomine	cod.	Erysifceptron	29.6
Daphnoides	70.23,	Erytranon	69.23
& 77.30		Erytrodanum	208.1
Darca	50.23	Erythros	205.12



# INDEX

Erythronium	ccxv. xxvi	Incana	cxxv. xx
F		Irio	cxxvi. xiii
Faba pontica	xcix. xi	Iucus Babylonius, 128. 28	
Fœniculum sylvestre.		Ixia	lvii. xxv
cii. xiii		L	
Fumaria	xlvi. xix	L Achryma Aethiopica,	
G		cxvi. vi	
Ethyllis	cviii. xx	Lactoris	cxxix. xviii
Gethyon	cviii. vi	Lapathum	cxxxi. xxiii
Gladiolus	cx. vii	Lasfer	cxxxii. xii
Glandes Iouis,	cx. xxiii	Lepidion	cix. xiiii
Glycyfide	clxxiii. xviii	Leontice	xli. xi
Gnochiles	xvii. xxiii	Licéron	cxxxvi. vi
Gordylon,	cxxiii. xviii	Ligustrum	cxl. xvi
H		Lilia	cxl. vii
Halicacabō, ccxxxiii. 3		Limnesion	liiii. x
Hedysaron,	ccxxi. ii	Limonion	cxli. v
Helitropion	cxvi. xiii	Lingua	cxli. xix
Helioscopius,	ccxvi. ix	Linozostis	cli. i
Helix	cxv. viii	Linum	cxli. xvi
Hemionium,	xxix. xxix	Lithospermon	cxlii. v
Heraclea	ccxxvii. vi	Lolium	cxlii. xviii
Heraclia	cxvii. viii	Lonchitis	cxlii. xxi
Herba pedicularis 237. 11		Lopima	cx. xxiii
Hippuris	xciii. xxiii	Lotus	cxliii. viii
Holoscœnos,	cxxviii. x	Lupinus sativus	cxliii. x
Hypocistis	lxix. xxiii	Lupha	xxvii. xxii
I		Lupus salicarius, 144. 20	
I Biscus	xxx. xx	Lutea	cxlv. vi
Illecebra	ccxxv. viii	Lycotanon	viii. ii



# INDEX

Lychnis sylvest.	137.25	Melittana	xxii, xxviii
Lychnitis	cclv. xvi	Mentha	cl. xx
Lygos	ccclvi. xxxiii	Menthastrum	ibidem
Lyfimachia	cxli. xx	Menthastra,	xlii, xxiii
Lythron	ibidem.	Meon	clii, i
M		Mespilus	cli. xvi
M Acer	cxlv, xii	Millefolium	cliii, xiii
Macheronion,	cx. vii	Milium	cliii. i
Machis	clviii. ii	Milium Indicum,	ibide
Madelcon	xxxiii, xxx	Miliaria herba	clii, xxv
Magudaris	cxiii, xxiii	Myos ota	xiii, xxiii
Malabathrum	cxlv, xx	Mioctonum	v. xxi
Malumpunicū,	cxcix, xvi	Mithridation	clvi, xi
Mala, 146, 23, pfica,	184	Mollugo	clvii, vi
Malacocissus	cxlvi, ix	Moly	clii, xxiii. ccx, vi
Malua	cxlvi, xiii		clvi, xxi
Mamiras	cxlvii. vi	Molybdæna	clvii, i
Manna thuris	ccxliii, v	Morus	clvii, vii
Mandragora	cxlvii, xi	Moschocaryon	clvii, xvi
Marrubium	cxlix, i	Mosyliti	lxv, vi
Marrubiū nigrum,	32.26	Muris auricula	xxxi, xxi
Marum	cxlix, xii	Muscus	clviii, xiii
Mastiche	cxixv, viii	Muscus marinus,	ibidem
Maspeton	cxixii. viii	Myagrus	clii, x
Medica	cxlix, xx	Myles	clii, xxi
Medion	cl. i	Myosotis	xxi.
Melampodion,	ccliiii. x	Myrsinoides	lxx, xxiii
Melampus	codem	Myrrha	cliii, iii
Melampyron	clii. x	Myrica	cliii, xx
Melissophyllō,	xxii, xxix	Myristica	clvii, xxiii



# INDEX

Myriophyllum	cliii,xiii	Oenanthe	clxv,xix
Myrepfica	clvii,xviii	Olea,	clxvi,i
Myrsinites	ccxvi,viii	Ocimastrum	clxiii,xxvi
Myrtacantha	ccix,xiii	Onagra	clxvi,xxi
Myrtidanum,	clv,xxiii	Onitis	clxx,xii
Myrrhis	clv,xv	Onobrychis	clxvi,xxx
Myrt <sup>o</sup> sylvestris	ccix,xiii	Onoclia	xvii,xviii
Myrtus sativa	clv,xxi	Ononis	xx,xxvi
Myxa	clvi,xiii	Onosma	clxvii,viii
N			
Nacaphthum	clix,iii	Onothera	clxvi,xxi
Napi	158,26.&229,19	Onuris	ibidem
Narcaphthum	clix,iii	Ophioscorodon	xi,xxvi
Narcissus	clix.xi	Opium	cluvii,viii
Nardus	clix,xxiii	Opopanax	clxvi,xii
Nardū sylvestre	xxviii.vi	Opulus	clxviii,xxv
Nastos	cxiii,i	Oreoselinum	clxix,xxvi
Nasturtium	clx,ix	Origanum	clxx,viii
Nepa	ccxx,iii	Ornithogalum	clxxi,xii
Nepeta	xlii,xx	Orneoglosson	clxxi,i
Nerion	clxii,xvi	Ornus	clxxi,xx
Nigella	clxii,xxviii	Orobanche	clxxii,xiii
Nux Indica	clxiii,xi	Oryza	clxx,xxvi
pontica	cxxxv.viii	Osiris	clxxii,xxiii
Nuces anellanae	163,23	Osteocollon	clxxiii,i
iuglandes	ibidem	Othonna	clxxiii,x
Nymphæa	clxii,xxvii	Oxalis	cxxxiii,xxiii
O			
Ocimum	clxv,iii	Oxya	clxxiii,xxx
Ocimoides,	clxiii,25	Oxys	clxxiii,xviii
		Oxylapathū	cxxxix,xix
		Oxymyr sine	ccix,xiii



# INDEX

P			
<b>P</b>			
Aederota	3.30	Periclymenon	181.19
Pæonja	174.18	Peristereon	183.7
Paliurus	175.11	& 211.18	
Palma	175.20	Persea	183.17
Panacea	139.29	Perficæ	183.29
Panaces Asclepiō	177.18	Persion	235.13
Heraclion	170.18	Personata	184.4
Panaces	177	Pes gallinaceus	45.29
heracleum	176	miltinus	114.11
Pancratium	178.10	Petasites	184.14
Panicum	178.16	Petilius	184.21
Papauer	178.20	Peroselinum	184.30
Papyrus	180.20	Peuce	129.1
Pardalianches	5.10	Pencedanum	185.9
Paralius	146.9	Phalangium	186.6
Paronychia	180.23	Phalangites	ibidē
Partheniō	117.8 & 180.2	Phalaris	186.17
Pastinacia	181.4	Phascon	56.10
Pecten	228.18	Phasgonon	110.7
Pelecinus	221.2	Phaselli	186.25
Pepanus	199.7	Phasiolon	127.21
Pep'ion	381.18	Phasioli	186.25
Peplis	181.17	Phellandrium	187.3
Peplos	181.28	Philetæria	194.13
Pentameron	174.28	Phlomides	255.15
Pentoboron	174.18	Phloon	188.4
Pepon	182.9	Phlox & phlogion	219
Perdicium	117.8	Phlum	188.13
Pericarpum	181.14	Phoenix	175.20
		Phormio	183.22



# INDEX

Phragmites, seu uallato- ria 114.15	Polygonoides 70.25
Phu 189.7	Popul <sup>a</sup> alba nigra 196.10
Phyllitis 187.6	Porrum 196.17
Phyllum 187.15	Portulaca syluest. 181.18
Phyrama 15.4	Poterium 196.2
Phyteuma 187.29	Pothos 107.1
Picea 189.23	Potamogeton 196.24
Picris 222.24	Prunum 197.24
Pinus 189.24	Pfura 198.6
Piper 200.14	Psyllion 198.10
Pisum 202.19	Ptarmica 198.19
Pistacia 202.7	Pulegium 198.30
Pistolochia 202.14	Pulmonaria 199.7
Pithyantes 7.4	Pycnocomon 200.60
Pityides 200.3	Pyrethrum 201.22
Pityusa 193.4	Pyrina 7.3
Plantago 193.13	Pyrum 202.3
Platanus 194.4.	<b>Q</b> <b>Q</b>
Platyphyllos 96.24	Vercus 200.1
247.28	Quinquefolium 199.18
Plumbago 157.1	<b>R</b>
Polemonia 194.13	R Adicula 200.18
Polium 195.28	R Radix 200.22
Polycnemon 194.23	Ranunculus 201.12
Polygonatū 195.4	Rapum 201.30
Polygonium 173.3	Resina liquida 202.14
Polygonū 195.19, 213.18	Rha 204.1.18
Polygala 194.29	Rhamnus 204.11
Polytrichon 195.26	Raphanus 206.23
	Rhaponticum 204.18



# INDEX

Rheum	ibidem	Satureia	ccxvii.iiij
Rhæas xx.xx & clxxvii.		Satyrium	ccxv.xix
xxvii.		Satyrium basilicū	ccxvi.iii
Rhodia radix	ccv.v	Saxiphraga, seu saxiphra-	
Rhododendron	clxii.xv	gos	ccxvi.xviii
Rhus	ccv.xii	Scammonia	ccxvii.xix
Recinus	ccv.xix	Scandix	ccxviii.xxi
Rodora	ccvi.i	Seissima	clxxiii.i
Rosa	cclxxvi	Scorpius	ccxx.iiii
Rosmarinus	cclx.xix	Scorpioides	ccxix,xxviii
& cclxx.xxix		Scorpiurum	cxvi.xv
Rubus canis	ccviii.xvii	Scolopēdriō	xxix,xxviii
Rubus, Idæus	ibidem	Scolymon	xlvi,xi
Ruscus	ccix.xiii	Scopa regia	ccxviii,xxix
S		Scordium	ccxix,xiii
Abina	ccxi.i	Scorodoprasum	ccxx,xvi
Sacra herba	ccxi.x	Scylla	ccxviii,xxvi
Sagapenum	ccxi.vii	Secale	ccxx.xxv
Saliunca	clx.xxx	Securidaca	ccxxi,ii
Salix	ccxii.i	Selago	ccxxi,xii
Saluio	ccxii.viii	Semperuiuum	ccxxi,xvi
Sambucus	ccxii.i	Seuocio	ccxxii,xiii
Samsuchus	ccxiii.vii	Serapias	clxix,xiii
Sanguinaria	ccxiii,xviii	Serpillum	ccxxiii,ii
Santalum	cuxiii,v	Seris lx, 27, ccxxii, xxiii	
Santonium absinthium		Sertula campana	cl,xiii
cc-xxiii		Sesama	ccxxiii,xviii
Sarcocolla	ccxiii,xxv	Sesamoides	ibidem
Sardoa vel sardonias		Seseli creticum	ccxxiii,
ccxv.iii.		xiii,	



# INDEX

māssiliense	ibidem	Stachys	ccxxxvi, xxvii
Seutlomalachō	ccxxv, xii	Staphis agria	ccxxx, xi
Side	ccxxvi, x	Staphyodendros	237, 6
Sideritis	ccxxvi, xvii, cxvii, viii	Sthœcas	ccxxxviii, xxi
Siler	ccxxvii, xix	Sthœbe	ccxxxviii, xiii
Siligo	ccxxxviii, ii	Stratiotes	ccxxxviii, 28
Siliqua	ccxxxviii, ix	Struthium	cc, xviii
Silphion	cxviii, vi	Styrax	ccxxxvii, xix
Silibos	ccxxvii, xxvii	Sycaminus	ccxxv, xvii
Sinapi	ccxxix, xix	Sycomorus	ibidē
Siō	cxviii, xxi, ccxxx, iii	Symphona	ccxxix, xv
Sium	ccxxx, xxi	Symphyton petraon	ccxxxviii, xii
Siler	ccxxix, xxv	Syringias	cxviii, xiii
Sison	ccxxx, xv		T
Sisymbrium	ccxxix, xxix	TAlantium	clxxiii, iii
Smilax	ccxxx, xxv	Tamarix	cliii, xx
Smyrnium	ccxxxii, viii	Taxus	ccxxx, xxv
Solanum	237.27 & seq.	Telephium	ccxxxix, xxi
Somphus	ccxxxiii, ix	Terebinthus	ccxl, vi
Sonchus	ccxxxiii, xviii	Teriophonon	v, xxi
Sorba	ccxxxiii, xxv	Testiculus	clxix, v
Spanacia	ccxxxv, iii	Teucrion	ccxl, xv
Sparganion	ccxxxv, vii	Tapfia	ccxl, xxviii
Spartion	ccxxxv, xiii	Talietron	ccxl, xxi
Spatha	clxxv, xxv	Thelygonū	clxxxvii, xvii
Spōdylum	ccxxxv, xxii	Thelyphomon	v, xxi
Spina 25. 12. acuta	ccxxvi	Therionarca	ccxli, xxviii
vii, alba	ccxxxvi, vi	Thlaspi	ccxlii, xxvi
Splenion	xxix, xxix	Thrausma	xv, ii



Thus ccxlii. xiii  
 Thylacitis clxxviii. xxiii  
 Thymelæa ccxlii. xi  
 Thymus ccxlii. xx.  
 Tilia ccxlv. i  
 Tithymalus ccxvi. iii  
 Tragacantha ccxlviii.  
 xviii  
 Tragium ccxlviii. xxviii  
 Tragos ccl. ix  
 Tragoriganum ccxlix.  
 xxix,  
 Tragopogon ccxlix. xiii  
 Tribulus ccl. xxi  
 Trifolium ccli. xii  
 Tripolion ccli. i  
 Triticum ccli. xvii  
 Trifago ccli. vii  
 Tubera ccli. xxvi  
 Tussilago ccli. i  
 Typha ccxlv. xxi

V V  
 Eneris pectē ccliii. xii  
 Veratrum ccliii. xxi  
 Verbasum cclv. iii  
 Verbenaca clxxxiii. vii  
 Vetonica xxxviii. xvi  
 Umbilicus Veneris  
 cclviii. vii  
 Vnedo xxv. ii  
 Vrticula sylvestris cclix. i  
 X  
 X Iphidion ccxxxv.  
 Xylocinnamomum  
 lxvi. x  
 Z  
 Z Arnabum 27.2  
 Zarnabadium xxvii. ii  
 Zingiber lxvi. x  
 Zygis cclix. xix  
 ccxxxiii. viii

FINIS.



# HISTORIA PLANTARUM

ET VIRES EX DIOS-  
coride, Paulo Aegineta, Theo-  
phraſto, Plinio, & recētio-  
ribus Græcis, iuxta ele-  
mentorū or-  
dinem.

PER CONRADVM GESSNE-  
rum Tigurinum.

A

BROTONVM duorum eſt ἀβρότο  
generum: fœmina, quadam arboris ſpecie fruticans, candi-  
cat, circum ramulos foliis, ſe-  
riphi modo, minutim inciſis.

A

floribus referta eſt, comantibus in ſummo,  
fulgore auri, corymbis. quod per æſtatem  
prodiit, ſuauius olet, cū grauitate quadam  
& amaro guſtu. id genus Siculum eſſe cōſtat.  
Alterum mas vocatur, ſarmentofum, gracili-  
bus ramulis vti abſinthium. Plurimū in Cap-  
padocia gignitur, & Galatia Aſiatica, atq; in  
ſyriæ Hierapoli. Aegineta, Calefacit & ſic-  
cat in tertio abſceſſu, digerendi incendiq; fa-  
cultate præditum, modicè enim astringit. to-

Cypres

Auronē

a



ti corpori cū oleo infricatū rigores circuitu remeantes persanat. Stomacho inimicū est. Crematū eo magis siccatur, quod ignem haud expertum est. Alopecias sanat cū aliquo tenuium partium oleo.

αψιθιον  
aluisne

ABSINTHIUM, aliqui bathy picron, herba vulgò cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Aegineta. Cal. 1. sic. 3. Astringit cum amarore acrimoniâque. Humores ventriculi biliosos aluo & vrina pellit: quibus autem pituita redundat, eos propter astrictiōē nihil iuuat. Succus ipsius, herba multo calidior est.

αψιθιον  
Barboti-  
na &  
mors de  
vers

ABSINTHIUM marinum, quod aliqui seriphum vocāt, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphorisi Aegypti gignitur, quo Isiaci pro oliuæ ramo vtuntur. Herba est tenuis, abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauius olet, & cū quadam calfactione adstringit. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpius finitima scatet: id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, verum subamarum est, non adeo seminis fecundum. Eadem quæ seriphium potest. Aegineta, Seriphium calefacit 2. siccatur 1. Consimile absinthio, minus tamen coastringit, magis calefacit. animalia vetricis oc-



cidit, mediocriter stomacho aduersatur.

ἀκκακία

**ACACALIS** fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadā tenus similis. Aegin. Eius dilutum collyriis claritate oculorum efficacibus miscetur.

λίσ

**ACACIA** in Aegypto nascitur spina instar arboris, fruticosa, non se in rectum attolens, florem habet cādidum, & semen lupino simile in folliculis. ex quo succus expressus ficcatur in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, vt in hac arbore esse potest. aliqui exprimunt ex foliis & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Alterum acaciæ genus in Cappadocia Pontoque prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile. aculeorū vallo munitur, folia habens rutæ. semen lenticula minus fert autumno, in oculis cōnexis, ternū quaternūve capacib. Succus eius adstringit virib. inferiorib. & ocularib. medicamētis inutilis. Aegineta. Sic. 3. frig. 1. elota autem 2. Acerba & terrestris est.

ἀκκακία

**ACANTHIUM** albæ spinæ simile, foliis aculeatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis. ex qua collecta & neta vestes bōbycinis similes textūt. Folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur. Aeg. Calidæ naturæ, & tenuiū partiū est. Conuulsis auxiliatur.

ἀκάνθιον

**ACANTHVS**, Rom. pæderotā vocāt. nasci-

ἀκανθός

a ü



**brancha** tur in hortis, petrosi, & riguis, folia habet  
**virgula.** multo lactu caceis latiora, & longiora, cruce  
 diuisura, nigricantia, pinguia, læuia. caulem  
 binum cubitorum, digitali crassitudine, læuē,  
 prope verticem ex interuallis circūdatum fo  
 liolis, ceu nucamēta quædam oblonga refe  
 rentibus, spinosis: è quibus flos prodit albus,  
 semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie.  
 radicibus nititur longis, mucosis, rubris, &  
 glutinosi. Nascitur & syluestris acanthus,  
 scolymo similis, aculeatus, breuior quàm sa  
 tius, & is qui in hortis prouenit, cuius radix  
 ad eadem ad quę superior efficax. Aeg. Alii à  
 nigro foliorum colore melamphyllon appel  
 lant. discutit & siccatur.

**erable** \* **ACER** arbor est tiliæ nõ ab similibus forma  
 & magnitudine, verum cortice paulo scabri  
 ori, subliuidoque, crasso, & flecti cōtumace.  
 Radicib. paucis, sublimib. crispis. materie ve  
 nis longiorib. fluctuante, molli, macilēta, gra  
 cili. Summa soli facie gaudet, facilēq; cape  
 sit incrementum, in riguis potissimū. De flo  
 re nasci aiunt fructū paliuro similem, verum  
 oblongiorem. R. eperiuntur hac in arbore duo  
 tubera, vnū brusci nomine, intortius, crispū:  
 alterum molusci, sparsum, simplicius, sed ex  
 cellentius priori. Aceris montanū genus cris  
 pius duriusq; est, etiamnū è mascula crispus  
 ad lautiora opera. De campestri, id est, galli  
 ca, & zigia, id est, caprino alibi loquimur.



Aceris radix contusa iocineris doloribus utilissimè imponitur.

ACHILLEA, quibusdam Achillea fideritis, dodrantes aut maiores gerit scapos, fusorū effigie, quasi minutulis foliis circumdatos, crebris in latere foliorū sectionibus, coriandri similitudine, subfuluo colore, odore multo nō insuavi, medicato & glutinoso. umbellæ in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurū emulantibus. prouenit læto solo. Aeg. Consimilis est fideritidi Heracliae, sed magis astringit, eoque fluidis affectibus conuenit.

ἄχιλλια  
mille-  
feuille

ACINOS, aut acanos à Græcis dicitur, tenui siccoque ramulo herba, ocimo similis odorata, sed hirsutior. qua coronæ factitantur. à nonnullis olitoribus colitur. Aegin. Menses & aluum pota sistit. illita ignemque panos sacrum sanat. mediocriter astringit.

ἄκινος

ACONITON, aliqui pardalianches, alii cammoron, alii thelyphonon, alii myoctonon, alii theriophonon vocant. folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta, caulē palmo altum. radix scorpium caudam æmulatur. & alabastrum modo splendet. Torpescunt, ut fama est, scorpiones admota radice, stupentque. qui rursus hellebori contactu, excitantur. oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adicitur. enecat pantheras, fures, lupos & feras omnes in

ἄκόνιτον



luparia

carnibus obiectum. Est & alterum aconitum, quod aliqui cynoctonon, alii lycoctonon appellant. Huius genera sunt tria. vnum, quo vtuntur venatores: alia duo in vsum suum vertere medici. è quibus tertium, quod Ponticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iustinis exilit, à priore distans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multò nigriora: caulem filicis, laeuem stylum, cubitali altitudine, aut ampliorem. semen in siliquis oblongis recondit. radices in modum squillæ marinæ cirrhorum nigrescunt. Quibus ad venationem luporum vtuntur insertæ siquidem crudis carnibus, & deuorate, lupos enecant. Aegineta. Aconitum pardalianches exedentem lethalemque vim habet, quàm ob causam intro non assumitur: extrinsecus tamen in carnibus quas exedi oporteat, vt licet. Lycoctonon similes vires sortitù priuatim lupos, vt illud pantheras enecat.

ἄκνυρος.

Flamme  
batarde,  
ou glai-  
cul de ri-  
uiere ou  
de mar-  
res.

ACORVM folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum carie, non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. Aegineta. Calefacit, siccatur 3. Radice ad



ACUTASPINA, quàm pirinam aut pi- ὄξυανθῶν  
tyanthen aliqui vocant. arbor est pyraestro si- θα.  
milis, spinosa valde & minor. baccas profert berberis  
myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nu- offi. spi-  
cleum: radicem multifidam, altè descenden- niuine-  
tem. Aegineta. Viribus quoque pyro sylue- tū rura.  
stri æqualis est. habet & subtile quippiam  
coniunctum. Fructus ipsius myrti baccis re-  
spondet.

ADIANTON, polytrichon, pusilla ge-  
rit folia similia coriandri, in summo incisuris  
diuisa. cauliculi, quibus exoriuntur, nigro  
colore nitēt prætenues, palmum alti: radice  
superuacua: neq; caulem, neq; fructum, neq;  
florem profert. Seritur gratia utilitatis peco-  
rum, circa ouilia. Umbrosis, & palustribus,  
circa parietum aspergines, & fontium specus  
enascitur. Aeg. Siccatur, extenuatur, modicè discuti-  
tur. Calore ac frigiditate medium est. Alopec-  
ciis medetur, tumores digerit, calculos potu  
cōfringit, reiectiones pulmonis desiccatur, alui  
profluvium sistit.

AEGILOPS herbula folia tritici habens  
sed molliora, in summo capite semina bina  
ternave rubra, quibus aristæ quasi capilla-  
reæ exeunt. Aegin. Discutit, indurescentibus  
inflammationibus, & ægilopi, quæ oculo.



rum fistula est, opitulatur.

**ÆTHIOPIS** folia habet verbasco similia, perquam hirsuta densaque, in orbem circa radicem imā redacta caulem quadrangulum, scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis cōcauum alis: semen erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ sicca nigrescunt duranturque, vt cornua possint videri. plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Aeg. Radicis decoctum potu datur ischiadicis, pleuriticis, & sanguine excreatib. item faucium asperitates cum melle lenit.

ἄγ᾽ ἄλλο

χον.

Indicū li  
gnū Pau  
lo, offic.  
lignum  
aloes,

**AGALLOCHVM**, lignum est quod ex India atque Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cum quadam amaritudine, cute vterius quàm cortice vestitur, aliquantulū versicolore. Aegineta. Mansum animæ suauitatem commendat. in suffitum adhibetur. Radix eius pota denarii pondere languidum ex humore ventriculum resolutumque confirmat. Iocinorosis, dysentericis, pleuriticisq; opitulatur.

ἄγ᾽ ἄγκυρον

agaric

**AGARICVM** radix fertur laserptii similis, sed facie summa solutior, & rariore fungosoq; tota cōtextū. Duo eius genera. scemina, quæ præfertur, rectis intus venarū discursibus constat. mas rotundus est, & vndique



compactior. Vtrique gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit. gignitur in Sarmatiæ regione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affirmant. alii vt fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. gignitur in Galatia Asiæ, & Cilicia, in cedris, sed friabile & infirmū. Ae. Mixta est aërea terrestrique substantia. Vis eius est digerere, & crassos humores incidere. Viscerū maxime obstructions purgando tollit.

AGERATON fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, origano maximè similis. umbellam gerit in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniā diutissimè flos in sua coloris specie cōseruetur. Vis decocti feruēs. huius vstæ, nidor vrinam cit, & vuluæ duritias emollit. Aeg. Digerit, & inflammationes modicè arcet.

AIUGA herba in terra repens, incurua similis folijs serperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circumramos densis, odore pinus, flore tenui, luteo, vel candido: radicibus cichorij. Alterum est genus aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, prætenuibus, coma supra dictæ: flore candido: semine nigro. hæc etiā pinum redolet. Tertia mas nominatur, parua, folijs exilibus, albis scabris: caule aspero, cādido: luteis floribus, semine iuxta alas.

ἀγνέρων

χαμαίπυ  
τοςIua seu  
Iba offi.  
& herb.muscha-  
ta.



Resipit & hæc pinum. Hæc duæ vim superio-  
ris obtinent, sed non vsqueadeo efficacem.  
Aegineta. Calid. 2. sic. 3. Purgat & abstergit  
viscera potissimū iecur. vrinas mensesq; tra-  
hit. magna vulnera conglutinat. Putredinē  
expertis medetur, duritias discutit. decoctū  
ipsius etiā coxendicū doloribus salutare est.

ἀλκαία.

A L C E A syluestrium maluarū generi assi-  
gnatur. folia habens diuisa, verbenacæ proxi-  
ma: caules treis aut quatuor, cortice cannabi-  
no vestitos: florem rosæ, parū: radices albas,  
latas quinque; aut sex, cum plurimum cubita-  
les. quæ cum vino aut aqua potē, dysentericis  
ruptisq; medentur. Eadem sunt apud Aegi-  
netam, nisi quod pro ῥήξας, id est rupta, legi-  
tur δήξας, id est erosiones.

ἀλεκτορό-  
λοφος.  
Oruale  
ou toute  
bonne.

A L E C T O R O L O P H O S folia habet  
similia cristæ gallinacæ, caulem tenuem, &  
semen nigrū in filiquis. Solidum semen in o-  
culum coniicitur, nec turbat, sed in se caligi-  
nem contrahit. Mutat enim colorem, ex ni-  
gro albicare incipit, & in tumescit ac exit.

ἄλισμα.  
fistula pa-  
storis &  
plātago  
aquatic.

A L I S M A, alii damafonion, appellant, fo-  
lia ei plātagnis, nisi angustiora essent, lacini-  
osa, cōuexaq; in terrā; caule simpliciter tenui  
cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui,  
candido, pallefcēte: radicibus, tenuibus, vt ve-  
ratri nigri, acribus, odoratis, modicē pingui-  
bus, aquosos amat tractus. Aeg. Absterforiā  
quādam vim obtinet, qua calculos conterit,



& per vrinas e ducit in ventre contenta.

**A L Y P O N** furculosa herba est, subrubra: *ἄλυπον.*  
 gracilibus ramulis: tenuib<sup>9</sup> foliis: flore mol- Paulo  
 li, laui, & copioso: radica, beta, tenui, refer- alypias  
 ta acri succo: semine epithymi. gignitur in actu-  
 maritimis, maxime Libye, quàm largissima. turbet al  
 quanquã alibi quoq; plurima prouenit. Aeg. bum.  
 Eius semen bilem atram purgat pari epithy-  
 mo mensura sumptum cum sale & aceto: ve-  
 runtamen intestina leniter exulcerat.

**A L Y S S O N** fruticosa herbula est, vnicau *ἄλυσσον.*  
 lis, subaspera, rotundis foliis: fructu dupliciũ rubia mi  
 scutorum effigie, in quo est semen, quadam- nor offi.  
 tenus latum. in mōtib<sup>9</sup> & asperis locis emi-  
 cat. Aegi. Quod à cane rabido morsos libe-  
 ret, sic appellatum est. siccatur, discutitur, abster-  
 git, renũ meatus aperit: ephelidẽ, quẽ aspera  
 discolorq; cutis est, extergit.

**A L L I V M** quoddam satium atq; hortẽ *σκόρο-  
 δον.*  
 fium habetur. quod in Aegypto, singulari, vt Ail.  
 porrum, capite constat: dulce, in purpureum  
 vergens paruum. reliqua verò magna & can-  
 dida, ex pluribus coagmentantur nucleis,  
 quos aglitas, id est spicas, Græci nominant.  
 aliud est syluestre, quod ophio scorodon, id  
 est anguinum, vocant. Aeg. Calefacit, siccatur.  
 4. Syluestre, domestico valentius est.

**A L N Y** sarbos est sterilis, caudice recto, li *κλήθεα.*  
 gno medullaque molli, adeò vt graciliores Aulne.



virgæ concauentur. folio pyri, sed ampliore ac neruosiore, quadamtenus orbiculato virgatoque. Cortice squaroso, foris albicante, intus rufo, qua de causa coria tingit. fructu nullo, cū nihilominus floreat. Radice summa, nec quā laurus maiore, tenui. in planā descendit, aquosisque gaudet, quanquam ancipitem agat vitam. Infelix habetur ceu scopis tantum nata: verum ad naualia quoque materies eius commēdatur. Non potest extra terram paulum tēpus edurare, sed in humore obruta permanet ad diuturnitatem. Suppurationes folia discutere tradunt.

ἀλός.  
perro-  
quet & sc  
peruiū  
marinū

A L O E S folium scillæ similitudinem habet, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, retrorsus pandum, folia vtrinque gerit ex obliquo spinosa, rariusculè striata, breuia & curta. caulis emittitur nō dissimilis antherico: flos albus: fructus hastulæ regiae cognatus. graui tota est odore, & gustu amariss. radice vna, ceu palo, in terram depacta. Plurima præpinguisque in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiā in Asia & Arabia, in locis quibusdā maritimis: & in insulis, vt in Andro. non valdè succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quā utilis si detrita illinatur. Duo succi genera. quoddam arenosum, quod sedimentum purissimè esse videtur. alterum ad iocinoris imaginē vergit. Eligi debet boni odo-

Caballi-  
nū offic.  
succotri-  
mum.



ris, sincera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabilis, ac iocinoris modò coacta, facile liquefcens, eximigamaritudinis. improbaturnigra & fractu contumax. Gummi eam adulterant. quod deprehenditur gustu, amaritudine, & valido odore: eoq; argumento, quòd digitis friata non ad minima vsque frusta resoluitur. Nec desunt qui acaciam immisceant. Aeg. Cal. i. sic. 3. Stomacho utilis est. abstergit, discutit. Ventris excrementa subducit. Lora quidem detergit minus, sed magis stomacho cõfert, & inflammationem prohibet, vlceribus cicatricẽ inducit, præsertim sedem & naturalia instantibus.

**A LOPECVROS** specie tota similis est ἀλοπίκο-  
ρος tritico, verum folio latiore. spica plantaginis frumētū  
caudatū hirsuta, molli, lanugine densa, nullis acerib<sup>9</sup> aut aristis armata, nō dissimili vulpium caudis, vnde ei nomen. Radix est articulata, ex cuius nodis emicant folia pinnata.

**A LSINEN**, aliqui anthyllion, nonnulli ἀλσίνη.  
μουρον. myosota vocant, quoniam muscutorum aures folia imitantur. Lucis opacisq; gaudet, vnde alsine dicta est. Hæc erat eadem quæ helxine, nisi humilior esset, & folijs longioribus, nec hirsuta. cum teritur, odorem cucumis reddit. Aeg. Refrigerat & humectat vt helxine, ad feruentes inflammationes utilis.

**ALTHAEA**, quam alij ibiscum vocant,



ἀλθαία. in syluestrium maluarum genere est, cui fo-  
 Maulue lia ut cyclamino, rotunda, lanugine canescunt:  
 fauluage flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta,  
 offic. bis- intus alba Althæa appellatur, quod inter pri-  
 malua, mas sit utilis, & pluribus polleat remediis.  
 vulgo Aeg. Discutit, laxat, inflammationē abigit,  
 maluaui lenit, phymata concoquit. Radix & semē re-  
 sce & gui liqua sanē intēsa habent, & vitilignes quoq;  
 mauucs. abstergūt. Præterea semen calculos cōfringit.

A M B R O S I A tenuis frutex est, ramosus,  
 trium ferē palmorum: foliis rutæ, circa imū  
 σία. caulem exiguis. cauliculi seminibus, perinde  
 Hęc est quasi racemulis grauidi, qui nunquam florē  
 herbario pariūt, odore vinoso, suauī, radice tenui, ses-  
 rum est quipedali. Coronātur ea Cappadoces. Aeg.  
 polemo- Vis eius reprimere ac repellere, & illitu ad-  
 niū non stringere humores, qui in aliquam partem  
 ambro- incumbunt.

fia. A M M I, Aethiopicum cuminum appel-  
 tant. Plerique hoc natura diuersum esse ab il-  
 ἀμμι. lo existimant. Vulgò notum est: semen exile  
 offi. am- multo minus cumino, organū resipiens. Eli-  
 meos. gendum est purū, minimē surfurosum. Aegi-  
 neta, Calefacit, ficit 3. Particulas habet te-  
 nues, discutit, vrinam mouet, præcipuē semē.

ἀμμωνί- A M M O N I A C U M ferule succus est, quā  
 ακον iuxta Cyrenen Aphrica gignit, cuius fruticē  
 Gumme cum radice agasillim vocant. Probatum bene  
 ammo- coloratum, ligni & calculorum expers, thu-  
 niac. ris similitudine, minutis glebis, densum, sin-



cerū, nulla forde spurcatum, castoreū odore imitās, gustu amarū. hoc genus thrausma, id est, friaturā appellant: quod verò terrā & calculos collegit, phyrāma. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum, stillante ferulacea arbore. Aeg. Adeo mollit vt scirros & tophos discutiat.

AMOMVM, exigue fruticat, ex ligno se cōuoluēs in racemi modū: flore, seu cādidę violę, paruo: foliis vitis albę similibus. Laudatur q̄ maximē Armeniacū, fuluo auri colore, ligno subrufo, valde odorato. Medicū, quoniā in cāpestribus & aquosis enascitur, infirmius esse constat. Est autē magnū, subuiride, tactu tenerū frutice venoso, odore origani. Ponticū verò subrufum, parū, fragile, racemosū, fructu turgēs, & odore nares feriēs. Deligito recēs, candidū vel subrubrū, quod nec astrictū cohereat, nec cōuoluatur: sed solutū diffundatur, seminis plenū, vis paruis simile, graue, odoratū, modò cariē non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore nō euariāte. Adulteratur herba amomo simili, quę amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem quę ab vna radice integros surculos emittunt. Aeg. Acoro virtute respondet, minus eo tamē siccāt, ampliusque maturat.

ἀμωμον  
non est  
offic. pes  
colūbin<sup>9</sup>



ἀμπέλο-  
πρασον.  
porreau,  
ouail sau  
uage,  
aux vi-  
gnes

AMPELOPRASVM stomacho magis  
aduersatur. & plus porro excalfacit. urinā &  
menses vehementius ciet. id contra serpentium  
morsus esse conuenit. Aeg. Porrum hoc syl-  
uestre acerrimum calidissimumque est, exul-  
cerat, incidit, viscerum meatus recludit, sto-  
macho inimicum.

ἀμύγδα-  
λα  
Amādes.

AMYGDALA quæ quidem amara sunt  
extenuant, viscosos crassosque humores al-  
tius herentes meatus recludendo educunt, tū  
in cutem erumpentes abstergunt. Arbor ean-  
dem vim repræsentat. At dulcia amygdala  
moderato calore donata sunt. Aeg.

ἀνὰ κάρ-  
διον.  
Anacar-  
di offici.

ANACARDIVM recentiori Græciæ,  
nam vetus non meminit huius, arbor est In-  
dis familiaris. prouenit quoque in Siciliæ mon-  
tibus, qui flammæ ignis eructant, fructu aui-  
culæ corculo non dissimili, vnde nomen pu-  
tatur inditum: rubente intus cruore, quo ve-  
luti sanguine scatet. Calidum. sic. 3. Me-  
moriæ iacturam refarcit. Labantes sensus re-  
fricat. Mentem exacuit. morbis cerebri, quos  
frigida vel humida causa attulerit, opitula-  
tur. Nervorum resolutioni auxilio est. Sani-  
es quæ in fructu condita manet, verrucas de-  
let, cæterum cutem exulcerat. Scabiem usu creat.  
Iuuenibus & biliosis ob caloris vim eo in-  
terdicitur.

ἀνὰ γαλ-  
λιν

Duo ANAGALLIDIS genera, quæ tã-  
tum flore distant. nam quæ cæruleo flore est,  
fœmina



foemina dicitur: mas, quę phœniceo. frutices sunt parui, in terra iacētes, folijs in quadrangulo caule pusillis, subrotundis, ad helxing folia accedentibus: semine rotundo. Aegin. Vtraq; vim habet abundē abstergentē, subca lidam & attractricem nonnullam, vt etiam aculeos euellat. Succus naribus instillatus ca put purgat.

Morgell  
ne non  
mouron  
ou pauc-  
rine.

ANAGYRIS, frutex est arboris instar, grauis odore: folijs agni, virgisque: flore brassicæ. semen in corniculis non breuibus gignit, subrotundum, firmum, versicolori facie, simile renibus, quod durefcit vna ma- turescente. Aegineta, Acris est, calefacit, di- scutit. Semen tenuiorum partium, & vomitui ciendo est.

ἀνάγυρις  
boispuar

ANCHUSA, quę alio nomine calyx, aut onoclia appellatur, folia habet lactucae in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquouersum humi, spinis horrida: radici crassitudo digitalis. quę æstate prouenit manus inficit sanguineo colore. læto solo nascitur. Est & altera, quam aliqui alcibiadion, aut onochiles appellarunt. hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles: florem purpureum in puniceum vergentem: radices rubras, oblongas, quæ mēsisibus sanguineum succum fundunt. in sabulosis nascitur. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo,

ἄγχουσα  
Orcha-  
nette.



minore. Aegineta, Onocleæ radix astringendi vim habet, & quiddam subamarum, ad lienis renumque dolores efficax. Cum polenta illita erysipelatis succurrit. Folia radice minus refrigerant desiccantque, ad alui profluvium bibuntur. Onochelos seu alcibiadios medicatior quodammodo, viperarum moribus succurrit in cibo potuque, & alligata. Tertia reliquis breuior sine nomine fere, amarior alcibiadio. Latis alui lumbricis instar acetabuli pota benefacit.

A N C H V S A lycopsis alio loco sequetur.

ἀνδρῶσα-  
μῆς.

ANDROSACES herba est amara, tenues spargens iuncos, sine foliis, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. gignitur in Syriæ maritimis. Aegineta. Amara & acris est, discutit, siccat. Vrinam potu promouet vel herba, vel ipse fructus.

ἀνδρῶσαι  
μον.

ANDROSÆMON ab hyperico, ascyroque differt, quod fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: rubentibus virgis: & foliis rutæ, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita vinoso succo manant. complureis alas habet in cacumine, utrinque expansas, pinnatasque: circa quas, flores pusilli, lutei: & in calyculis semē papaueris nigri, insignē lineis. Aeg. Androsæmon genus alterum ascyron, vel ascyroides nominatur specie hyperici, al



terum dionysias. fructus ipforum purgat, folia autem magis desiccant.

Duo ANEMONES genera, vnum syluestre, alterum in cultis nascens. Cuius multæ species. vna phœniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum. harum folia coriandro similia, tenuioribus propè terram diuisuris, caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, vt papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, fermèque geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo prorsus maior, latioraque folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus, & multis radicum capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Sunt qui errore ducti, argemonen nominari eupatorium putet: quoniam à syluestri anemone, argemonen & papauer quod rhœada appellant, de quo inter papaueris genera referemus, propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. verum papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & vtraque tardius floret. quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas verò candidiorem & acrem. insuper anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt. sed in anemone supernè crassiusculū, in rhœade subangustius. Anemones ge

ἀνέμωνες  
herbe au  
vent. eius  
flores, co  
cles & co  
quelour  
des.



nera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. in aruis illa sæpius nascuntur. Aegineta, Anemonæ omnes vim habent acrem absterforiamq; extrahunt, ora vasorum recludunt, pituitam per hos purgant, lepras tollunt appositu, & lactis faciunt vbertatem.

Passiflor.  
fleur.

Anemone, apud Theophrastum, flos coronarius sylvestrium bulborum, post Narcissum vere exit.

ἄνθος.  
Anct.

ANETHVM calefacit & exiccat in secundo ordine intenso, siccatur paulo remissius, quod in oleo excoctum digerit, dolorem sopit, somnum conciliat, & crudos tumores maturat. Vstum tertij calefacientium siccantiumq; ordinis efficitur, humentibus vlceribus vtiliter illinitur. Viride quoniam humidius minusq; calidum est, non ita maturat.

ἄνισον.  
Anis.

ANISMVM melius semper recens, plenum, non furfurosum, odore præstans. inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium. Aegineta, Eius semine acrius est. Cal. sic. 3. hinc & urinam mouet, & flatus discutit.

ἄνθις.  
Arreste  
beuf, ou  
bugrauc  
& bugra-  
de.

ANONIS, quam aliqui ononida appellant, ramos habet fruticosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis, foliis lenticulæ, pusillis, ad rutæ aut pratensis loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non



iniucundè olentibus. Muria conditur, antè quàm spinosa fiat. cibus gratissima. rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent. radicem mittit candidam. quæ excalfacit, & extenuat. Aeg. Succus cum vino potus vrinam ducit, calculos cõterit, crustas rumpit, & dentes mitigat.

ANTHEMIDIS genera tria, tantũ flore distantia: rami dodrantaes, fruticosi, alis multis concavi: tenuibus foliolis, parvis, numerosis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum rute. nascitur in asperis, & iuxta semitas. Colligitur vere. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. hanc propriè heranthemon vocant. Ea cui leucanthemo nomen est, item quæ chrysanthemon dicitur, vehemētius vrinā ciunt. Aegineta, Calefacit ficcātque in primo ordine. Virtute tenui, discussoria, laxanti, & odorata constat.

ANTHYLLIS duplex est. quædā enim lentis simillima, foliis mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parva, tenui. Nascitur in salis terris, & à sole illustratis, non insulso gustu. Altera est foliis ramulisq; aiugæ similis, hirsutioribus tamen, brevioribus & asperioribus: flore purpureo, odoris ad-

ἀνθιμίδης  
Nielle.

ἀνθυλλίς  
Salsola &  
fel alkali



modum grauis: radice cichorii. Aeg. Vtraq;  
vlcera perficcat. Quę vcrò chamępityi respō  
det, tenuior est, comitialibus competit, effi-  
caciū abstergit.

ἀντίρρι-  
νον

Oil de  
chat ou  
moron  
violet.

ANTIRRHINON, alii anarrhinon vo-  
cant, herbam caule & foliis anagallidi simi-  
lem: flore albę violę, purpureo. ideoq; sylue  
stris anagallis nominata est: semine vituli na-  
rium simili. Aeg. Per similem Inguinarię siue  
Asteri Attico vim obtinet, sed minus effica-  
cem. itaque ex illo hoc quoque cognosces.

ἀπαρίνη.

Grateron  
offi. asp-  
gula, &  
ruella.

APARINE ramis multis & paruis fru-  
ticat, asperis, quadrangulis, per interualla or-  
biculato foliorum ambitu, vt in rubia. flos  
albus: semen durum, rotundum, concuum,  
album, vmbilici figura, asperitate vestiū te-  
naci. Ea pastores coli vice vtuntur, ad eximē-  
dos ē lacte pilos. Aeg. Hanc alii philanthro-  
pon, alij omphalocarpon appellant, modicē  
abstergit & deficcat, aliquam partium tenui-  
tatem habet.

ἀφάκη.

vessefaul  
uage.

APHACA in aruis nascitur, altior lente,  
tenuibus foliis. filiquas lenticula maiores fert,  
in quibus terna quaternave semina nigra, lē-  
te minora, continētur. Aeg. Lenticulę modo  
astringit: sed manducata egrius cōcoquitur,  
valentius ficit, mediocriter calefacit.

μελισσό-  
φυλλον.

Me lisse.

MELISSOPHYLLON siue melittēna,  
id est, apiastrum, id sibi nomen vsurpauit,  
quoniam apes ipsa herba delectantur. cauli,



culi & folia balloræ, de qua paulo antè dixi- quanquā  
mus, similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nō sit hoc  
nec ita hirsuta spectarentur. citreum malum apiastrū  
olent. Aeg. Viribus marrubio per omnia re- Ruellio  
spondet, sed multo infirmius est.

A P I O S iuncos duos siue tres spargit, ru ἄπιος,  
bros, tenues, qui à terra parum attolluntur: ἰσχάρι  
foliis rute, oblongioribus tamē, & angustio-  
ribus, herbaceis: semine paruo, radice hastu-  
læ regię, in formā pyri turbinata, rotundio-  
re tamen, succi fecunda, intus habet corpus  
candidum, extrà cortices nigros. Superior  
pars eius vomitione bilem pituitasque ex-  
trahit, inferior per aluum. tota vtrinque  
purgationes mouet. (Aegineta. non me-  
minit.)

Hortensis A P I I herba ad eadem ad que σέλινον.  
corianum conuenit. Aeg. Tanti caloris est ut Persil.  
vrinas & menses eliciat. flatus discutit, præ-  
sertimque eius semen.

A P O C Y N O N, siue cynocrābe, braf- ἀπόκυνον  
fica canina, frutex est paruis viticulis con-  
stans, male olentibus, lentis, vitiliūmque mo-  
do obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio he-  
deræ, molliore tamen, & per extremum acu-  
tiore, lento, graui odore. id luteo succo tur-  
get. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari specie,  
digiti lōgitudine protēduntur: semine intus  
albo, duro, paruo. Folia cū adipe in panes co-  
acta, canes, lupos, vulpes, & pātheras enecāt



in cibo data, & protinus eorum coxendices  
resoluunt. Aeg. Dicitur & cynomoron quod  
celerrimè canes enecet, homini etiam vene-  
nosa. Calida citra siccitatem est, vnde etiam  
digerendi facultatem illita repæsentat.

ῥοσκία-  
μος.

HYOSCYAMVS, frutex est caules emittens  
crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hir-  
suta. flores è latere caulis, ordine prodeunt,  
ris lat. of tãquam punicorum cytini, scutulis septi fe-  
fic. iusq̃a- minum plenis, vt papaueris. Tres eius diffe-  
me ou ha rentia: vna semine nigro, floribus penè pur-  
nebant. pureis, similacis foliis, cytinis præduris, & spi-  
nos. alterius semen subflauū, vt irionis: flo-  
res lutei. folia, & filique simpliciores. ambo  
insaniam gignunt & soporem, ideo in com-  
muni vsu damnatur. tertium genus, vt quod  
mitissimum esset, medici recepere, pingue,  
lanuginosum, molle, candidi floris seminis-  
que, in maritimis rudibusque nascēs, cuius  
ocasio si non adsit, rusum vsurpari oportet.  
niger, vt deterrimus, improbatur. Aeg. Quo-  
rum semen nigrum aut flauum est, venenosa  
sunt. accommodatissimū verò curationibus  
quod & semen & florem candidum habet ex  
tertio refrigerantinm ordine.

APPENDIX spina Plinio dicitur, quo-  
niã bacce in rutilo colore pendeant, appen-  
dicisq; vocentur. Hæ crudæ, per se, & aridæ  
in vino decoctæ aluū citant, & tormina com-  
pescunt. (Pro citant melius legetur citam.)



ARABIS eadem quæ Draba.

κόμαρος

ARBUTVS siue vnedo arbor est coto- Pomme  
neæ malo nõ dissimilis, tenui folio. cuius fru- de bo-  
ctus pruni magnitudinẽ implet, nullo intus chet ou  
nucleo. huic memæcylo cognomen est. ma- de boys  
turus aut flauet, aut rubescit. in esu acerosus.  
Aegineta. Stomacho aduersatur, capitisque  
dolorem mouet. acerbæ qualiratis est & ar-  
bor, & fructus.

ARTION, aliqui potius arcturon vo- ἀρκύριον  
cant, similis est verbasco folijs, nisi quod hir Lappa  
sutiora & rotundiora sunt: caule longo, mol- minor,  
li: semine cumini, paruo. radice tenera, alba,  
dulcique Aeg. Vis eius est tenuis, siccans &  
mediocriter adstringens.

ARGEMONE in totum syluestri papa- ἀργεμόνη  
ueri similis est. folia habet anemones, diuisa: Non est  
florem puniceũ: caput in cauliculo papau- agrimoi-  
ris rhœadis, oblongius, & summis partibus ne vulg.  
latum: radicem rotundam. succum croci co-  
lore, acré, dimittit. Argema & nubeculas ex-  
purgat. folia illitu inflammationes cõpescunt.  
Aeg. Abstergit simul & discutit.

ARISARVM exigua herbula est, cuius ἀρίσαρ  
radix oleæ magnitudinem implet, longè ma- ρομ.  
ioris quàm aron acrimoniæ. Vnde illitu no-  
mas sistit. sunt colyria ex ea, ad fistulas effi-  
cacia. illitu radice, genitale animalis cuius-  
cunq; in perniciem agitur.

ἀριστολόη

ARISTOLOCHIA nomen ex eo sibi χία



adoptauit, quòd existimetur optime puerpe-  
ris opitulari. Tria eius genera traduntur. ro-  
tunda, quæ foemina vocatur, foliis hedera-  
ceis, præstanti odore, cum acrimonia, molli-  
bus, subrotundis, multis ab vna radice germi-  
nibus, prælongisque palmitibus: floribus cā-  
didis, pilei similitudine, in quibus quod ru-  
brū est, grauiter olet. Longa, mascula appel-  
latur, nonnullis dactylitis, longiore q̄ rotun-  
da folio: tenuib. ramulis, dodrantalibus: flo-  
re purpureo, grauiter olente, qui marcescens  
in pyri similitudinē turbinatur. radix rotun-  
dæ, in orbem conglobata, rapi modo. longē  
verò radix digiti crassitudinem, & dodrantis  
longitudinē implet, nonnunq̄ paulò maiore  
ambæ colore intus buxco, gustu amaro, &  
grauī. Est etiamnum tertia longa, quæ clema-  
titis vocatur, ramulos habēs tenues, refertos  
foliis subrotundis, minori semperuiuo simi-  
libus: flores rutæ: radices longiores, tenues,  
crasso cortice odoratoque vestitas, priuatim  
vnguentorum spissamētis cōuenientes. Aeg.  
Aristolochia omnis calida, tenuis, abstergēs,  
amara, & subacris, ad medicinas utiliss. Ro-  
tunda, partibus tenuior, & in omnibus effica-  
cior est. Clematitis, odorata quidem, sed im-  
becillior. Longa verò in aliis media harū est,  
sed non minus calida quàm rotunda.

ἀμυγδα-  
νά.

Abrikoz

AR MEN I A C A E mali fructus, quæ  
nunc vocant mala præcocia, consimileis per-



ficis vires refert. Galenus.

ARNABO (aliis carnabum vel carnabadium, item zarnabum vel zarnabadium) ex aromatis habetur, ob quod vnguentis potissimum temperatur. Calefacit, ficit. 3. Casia & carpesio simile est. Vnde Possidonius, Vbi cinnamomi copia non datur, hoc vtendum esse censet.

ἀρνάβω.

ARTEMISIA magna ex parte in maritimis nascitur, absinchi modo fruticosa, maioribus & pinguioribus foliis, ramisque huius quidem genera duo. vnum latius habitiusque: foliis virgisque latioribus. alterum tenuius flore paruo, tenui, candido, graeolente. æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellent, tenuē herbulā, simplici caule & minuto, floribus scattente, flauo colore. hæc iucundiolem quàm præcedens efflat odorem. Aegineta. Vtraque Cal. 2. sic. 1. Tenuis ad eò substantiæ est vt renum calculos comminuat, & vteri fomentis rectè accommodetur.

ἀρτεμισία.

Armoise

ARON, apud Syros lupha vocitatum, folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem subpurpleum, dodrantalem, pistilli specie. à quo croceum semen exit. radice dracunculi alba. quæ decocta estur, vtpote cū minus acris sit. Folia ad esum cōdiuntur. & arida per se, decocta manduntur. Radix, semen & folia,

ἀρον.

Pied de  
veu ou  
serpētai-  
re petite.



dracūculi vires habent. Aegineta. Cal.fic.i.  
Substantia cōpositum est, terrestri calida &  
adstringente, radices ipsius calidiores sunt,  
dracunculo inferiores.

ARVND. vide Harundo.

ΑΣΑΡΙΝ.  
Bacara  
ou caba-  
ret nō ta-  
men est  
bacchar  
ASARVM, quod & ipsum aliqui sylue-  
stre nardum appellant, hederæ foliis, minori-  
bus multò rotundioribusque, floribus cytini,  
hyoscyami, purpureis, inter folia proximè  
radicem emicantibus, odoratis, in quibus se-  
men acinosum. Cauliculos habet angulosos,  
asperos, & molles: radices numerosas genicu-  
latis, tenues, obliquas, gramine non dissimi-  
les, longè tamè graciliores, odoratas, excal-  
facientes, & quæ linguam vehementer mor-  
dent. Umbrosis montibus provenit, sed pluri-  
mū in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italiæ lu-  
stinienfi agro. Aegineta, Similem acoro vir-  
tutem obtinet, sed magis intensam.

ΑΣΚΛΕ-  
ΠΙΑΣ.  
Hedera-  
lis simili-  
tudine.  
ASCLEPIAS, ramos emittit longos, fo-  
lia hederæ, longa: radices numerosas, tenues,  
odoratas floribus virus graue. semen securidia-  
cæ nascitur in montibus. Aeg. Callida, sicca,  
& tenuium partium, torminibus cū vino po-  
ta competit. Venenatorum moribus, & ma-  
leficis mammarum muliebriumq; locorum  
vitiis illinitur.

ΑΣΚΥΡΟΝ.  
ASCYRVM siue ascyroides, hyperici ge-  
nus est, magnitudine distans, fructicosius  
maiores habens ramos, surculosiores, ruben-



eesque: folia tenuia: flores luteos, & fructum  
resinosum, hyperico non absimile. cuius at-  
tritu digiti ferè cruentantur, qua de causa an-  
drosemum vocauere. Aegineta, Facultas eius  
in androsæmo prædicta est.

ASPALATHVS, aliis erysiceptron, fru-  
tex est surculosus, multis spinis horrens. na-  
scitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum  
insula. quo ad vnguentorum spissamenta pi-  
gmentarij vtuntur. Optimus est grauis, detra-  
cto cortice rubens, aut in purpuram vergēs,  
densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alte-  
rum genus candidum, lignosum, sine odore,  
quod deterius habetur. Aegineta, Dissimili  
constat virtute, acri & astringente, & vtraq;  
siccante: iccirco & putredini, & fluxionibus  
vtilis est.

ALTIUS asparagus multis ramis fruti-  
cat, foliis fœniculi, longis, numerosis: radice  
rotunda, grandi, spongiam habente. Cor-  
ruda siue syluestris asparagus vulgaris est no-  
titia. Aegineta, Asparagus petræus aut mya-  
canthinus abstergit vtrique, sed calore, & fri-  
giditate medius est, renes & iecur obstructio-  
nibus liberat, præsertimque radices & semen.  
item dentium doloribus medetur.

ASPHODELVS. Vide hastula regia.

ASPLENVN, aliqui scolopendrium vo-  
cant, alij splenion, alij hemionium, foliis est  
multis, scolopendre animali similibus, ab ra-

ἀσπάλα-  
θος.

Rodium  
lignū, ou  
Rodoē  
offic.

ἀσπάρα-  
γος.

offic. spa-  
ragus, as-  
parge.

ἀσπληνός

Ceterah  
ou citha-  
rac, offi.



dice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque filiceis, & opacis. caulem, nec florem, nec semen habet. folia filiculæ modo diuiduntur, subter flauescentia hirsutaque, supernè vitidia. Aegineta. Substantia quidem est tenui, nō tamen calidum, qua ratione calculos confringit, & lienes cōsumit.

ἀσθήρατ

τικὸς.

βανβώ-

νιον.

Aspergu-

la minor

aliquib<sup>9</sup>.

ASTER Atticus cauliculus lignosus, florem in cacumine habēs purpureum luteūve, & in ambitu diuisum, anthemidis modo capitulum sed ea quæ caulem ambiunt folia stellæ modo radiata, oblōga, hirsuta. Aegin. Inguinalem vocant, quia bubonibus prodesse creditur, non tantum emplastri modo imposita, verum adalligata etiā. Mixta est virtutis, digerentis & refrigeratoriæ.

ἀστράγα-

λος.

Cices

faulua-

ges.

ASTRAGALVS parvus à terra frutex, foliis & ramis ciceri similis: flore purpureo paruo, radice rotundas raphani modo grādi, quæ ad natas appēdices firmas habet. nigras, præduras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. nascitur in ventosis, opacis, & in niualibus, eo Memphis Arcadia scater. Radix ægrè propter duritiam tunditur. Agin. Non ignauiter deficcatur, radices habet astringentes: vlcera vetusta ad cicatricem perducit. aluum fluētē radix in vino potafistit.

ἀτρακτυ-

λίσ.

ATRACTYLIS, spina est cnico similis, folia multo lōgiora ferens in summis virgis,



magna parte nuda asperaque, qua fœminæ Cartam<sup>9</sup> pro fusis vtūtur. capitula in cacumine spinis syluestris horrent. flos luteus: quibusdam in locis pur- offic.  
pureus inuenitur. radix tenuis, superuacua.  
Agineta. Vocatur & cnicum syluestre, vi sic-  
cante & mediocriter calida.

ATRIPlicEM aliqui chrysolacha *ἄτριφα-  
fis.*  
non vocant. cognitum olus est. Duo eius ge- Arroche  
nera, syluestre, & satium. coctum estur vt o-  
lus. Aeg. Hum. 2. fri. 1. Ventrē mollit, semen  
ipsius vi pollet abstersoria, vnde ictericis ex  
iecinoris obstructione accommodatum est.  
(De Chrysolachano vide infra.

A VENA genicula quædam habet. folio *βρώμος.*  
& stipula triticum imitatur. & in cacumini- Auoyne.  
bus dependentes paruulas veluti locustas bi-  
pedes gerit, in quibus semen cōtinetur. Aeg.  
Similem hordeo obtinet facultatem. Siccāt  
& modicè citra corrosione discutit. astrictio-  
nis quoq; cuiusdam compos est, vnde & alui  
profluuiis subuenit.

MVRIS auricula, quā myoshotida vocāt, *μυοσώτα*  
herba est caulibus pluribus ab vna radice, a-  
liquatenus ab imo rubētibus, & concauis fo-  
liis angustis, oblongis, dorso acuto, elato, ni-  
gricātibus, per interualla assidue geminatis,  
atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus  
cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flo-  
re, vt anagallidis, cœruleo: radix digitali  
crassitudine, multis capillamentis fibrata.



Vt vult  
ruellius Radix illita ægilopia sanat. Sūt qui alfinen,  
muris auriculam vocitent. (Aegineta: nō re-  
recenset aliam quā alfinen suprà dictam.

## B

Βάκχα-  
ρις.

Gans de  
noître  
dame.

## B

A C C H A R I S herba frutico-  
sa, quæ in coronas additur. cu-  
ius folia aspera sūt, media vio-

læ & verbasci magnitudine: caulis angulo-  
sus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum  
asper, nō sine appendicib<sup>9</sup> adnatis: flore pur-  
pureo, subalbicante, odorato: radicibus vera-  
tro nigro similibus quib<sup>9</sup> odor inest cinna-  
momo proximus. Asperū squalidumq; solū  
amat. Aegin. Herba est acris, radicis decoctū  
meatus obstructos aperit, vrinā & menses ci-  
tat. folia ipsius cum sint astringentia fluxio-  
nibus opitulantur.

Βαλαύ-  
στιον.

Des ba-  
laustres

B A L A V S T I V M sylvestris punici flos-  
est, cytino similis. Cuius cōplura genera re-  
periuntur, candidum, fuluū, colore rosaceo-  
succus ex eo exprimitur, hypocistidis mo-  
do, cui adstrictoria vis inest, eadem faciens  
quæ hypocistis, & cytinus. Aeg. Valde astrin-  
git, sicca & frigida facultate præditum. Sum-  
mæ cutis vlcera ad cicatricē perducit, & de-  
stillationes cohibet.

Βαλλωτή.  
Bublaete  
offic.

B A L L O T E N, nomine alio nigrū mar-  
rubium vocant, caules edit quadrangulos,  
nigros, subhirsutos, complures ex vna radi-  
ce: foliis maioribus quā marrubij hispidis,  
intercedente spatio, subrotūdis, graue olen-



tibus, apiastro p̄ximis, vnde aliqui apiastrū marrubí-  
cam vocauerunt. candidi flores vniuersi ver- astrū ou  
ticillato ambitu caulē coronāt. Aeg. Acris est nigrum  
& absterforiæ facultatis, imposita cū sale ra- marru-  
bidi canis morfibus medetur. bium

B A L S A M V M, arbor albę violę, licij, fi-  
ne pyracanthæ magnitudine cōspicitur. Fo- βάλσα-  
liū rutę proximū, longē candidius, perpetuū μον.  
virens: in Iudæa solū quadam valle & Aegy- Balsme  
pto nascens, his differēs modis, scabritia, p-  
ceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & ca-  
pillacea coma est, theristum vocāt, quasi de-  
messile. fortassis quoniā ob gracilitatē facile  
demetatur. Aestiuus sub ortu Canis ardorib.  
arbos vnguibus ferreis inciditur, magnāq; ē  
plaga succus, quem opobalsamū vocant. sed  
tam exiguo stillatu, vt annis singulis, ne plu-  
res quidē quā senī septē mve congrī cogan-  
tur, inibiq; pondus duplo repēditur argēto.  
Succi probatio est, vt sit recēs, validi odoris,  
sincerus: non ad acorē vergens, dilui facilis,  
læuis, astringens, ac modicē mordens gustu.  
Sed variē vitiatur, misto ab aliquibus terebin-  
thi, cypri, lentisci, balani vnguento: item su-  
fino, metopio, melle, aut Cypria cera liqui-  
da. quod maleficio facile deprehenditur.  
Namq; merus in laneam vestem fusus, neq;  
maculā facit, neq; si eluatur notā relinquit:  
vitiatus autem inhæret. & lac instillatus coa-  
gulat, quod adulteratus non efficit. Quine-



tiam sincerus in aqua aut lacte celerrimè liquatur, coloréque lactescit: vitiatus verò olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modum diffundens. Sincerus senescens crassescit, deteriorque redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pessum ire, & ad ima fidere arbitrantur, postea dissipatum supernatare. E ligni genere, quod xylobasamū vocant, probatur recēs, sarmēto tenui, fuluum, odoratum, quadam tenuis opobalsamum spirans. Necessarius etiā seminis erumpit vsus. quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamū olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido deferitur. Sed coarguit magnitudine, inanitate, virium ignauia, sapore piperis. Aeg. Balsami, quod veluti lignum est ficut & cal. 2. Subtilem habet substantiam. liquor autem multo tenuior est: fructus proximè hunc virtute accedit, sed minus tenuis est.

τρεπωρό-  
γων.

Herbarij  
ab hac a-  
liā osten-  
dūt, nō si  
ne errore

βελ-  
λίων.

B A R B V L A hirci, quæ ab aliis come vocatur, breui est caule: foliis croci: radice longa, dulci supina: magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, vnde nomen inditum est. herba esui apta est. (Aegineta nō memorat.) Vide plura in Tranegopogone.

B D E L L I V M alij bolchon appellāt, alij madelcon lachryma est saracenicæ arboris,



Probatu gustu amarū, translucidum, taurini glutinis in morē. intus pingue, liquefcēs faci-  
lē, ligni ac sordis expers suffitu odoratū, vn-  
gui simile. Est etiamnū bdellij genus sordi-  
dum, nigrū, vberiorib. glebulis in offas cōuo-  
lutum, aspalathi odore, ex india aduectū. de-  
fertur etiam à Petra oppido ficcū, resinofum  
liuefcens, sed facultate secūdum. Adulteratur  
gummi, sed ita vitiatū non perinde gustui a-  
maritudinē reprēsentat, nec vsq; adeo suffi-  
tionibus odoratū. Aeg. Tum Scythicū, tum  
Arabicū scirros emollit, præsertimque recen-  
tia. Arabicum verò vrinē ciendæ est, calculos  
comminuit, maturatque.

BELLIS, qui & bellius dicitur, flos est βέλλισ  
Margue-  
rites  
pratenſis, pastilicātibus quinquagenis quinīs  
barbulis coronatus. Plinius.

BETA duorū generū est. ē quibus nigra πιῦτλον  
Bette ou  
iotte ou  
poree  
coquitur cū lenticula, vt ventrem sistat. quod  
magis radice eius præstatur. cā dida aluo vti-  
lis est, vtraq; tamen propter nitrosum humo-  
rem, quem habet in se noxii succi est. Aegin.  
Nitrosam vim habet, qua ab tergit, discutit,  
per nares purgat. Alba elixa plenius, inflāma-  
tioni arcēdæ fit idonea, modicūmq; discutit.

CESTRON psychotrophon vocitatur, βειτονικὴ  
Betōgne  
ou be-  
toine  
quoniam frigidis locis inueniatur. Latini be-  
tonicam appellant. herba est caulem ferens  
tenuem, cubiti altitudine, aut maiorem, qua  
dratū: folia quercus mollia, longa, in ambitu



diuisa, odorata, prope radicem maiora, in  
 summis caulibus, semen veluti satureiæ spica  
 tum inest. Aegin. Betonica herba est ramulis  
 exilibus, pulegio similibus: sed tenuioribus,  
 & propemodum si gustes, nullam qualitatē  
 referentibus. Nascitur potissimū locis petro-  
 sis, qua & in renum medicinis vtūtur. Est au-  
 tem apud Romanos alia quædam betonica  
 dicta, quā Dioscorides nominat cestron, alij  
 verò ptychotrophon, eò quod frigidis locis  
 gaudeat, nihil simile cum prædicta habet,  
 præter actionem. Vrinam ciet, & aliis multis  
 benefacit, potissimūmq; radix ipsius cum hy-  
 dromelite pota vomitionem mouet, folia  
 aluum subducunt.

σημύς.  
 Bouleau

B E T V L A Gallica est arbor, folio fagi-  
 no, paulò angustiori, cortice versicolore, ma-  
 terie læui, non nisi ad baculos vtili. mirabili  
 candore atq; tenuitate, terribilis magistratuū  
 virgis, eadem circulis flexibilis: itē corbium  
 sportis & ligaturis vtilis, scopisq; Bitumen  
 ex ea Galliæ excoquunt. gaudet frigidis. Scu-  
 tis item faciundis apta, quòd plaga cōtrahit  
 se protinus, clauditq; suum vulnus, & ob id  
 contumacius trāsmitit ferrum. vsus eius in-  
 ter medicos adhuc nullus est.

B L A T T A R I A adeò similis verbasco  
 est, vt sæpe fallat pro ea capta, foliis minus  
 cādidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc  
 abiecta blattas in se contrahit, ideoq; Rom.



blattariam vocant. Plin.

BLITVM estur oleris modo. aluo vtile est, βλίτονι  
nullius in medicina vsus. Aeg. Hum. frig. 2. Blette ou

BOLETI fungorū generis sunt, reliquis espinars  
minus nocentes, qualitatis expertes, si probè Potiron,  
coquantur, secus periculi occasione præbet. champî-  
Amanitè dicti secundum ab his ordinè obti- gnon  
nent. Aliis fungis abstinendum, pleriq; siqui-  
dem ipsorum lætales. Aegineta.

BOTRYS fructicosa herba est, lutea tota, βότερε  
& in multas alas sparsa. semen circa totos ra- Du py-  
mulos prouenit: folia cichorio similia. tota men  
suauem odorem spirat: quare vestimentis in-  
terponitur. inuenitur in torrentium ripis, &  
conuallibus. Pota orthopnœas mulcet. Hæc  
Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemi-  
siam. (Idem apud Aeginetā, nec plura.)

BRASSICA quæ edendo est ficit, & κράμβη  
māducata, & à foris imposita, nō tamen acré Choulx  
cōspicue vim ostendit, eoq; vulnera gluti-  
nat, & dolosa malignaque vlcera, ac tumores  
solui contumaces persanat. habet & iam nō-  
nihil absterforiū, quo lepras exterit. Semen  
ipsum potum lumbricos occidit, præsertim  
Aegyptiæ. Caulium crematorum cinis ad-  
turente vi constat, cum adipe longis laterum  
doloribus utilis. Aegineta.

Marina BRASSICA à satiua prorsus ab- κράμβη  
horret, quòd folia ferat retūdæ aristolochiæ, θαλασσία  
prælonga, tenuia. singula à ramulis rubētibus Soldana  
vulgo. vulgo.



excut, singulari vt hedera, pediculo. albo succo prædita est, sed pauco, falso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris vehementissime aluum ciet, in cibo cocta. coquitur propter acrimoniam cum pingui carne. Aeg. Sub-salsa leuiterque amara aluum soluit.

αράμβκ  
ἀγρία,

Syluestris BRASSICA, maritimis præruptisq; locis, magna ex parte gignitur: satiuæ similis, sed candidior, hirsutiorq; amara, cuius cyma in lixiuia cocta ori non insuauis. Folia illitu vulnera conglutinant, & inflammationes tumoresque discutiunt. Aegin. Satiua in omnibus validior est, vnde nec intra corpus citra noxam sumitur.

Βρίτανικη.

Quibus-  
dā lapa-  
thii acu-  
tū, quibus  
dam bi-  
storta

BRITANICA aut vetonica, folia habet syluestris lapathi: sed nigriora, & densiora, gustu adstringentia, radicē tenuem & breuē, caulem paruum emittit. Foliis exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Aeg. Astringit & conglutinat, succus ipsius putredines os infestantes per sanat.

Βούγλωσ  
σος.

Bocache  
ou lague  
de beuf

BVGLOSSVM nascitur in capestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur, verbasco simile est, foliū in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Aeg. In vinum deiectum, animi voluptates auget. Humidū calidūque temperamento est.

Βουλάπα  
θον.

BVLAPATHVM à reliquis radicis tantā altitudine differt, efficacis erga dysentericos



effectus, si bibērint ex vinō.

oil de

**B V L B I N A** foliis est porraceis, flore violæ purpureo, siue ferrugineo in spicis, nigro semine foris, rubicundo radicis bulbo, intus candido, squamis carente. Bulbinas Digimus philus tradit meliorem bulbis creare succum, non tamen ita gratas vtilesque stomacho, quod dulcescentem in se quadam crassitiem contineant.

beuf

βολβίνη

Buberi-

gim

**Esculentus B V L B V S** vulgò cognitus, à nobis estur. stomacho & aluo utilis rufus, qui & ex Aphrica defertur. amarus verò & scillinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat.

βολβος

ιδώδι-

μος.

Eschalo-

te.

**B V L B V S** quem vomitoriū vocant, folia habet lentiora multo & longiora quàm bulbus esculentus: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctū eius potū, vesicæ malis medetur. vomitiones mouet. Aegineta. Multo calidiorem vim quàm esculentus repræsentat.

βολβος

εμετικός.

**B V N I V M** caulem emittit quadrangulum, (aliàs additur procerum, digiti crassitudine) & in eo foliosos ramulos, tenues, præ tenuibus foliolis & flosculis scatētes, longitudine digitali: folia propter radicem, apio similia, sed multo tenuiora, & quæ modo quodā folia tribuli (aliàs coriandri) imitentur: flores anethi: semē odoratū, minus hyocyamo. Alibi sic describitur, Pseudobunion

βόνιον.

Herbe ou

charpen-

tier.



palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulosq; napi ferēs, acrigustu. Aeg. Bunion, quod alij arctiū appellāt, calidum est, vrinæ & mensibus educendis accōmodatum. Huic respondetur & pseudobunium.

βούφαλ-  
μος.  
Oil de  
beuf ou  
pisse en  
liq̃.

B V P H T H A L M O N, quidam cachlam vocant, tenues emittit cauliculos, mollēsque. folia fœniculi: luteū florem, anthemide maiorē, oculi similitudine, vnde nomen traxit. circa oppida nascitur, & in campestribus. Aegineta. Acriorem anthemide florē gerit, ideo & discutientem, adeo vt cerato mixtum duritias remolliat.

βλούπλε-  
ρον.

B V P L E V R V M olus est, sponte nascēs, caule cubitali, foliis multis longisq; muscario anethi. Laudatur in cibis Hippocrati, & Nicandro in medicina. Semen cōtra serpētes valet, item radix in vino, ampliusq; vrinæ ciundæ. folia ad secundas fœminarum vel succū ex vino linunt, & strumis cū sale & vino.

βούτο-  
μος.  
Iunc a ca-  
bas.

B V T O M V S frutex est palustris, caule, in offensissimo, peculiari quodam læuore, folio arundinis, angulari, fructu nigro, mali magnitudine, fidē proximum: sexu duplici, mas, fœcūdus: fœmina vitiliū ad nexus vitilis, pars ab radice tenera manditur, puerorū cibo grata, vbiq; ferē in paludibus nascitur, quanquā humore & terra gaudeat. in Orchemenico lacu plurimus. Democritus ei folia irinis p̃xima tribuit, ex vna radice nō singu-



latim, sed vt frutices scaturientia, quibus bo-  
ues iucundè vescantur, vnde nomē ei datum.

B V S E L I N V M differt breuitate caulis à *Βουσίλι-*  
satiuo apio, & radicis colore rufo, peculiare *νον.*  
contra serpentes potum & litum.

B V X V S arbor nota est, eius granum car *πίξος.*  
thego vocant. Nullū in medicina vsum præ. *Βοιχ.*  
bet: folio tantum cum materiei scobina, & li  
xiuo capillum rufant.

C

A C A L I A, quæ leontice vocatur, fo *κακαλία*  
lia fert magna, alba, è quib⁹ medi- *Carui*  
us caulis emicat, rectus, albus, florē *fauluage*  
ferens robori aut olei similē. nascitur in mon  
tibus. Grana quæ post excussum florem inna  
scuntur, trita & cum cerato illita faciem eru  
gant, & cutem extēdunt. Aeg. Viribus & vsu  
cum cancano cōuenit. Cancani autem radix  
modicè fīccat, & sine morsu illitionibus ac  
cōmodata, cum vino subacta linctāq; , arte  
riæ scabriciem iuuat.

C A C T V S est cinara, siue carduus altilis. *κάκτος.*

C A L A M V S odoratus in India nascitur, *artichaut*  
melior est fuluus, dense geniculatus, & qui *κάλαμος*  
assulose frangitur, plena araneorum fistula *ἀρωματι*  
albicans, lentus in mandendo, & astringens, *κός.*  
acum aliquanta acrimonia amarus. Aegin. *calamus*  
Cal. sic. 2. inest ei quippiam subtile, & astring *offic.*  
gēs. Vrinam ciet. Stomachicis, tum quæ vte  
rio & iocinori faciunt medicinis temperatur.



Ancho-  
lies.

CALATHIANA, munus autumnī,  
violę ceteræ veris. ea minuto est folio, violę  
albę non est dissimili, in totum sine odore ca-  
lathi similitudine, autumnno tantum proue-  
niens, tanta coloris pulchritudine, vt cæru-  
leum ipsum, quod imitatur, prouocet. in pra-  
tis post æstatē emicat, autumnalem violam  
nominant. Plin.

Percepi-  
erre.

CALCIFRAGA empetrum est.

Soulcy.

CALTHA proxima calathianæ est cū  
colori amplitudine, vincit numero foliorum  
marinam quinq; folia non excedentem. Ea-  
dem odore superatur, est enim grauis caltha  
non leuior ei quam scopam regiam vocant,  
quāquam folia eius oleant. Vergil. calthā lu-  
teolo cecinit colore tinctam. nec Plin. ab eo  
dissentit. Hinc & calthula, vestis gen<sup>o</sup> dicitur.

καλαμίν  
θη.

calamēt.

Poliot

faulnage

Offi. ne

peta vul

go herbe

au chat.

Ex CALAMINTHAE generibus  
quedā mōtibus familiaris, folia ocimi habēs  
incana, surculos aridos, & caules angulosos,  
purpureū florē. Altera pulegio similis est, sed  
maior, quā syluestre pulegium ideo appella-  
rūt, q̄ odore ipsum æmuletur. nepetā Latini  
vocatāt. Tertia mēthastrea cognata est, foliis  
oblongioribus, caule & ramis maioribus q̄  
superioris, sed viribus inefficacior. omniū fo-  
lia gustu impensē feruentia & acria, radix su-  
peruacua, nascitur in cāpestribus, asperis &  
aquosis. Aeg. Cal. sic. 3. Tenuis & acris est, mē-  
tha longē valentior. Siquidē est veluti syluc-



stris mētha. E profundo attrahit, sudores mo-  
uet, totum corpus digerit. Rigores febrium  
qui circuitu remeāt finit extrinsecus cū oleo  
infricata strenuē. Coxarum dolores soluit  
vitiosos humores in cutē erūpētes abstergit.

CANARIA humilis est herbula, foliis κύνος  
tritici, multo minoribus, calamulo tenui, ge Herbe au  
niculis pyxidatim coherētib, articulatō, chien.  
internodiis modo tiliarū in se infarctis, quē  
tracta suis ē vaginulis exerūtur, euanida spi-  
cæ loco panicula, ita vt folio & culmo triti-  
cū, cacumine arundinē æmuletur. Hanc in-  
uenerunt canes qua fastidiū deducant, eamq;  
in nostro cōspectu mandunt, sed ita, sicut est  
Plinius author, vt nūquam intelligatur quæ  
sit: etenim depasta cernitur. Notata est ani-  
malis huius malignitas in alia herba maior.  
Percussus enim à serpente mederi quadam si-  
bi dicitur, sed illam hominē inspectante  
non decerpit.

CANCAMVM Arabici ligni lachry- κάνκα  
ma est, myrrhæ quodammodo similis, virosi μον  
gustus, quam ad suffimenta vsurpant. Vestes  
eo ex styrace & myrrha suffiūtur. Aeg. Odo-  
ris est grati, vis eius obesos extenuare abster-  
gere, & aperire p̄obstructa.

CANABIS satiuā planta magni in vita κάννοβις  
vsus ad robustiis. funes factitādos: foliis fra- Chanure  
xini, graui odore caulib. proceris, inanib⁹, se-  
mine rotūdo. Aeg. Semē flat⁹ discutit, adcoq;



siccatur ut largiore cibo genituram extinguat. Succus ex ea recente, conuenienter aurium doloribus instillatur. Syuestris cannabis virgas fert althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio fatiua, nigriores & asperiores, flore lychnidis, subrubro: semine & radice althææ. decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articulorum dissipat. huius cortex torquendis funibus accommodatus.

CANOPON sambuci flos est.

herbe ou  
couleu-  
ure.

CANTABRICA in Hispania inuenta est, per Diui Augusti tempora à Cantabris reperta. Nascitur ubique, caule iunceo, pedali, in quo sunt flosculi oblongi velut calathi, in iis semen perquam minutum. Cantabriam Hispaniæ regionem hodie Biscaiam vocant. Eius radice drachma in vini hemina sæpius bibenda contra serpentium morsus.

καφύρα  
offi. cam-  
phre.

CAPHURA arbor in India tanta magnitudine visitur, ut sub eius umbra hominum centuriæ cõdi possint. Nascitur in montibus inihi mari vicinis, materiæ leui, ferulacea, quæ gummi aut lachrymam fundit, eiusdem quo arbor nominis. Ex hac caphurelæum fit quo verum mentiri balsamum apudent. Caphuræ multa genera, vnum impurius in interueniis ligni modo lamellarum impactum figitur: aliud foras emergit, & arboris corticibus hæret, maculis inter initia rubentibus, postmo-



dum vel calore solis extoſtum, vel ignium vi candescit, Riachinam indigenæ vocant. cæteris bonitate & tenuitate præſtat longiorq; durat tempore: nam & atra ei fusca reperiuntur. Rudis eſt, nullam vim ignis experta, elaborata verò, quæ ignium ardore album contrahit colorem, in laminas pellucenſes diſta. Caphura frig. ſic. 3. Capitis ex calore dolores, & incandescenſes inflammationes reſtinguit, præſertim quæ iecur male habeant. Renes & ſeminaria vaſcula refrigerat, ſanguinemque cogit. Addunt aliqui ſomnũ conciliare: ſed cauendus eius nimius uſus, quoniam peruigilia tandem adferet. Sanguinem naribus profluentẽ ſiſtere cũ ſucco vix acerbæ impoſitam ventrẽ ſupprimere. Canitiem erebro uſu accelerare: ægrotationes parere frigidas.

**FUMARIA** fruticoſa herbula eſt, præte καπνος.  
nera, coriandri ſimilis, foliis candidioribus, Fume  
vndique numeroſis, cineracei coloris: flore terre.  
purpureo. Aeg. Fumaria inde nomen ſortita eſt, quod ſuccus ipſius copioſas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit claritatem. Acris amarâque eſt, vnde vrinas bilioſas liberaliter prouocat, iocinoris obſtructioni languorûque medetur, ſtomachum cõfirmat & aluum emollit.

**CAPNOS** alia Plinio deſcribitur, quam Pied de  
pedes gallinaceos vocant, naſcens in parieti- geline.



nis & sepibus, ramis tenuissimis sparsisque,  
flore purpureo, viridis, succo caliginē discu-  
tit, itaq; in medicamēta oculorū additur. Si-  
milis & nomine & effectu alteri iam dictæ.

καπκ-  
ρις.  
Capres.

CAPPARIS aculeatus frutex est, qui in  
terra stratus, magis in orbē euagatur. spinas,  
ut rubus, habet, in hami modū adūcas: folia  
mali cotoneæ, rotunda: fructū oleæ similem.  
qui cū dehiscens pāditur, florē candidū pro-  
mit: quo excusso, nō nihil glandis oblongæ  
figura inuenitur, quod apertum grana acinis  
punicorum similia ostendit, parua, rubicun-  
da. radices lignosas spargit, grādes numero-  
sæq; Tenui solo, asperisq; locis, in insulis &  
iuxta rudera nascitur. caulis & fructus, cibi  
gratia condiuntur. Aeg. Radix extergit, pro-  
bè purgat, incidit, discutitq; tum amaritudi-  
ne, tum acrimonia: acerbitate verò cōtrahit,  
stringit, & dēfat. Lienes induratos pota & ex  
trinsecus imposita iuuat, menses promouet,  
pituitam per os educit, maligna vlcera sanat,  
dentium dolores sopit, tumores digerit, & vi-  
tiligines, quas alphas dicunt: aurium vermes  
enecat. folia autem & fructus similem quidē  
sed imbecillio rem vim possident.

καψικόν.

CAPSICON Arabici cardamomi genus  
videtur, recentioribus Græcis appellatum,  
quod semina in ordinē digesta, quibusdam  
theis inuoluentibus cōgerantur ceu capsis.  
Actuarius, Distēdentes spiritus discutit, cru-



ditates concoquit.

CARDAMOMVM optimum est, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoróque de-  
 uchitur. In India quoq; & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, farctumq; quod enim huiusmodi nō est, exoletum iudicatur, & gustu acre, subamarū, & odore caput tentans. Cardamomum frutex est amomo non dissimilis, odoratus, oblongo semine & anguloso. Quatuor eius fastigia, viridissimum ac pingue, acutis angulis, contumax frianti, quod maximè laudatur. Proximum è rufo candicans. Tertium breuius atq; nigrius. Degenerat variū, friabile, odorisq; angusti. quod verius est vicinius esse costo debet. Aeg. Acre quidē & ipsum est, verum nasturtio inualidius. Compos est etiam nonnullius amaritudinis, qua lumbricos interimit, & scabiem cum aceto exterit.

CARDAMOMVM aliud hodie Mauritanis proditum habemus duplici differentia. Maius alabastris rosę corticeis tradūt, in quibus semina lētis magnitudine, angulosa, pin-  
 gua, odorata, suo mordaci gustu linguā vellicātia. Minus inuolucris seminū minoribus & filiquulis, cādida intus carne, minore odoris fragrātia, granulis obnigri ciceris amplitudine. Frutex ipse cubitalis est caule quadrāgulo, leniter striato prodeuntibus, geniculatim & surculis & frondibus, hortensi solano

καρδά-  
 μονο  
 Graine  
 de para-  
 dis.

Carda-  
 momum  
 & sylue-  
 stre caros  
 Corda  
 persis.



non dissimilibus flore luteo, dependent ab alarum sinu alabastrum rosarum crassiore pediculo, in mucronem sensim turbinati, per initia virētes, maturi quā ruberrimi, vetustate punicei, cute leui relucente, quæ semina includit candida, in vuæ modum cōuoluta, lenti similia: ea per se cū valuulis gustata igneum feruorem repræsentant. Vtrunque calfacit, roborat, discutit, extenuat. Sacolla apud Arabes maius, hildebane minus.

σκόλυ-  
μος.  
artichaut  
faulnage

CARDVVS, Græci scolymon vocant folia chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora. caulem longum edit, foliosum, capite spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiusque corporis emēdat. item si decocta in vino bibatur. copiosam autem vrinam fœtidāque expellit. herba cum recens tenerescit, in olera, asparagi modo, transit. Aeg. Cal. sic. 2. Reliqua sunt eadem Dioscoridi.

καρπασ-  
σον

CARPASI succus soporem epotus, citāque strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remediis. Dioscorid.

καρπή-  
σιον.  
cubebe  
ou cōbe-  
be offic.  
Carpier

CARPESIVM odoratum est & tenue, viscera obstructionibus liberat, vrinā mouet, & renes calculo laborantes purgat. Aeg.

CARPINVS tractabilis est, aptaque iugis, vnde Græcis ζυγίαν appellare libuit.

Hanc



Hanc aliqui aceris generibus ascribunt, sepa carpinea  
 rant alii. In montibus nascitur, flaua crispâq; ou. Car-  
 materie. Et ipsa & acer amplæ sunt, platano meni.  
 in findêdo similes: sed carpinus est gracilior  
 macilentiorq;e, longior atq; mollior, venis  
 in longitudinem fluctuantibus, vndosa, fissi-  
 lis, segmētis omnibus in acutum compressis:  
 minus tamen quàm pro magnitudinis ratio-  
 ne neruis exūdat. Auctu facillima, paulo an-  
 tē æquinoctium germinat: post mensem & ar-  
 cturū cæditur. Durissima eius materies spif-  
 saq;e. Itaq; postquam terebrum experiatur,  
 macerant, quo facilius mollescens perforari  
 queat, lectis & sumptuosioribus fabricis iu-  
 gisque nascens. Nullum eius in medicamen-  
 tis vsum legi.

CARVM semen est vulgaris notitiæ. ra- καρος.  
 dix cocta, pastinacæ modo, manditur. Aegi. Carui.  
 Cari semen calefacit, siccatur 3. ferè gradu, fla-  
 tus digerit, vrinam mouet, idque non semen  
 duntaxat, sed etiam tota planta.

CARYOPHYLLON frutex in oriente καρυό-  
 nascitur sambuci forma, semine grano pipe- φυτόν.  
 ris grandiori fragilioriq;e, ex atro rufescente Clou de  
 in clauis modum capitato. Sunt qui represen- girofle.  
 tent buxi caudice, lauri folio, sed rotundio-  
 re. Aeg. Non eam habet naturam quæ nomi-  
 ne prætenditur, sed ex India veluti flores cu-  
 iusdam arboris festucacei & nigri sunt, longi-  
 tudine ferè pollicis, odorati, acres, subamari.

d



Cal. sic. 3. ferè gradu (vel vt Aëtius, 2.) Multus eorum erumpit vsus, non ad obsonia modò, sed ad multa quoque medicamenta. (Sic enim legit Ruel. Græca autem æditio habet, ἀπολύχρησά ἐστιν ἐν ὧν τε καὶ ἐτέροις φαρμάκοις)

καυρία,  
Casse.

CASSIA, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiā gignitur, crassi corticis sarmento, foliis piperis, eligenda est fuluescens, pulchri coloris, coralii æmula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquāto feruore astringēs, aromatica, vinoso odore, cuiusmodi est quæ ab incolis, achi appellatur: ab Alexādrice negociatorib. daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Museletico blasto, id est, germi ni cognomen est. Reliquæ viles, & quæ aphe- raum dicitur, nigra, insuavis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca & citto vocitatur bar- baro nomine. Similior huic est, pseudocasia, quæ vt explicari possit. quæ gustu coarguitur, cū nec acris, nec odorata sit, heretēmq; medullæ corticē habeat. Inuenitur etiā lata quædā fi- stula, mollis, læuis, furculosa. quæ antedictæ præfertur. Damnatur cādicās, scabra, hircinū virus redolens, & quæ tenui fistula ea scabra cute sit. Aeg. Cal. sic. 3. ferè abscessu, tenuis a-



bundè, acris & modice astringēs. incidit igitur simul & discutit, robúrque instrumentis adiicit, postremò & menses euocat.

CASIA fistularis seu nigra recentioribus *καρία*  
Græcis appellatur, quibusdam indica canna *συγγω*  
arbor magna, iuglâdis folio, fistulis prælon- *ης.*  
gis ac teretibus, vtrinq; fastigiatis, colore ru- *Casse fi:*  
bro nigricantibus, duûm ferè pedum proce- *stule off.*  
ritate, nigra intus carne, gustu prædulci, ossi- *ligna*  
bus siliquarum, ligneis distinguëtibus mem-  
branis. Partim in India, partim in Aegypto  
nascitur, iam Asiæ communis facta. Deligere  
oportet pòderosam, collucëtè, per plenâ, quâ  
si concusseris, inclusa intus grana non obstre-  
pant. Cal. hum. 1. flauâ bilem per aluum de-  
trahit. intemperati iocinoris calores ea refri-  
gerantur. prodest eis, qui per naturam pallo-  
re decolorantur, anginis, laterum doloribus,  
& pulmonariis.

CASSAMVM aliqui fructum balsami  
interpretantur. Aeg.

CASTANEA. vide Glandes Sardonianæ.

CASSYTHA Græcis recentioribus Pli- *καρύτας*  
nio Syriaca voce cassytas dicta videtur, her. *off. cuscutha. gou-*  
bosis fruticibus circûnoluitur, opere topia- *re de lin*  
rio per vertices rotata, proxima quæque ve- *vulg.*  
luti clauiculis implicat, sine radice, foliis vi-  
dua, flore albo, semine scatens tenui, cirris  
purpureis. Cal. 1. ficcat 2. Sub amara est inie-  
cta vino, temulentia causa traditur. abster-  
d ii



git, substringit, roborat. iecoris & lienis impedimenta laxat. flauam bilem per aluum exigit.

κατανάγ  
μη.  
herb. bi-  
storta.

Ex eo genere vna, folia coronopi habet, longa, radicem iunci modo prætenuem: capitula sena, septenave, in quibus erui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem vnguium milui exanimati. Altera mali parua magnitudinem explet, radice exiguae oliuæ magnitudine: foliis quoque oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen, vt cicer, minutim in virgulis dependet, punicei coloris, multis foraminibus pertusum. Vtranque narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his vti traduntur.

καύκα-  
λιν

Perfin ba  
stard

CAUCALIS, quam alii syluestre daucum vocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: foliis apio similibus, foeniculi modo per extrema multifidis, hispidisque: candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum coctumve olus estur. vrinam mouet. Aegineta, Dauci modo calefacit, siccatur, vrinam mouet, repositaque conditur.

κέδρεος.  
Cedre.

CEDRVS arbor magna est, ex qua picæ colligunt, quæ cedria vocatur. iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudinis, rotundas. Cedria optima est crassa, perlucida, grauis odoris. quæ dum effunditur gut-



tatim non dissipata coit. Cui ea vis inest ut defuncta corpora conseruet, & viuentia corrumpat. qua ex causa mortuorum vitam aliqui appellauere. vestimenta quoque & pelles, eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. Fit & oleum, à cedria separatū, dū coquitur, velleribus supra halitū eius expansis, ut in pice. Eiusdem ad omnia vsus. Cedrides Cedri fructus vocatur. Aeg. Cedrus & frutex iunipero similis & arbor est, ambo cal. sic. 3. Cōfectū ex eis oleū, quod cedreā, seu liquore cedrinū appellāt, etiā quartū ordinē attingit, subtilis admodū substantiæ: hinc teneras carnes expedit, & citra dolorem exedit, duras aut præsertimq; demortuas siccāt, & à putredine asserit, pediculos, pulices, ascaridas, & auriū vermes interficit, aliāq; plura facit.

κεδρίδες

CELASTRVS æterna coma frondet, in planis exilit, inibiq; omniū tardissimè suos perficit fructus. Horret cultum, quē si quando patitur, degenerat. Summis gelidissimisque gaudet locis. Vfus eius ad baculos & scipiones. Theop.

κηλστρος

CENTAVRIVM magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarū colore ferrata in ambitu: caulē, ceu rumicis, binū aut ternū cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papauerū, in rotunditate oblonga: flos cœruleus: semē cnico simile, ceu laneis floccis quibusdā inuolutū,

κινταύριον

ον μέγα.

huius ra-

dixi offi.

rapōtici

noic ostē

ditur ma

gno erro

re.



radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo  
prægnans, cum astrictione aliqua & dulcedi-  
ne acris, & rubescens. Amat solum pingue &  
apricum, ac syluas & colles. copiosissima est  
in Lycia & Peloponneso in Arcadia, Eli-  
de & Messenia, pluribusque locis circa Pho-  
loën, Lyciam & Smyrnam.

*κινταύριον μικρόν* CENTAVRIVM, limnesion aliqui vo-  
cant, cauere, quoniam rigua amet loca. herba ori-  
offic. cen gani aut hyperici similis, caule âgulofo, pal-  
tauria mimum excedente: flore lychnidis, è puniceo  
nor. alijs in purpuram vergente: foliis rutæ, prælongis  
fiel de ter & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla,  
re, alijs laui, & superuacua, quæ gustanti amaritudi-  
febrifu- nem adfert. Aegineta, Centaurij maioris ra-  
gia. dix acris, calida, & terreæ astrictiõis cõpos  
est. Menses itaque promouet, foetus corrup-  
pit, mortuos euicit, vulnera glutinat, sangui-  
nem spuëtibus & reliquis pectoris vitijs præ-  
sens est remedium. Minoris cõtaurij radix  
inefficax est, coliculi validè & citra morsum  
siccant, vnde nõ solum ad quæ maius centau-  
rium valet, sed etiam coxendice laborãtibus  
ipsius decoctũ inferius intestum biliosa va-  
cuat, nonnunquam & cruenta, mirũmque in  
modum iuuat.

*κεράμυνον* CERA longa acrior est quàm rotunda, ite-  
flaua quàm candida, & sicca quàm viridis, &  
cruda quàm cocta, aut sale condita. Aegine-  
ta. Cal. 4. Substantiæ crassioris est, quamob-



zē hēmorrhoidas appositū aperit: abstergit,  
vitilignes, alphas dictas, cum aceto extert.  
defluos capillos ocyus olcyonio restituit.  
Succus oculis suffusis, aut crassi humoris vi-  
tio hebetibus auxiliatur.

CERAE A portulacæ similis est, sed nigrio  
ra habet folia, & radicem tenuem. Aeg. Folia  
ipsius cōtra vesicę scabiem vtiliter bibuntur.  
Radix cum asparago myacantho pota vri-  
næ stillicidia, quæ oppleto vrinario meatu  
fiunt, abigit.

κηκία

CERASIA dulcia quidem citius dilabū-  
tur, austero stomacho vtiliora sunt: acida ve-  
rò ob suā incidendi vim pituitosis excremē-  
tosisq; stomachis prosunt. Gūmi verò cerasi  
arboris, faucibus exasperatas lenigat, & calcu-  
lo laborantibus cum vino potum succurrit.  
Aeg. (Chamæceratum infra dicemus.)

κεράσιον  
Cerises,  
merises,  
Guines  
ou Guin  
doles.

CERINTHE herba propter apes seren-  
da quibus est gratissima, folio candido, in-  
curuo, cubitalis, capite concavo mellis succū  
habente. Hanc Virgilius ignobile appella-  
uit gramen.

κήρινθον  
Pasqueto

CERRVS ægilops, quercus species est  
populo similis, caudice recto, excelsa, laui,  
& per longitudinem robustissimo, materie  
alioqui improba, nec nisi ærariorū officinis  
carbone donata. Quod enim cessante flatu  
statim extinguatur illis compendio est, nec  
nisi paucis absumitur, sic tamen plurimis

αίγίλωψ  
Herre ou  
hedre.



scintillis diffiliens. Glans illi tristis, horrida, echinato calyce castaneæ modo: itaq; à nullo præterquam à sue manditur, nec nisi aliorum inopia: cum alioqui solidam duramque gignat carnē. quare suem cerrea glans diffusam quidē sed grauē facit. E glandiferis vna fert panos arentes: muscoso villo, canos non in cortice modo, verum & è ramis dependentes, cubitali magnitudine, odoratos, sphagnum siue splachnum siue phascon appellat, item bryon: nostri penem, Syri vuam dæmonum. Eadem ferè omnia Theophrastus Macedonicæ cerro, quam asprida nominat, tribuit: quæ ægilopi cerro Plinius ascribēda existimat. Cerri folia, & cortex & glans siccant collectiones, fluxiones sistunt. Torpētes membrorum partes corroborat decoctum eius fortu: cui & insidere expedit siccandis astringendisque partibus. Radix aduersatur scorpionibus.

σκορπιδος.

χαμαιβάτος.

χαμαικίρατος.

CHAMAEBATVS, humi sparsus est rubus, radices quæ tellurem tangit agēs, vbi nihil est propè quod vncis aculeis subeat.

CHAMACERASVS pumila est, in Bythinorum agro frequens, radice parua: neque arbor est, nec arbusculis cerasorum impar, baccis cætera omnia consimilibus. Copiose vefcentibus caput vini modo grauant. Sed hæc, vt Athenæus refert, de memæcylis intelligi possunt. Nam ex his, id est, arbuti



baccis: si quisquam plus septē esitarit, caput eius dolore tentabitur.

CHAMAECYPARISSVS herba ex vi. χαμαικ<sup>ο</sup>  
no pota cōtra venena serpentium omnium, παριaros  
scorpionūque pollet. Cypres

CHAMAECISSOS, folio est hederæ, re- de iardin  
nuiore, longiusculo. ramulis à radice quinis χαμαι-  
senisve, dodrantalibus, foliosis, flore violē al κιαρος.  
bē simili, cādidiore, ac tenuiore, gustu supra Lierre  
modū amaro. radice tenui, cādida, inutili. na terrestre  
scitur in cultis. Aeg. Flos iecorum meatu ad-  
aperit, item contra coxendicum dolores ex-  
hibetur.

CHAMAEDAPHNE virgas emittit cu- χαμαι-  
bitales singulari ramulo constantes, rectas, δάφνη.  
tenues, læues: folia lauri similitudine, læuio Laureole  
ra multo, ac viridiora: semen rotundum, ru-  
bens, annexum foliis. Aegineta. Cōsimilem  
laurcolæ seu daphnoidi, & Alexandrinę lau-  
ro vim habet.

CHAMAEDRYS, quære Triffago.

CHAMAEDROPS, quidam & hāc cha- te ou ges  
medryn, alii teucrion vocant: viribus chamæ mandree  
dryi respondet. Aegineta. χαμαι-  
δρως.

CHAMAEPITYS, quære Aiuga. χαμαι-

CHAMAELION albus, ixia ideo ali- λέον  
quibus vocatur, quòd quibusdam in locis vi λευκός.  
scum circa radicem eius inueniatur, quo pro Carlina  
mastiche vtūtur mulieres: folia habet sylibo ou Car-  
aut carduo similia, asperiora, acutiora, ni dina.



groque chamæleone validiora. caulem non promit, verum ex medio spinas, echini marini, aut cinaræ modo, erigit. flores purpureos, veluti papporum lanugines emittit: semen cnici simile: radicem in latis collibus crassam: in montosis verò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore dulcem.

χαμα-  
λέων μέ-  
λας.  
Cardo-  
nette

CHAMÆLEO niger, foliis scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraque, ac rubro distincta viderentur. caulem emittit drantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in umbella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores: radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosistractibus, & maritimis. Quare chamæleo vocetur, à varietate foliorum euenit. mutant enim cum terra colorem: hic viridia, illic albicantia, alibi cœrulea, nonnusquam rubra inueniuntur. Aegineta. Nigri radix cal. sic. 3. prope modum ordine, abstergit, cutis labes extergit. duos tumores dissipat emollitque. Phagedænica vlcera illitu persanat. Si autem intra corpus sumatur, veneni loco est. Albi radix nigro proportionem respondet, sed amarior est: quæ si cū vino austero instar acetabuli bibatur, latos ventris lumbricos enecat: facit etiam ad aquam intercutem.



CHAMAELEVE lumbarum dolori χαμαι-  
bus propitia est, herba virens, incurvis foliis, λένκη.  
furculisque: flore rosaceo. Aeg. Cal. 3. sic. 1. Pas d'as-

CHAMAELEVM. vide Anthemis. ne ou

CHAMAEPLATANI sunt coactæ bre pied de  
uitatis pumilæ platani: quoniã arborũ etiam poullain  
abortus inveniuntur.

CHAMAESYCEN aliqui sycen nomi- χαμαι-  
nant. ramos emittit quaternũm digitorum, πλάτα-  
teretes, succosos, in terram deiectos: folia len- νοι-  
tis, parua, peplum plane referentia, tenuia, χαμχισυ  
quæ à terra non attolluntur: semine sub fo- κη-  
liis rotundo, vt in peplo. neque caulem, ne-  
que florem promit. radice firmatur tenui, su-  
peruacanea. Aegineta. Absterforia & acri fa-  
cultate pollet, quapropter & furculi ipsius &  
liquor myrmecias verrucâque abolent: cras-  
sas oculorum cicatrices cum melle abster-  
gunt, hebetudini & suffusioni incipienti me-  
dentur.

CHAMAELÆA furculosa fruticat, ramis χαμαι-  
dodrantalibus. folia oleæ similitudinem ha- λαια.  
bêt, tenuiora & amara, quæ gustata linguam Oliuella  
mordent, & arteriam deradunt. Aeg. Abster- offic. me-  
foria facultate sordida, vlcera, & crustas cum zereon  
melle purgat.

CHELIDONIVM maius, caule est gra χελιδών-  
cili, cubitali aut altiore, agnatis foliosis. fo- νιον-  
liis ranunculi, multis, mollioribus tamen, μέγα  
& colore cæsiis: flore violæ albæ, secun-



dum singula folia prodeūte. in eo succus croci, mordax, acris, & aliquātulum subamarus, grauitè olens. radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur. filiqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua semen papauere maius recluditur. Hoc nomē sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirūdinum exoritur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirūdines matres excēcatis pullis, admota herba visum restituere.

Χελιδώνιον  
μικρόν.  
offi. scrofula.

CHELIDONIUM minus, quod triticū syluestre aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: foliis hederæ, multo rotundioribus & minoribus, teneris, & suppinguibus. radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum tritici modum aceruatim congestas. quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Aeg. Maius cal. 3. valentèrque abstergit: succus ipsius claritati oculorum utilis est. radix arquatos cum vino & aniso pota, obstructione liberat: manducata dentiū doloribus auxiliatur. Minus cal. 4. acre adeo ut illitū cutē vlceret. vngues scabros emendat. Succus per nares purgat.

Χονδρίλλα.  
λα.

CHONDRILLA, quam aliqui cichorion, alii serin appellant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia. qua ex causa nonnulli sylvestris intubi speciem esse pronun-



ciarūt: verū tenuior tota est. in cuius ramu-  
lis, gummi mastiches simillimum, tuberculo  
fabæ inueniri solet. Aliud habetur chōdrillæ  
genus, folium ferens oblongū circumrosum  
humī sparsū, caulem succo madentem la-  
cteo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, fla-  
uescente, succosa. cuius & caulis & folia con-  
coquendi vim habent. succus incommodos  
palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in letis  
& cultis. Aeg. Chondrilla intybi species sub-  
amara gustu est, propterea etiam maiorē fic-  
candi vim quā illa obtinet.

CHRYSANTHEMON aut caltha, nō χρυσάν-  
θεμον.  
nullis buphthalmos, herba est tenera, fru- Margue-  
rites blā-  
ches  
ticosa, leues proferens caules, & multifida fo-  
lia: flores supra modum splendentes, luteos,  
orbem oculi imitantes, vnde buphthalmi no-  
men traxit. propter oppida nascitur. Cuius  
caules oleris vice manduntur. flores cum ce-  
rato triti steatomata discutere prodūtur. Re-  
gio morbo correptis colorem breui reddūt,  
si sequēte longo balnei vsu, post exitum ebi-  
bantur. (Aeg. non retulit.)

CHRYSOCOME palmi altitudine fru- χρυσόκο-  
μη.  
ticat. coma specie corymborum, hyssopo si-  
mili. radice hirsuta, veratri nigri modo, te-  
nui, cyperum æquante: gustu non iniucūdo,  
ex austero dulci. in petrosis opacisque nasci-  
tur. Aeg. Chrysitis etiā dicitur. radix acri si-  
mul & astringente vi existit, quare nō multi



in medicina vsus est: quanquā peripneumonicis, & iocinorosis in mulso elixa exhibeatur: cæterum menses educit.

χρυσόγονος.

CHRYSO G O N Y M densè fruticat, quernis foliis: flore coronarij verbasci. radix ut rarpum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atque imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

χρυσολάχανον  
χρυσολάχανον  
offic. mi  
nor cras-  
sula &  
chryso-  
la num

CHRYSO L A C H A N Y M Plinius ab atriplice discreuit, in pineto foliis lactucæ nasci tradens, sanare nervos incisos. si cōfestim apponatur. Et alibi genus chrysolachani tradit flore aureo, foliis oleris. Coctū est ut olus molle. Stranguriam dissolvit si bibatur ex vino & aqua. Aluum sistit.

κύανος.

Blaueo-  
les ou au  
bifois ou  
bluetz  
Cicerole

CY A N I colos est in nomine, qui honorem noménque dederit cœruleo. Rosam cyanus excipit, cyanum amaranthus. Plin.

C I C E R A M non tam leguminibus Columella quàm pabuli generibus adnumerat, eamque proximam fœnograeco & medicæ tradens. Eadem hominibus non inutilis, nec iniucunda est. Sapore certè nihilo differt à cicercula, colore tantum discernitur. nam est obsoletior, & nigro propior. Seritur primo vel altero sulco mense Ianuario, aut Februario, Martiove: quibusdam tamen Italiæ locis ante calendas Nouembris. Lato loco & humido feri debet. Ea, ut volunt, stercoreatur ager.



**CICERCVLA** est minuti ciceris in- cerresou  
 equalis angulos habens veluti pisum. Ea mul poys cer:  
 tis in locis vtitur, eiusq; cremorem phaselis re.  
 præferunt in alendo potentiorē.

**CICI**, lege Ricinus.

**CICER** consuetum legumen flatus cre- δρόβος  
 at, valentis materie, aluum facilem reddit, vri Ciche  
 nam mouet, lacti seminiq; generando ac-  
 commodatū, idem menses elicit. At crios ap-  
 pellatum, hoc est arietinū, aliis magis urinæ  
 ciendæ est: decoctum ipsius præsertim nigri,  
 calculos quoque in renibus conterit. Quod  
 orobiazum ab eruo vocatur, calidius his est,  
 & subamarum. Syluestria quouis modo do-  
 mesticis sunt validiora. Est autem syluestre  
 cicer foliis satiuo simile, odore acri, sed semi-  
 ne discrepat. Aeg.

**CYCLAMINVS** folia habet hederæ,  
 purpurea, varia, in quibus suisque deque albi  
 cant maculæ: caule nudo, quaternos digitos  
 æquante: floribus in eo purpureis, rosarū effi-  
 gie: radice nigra, & aliquantum lata, ut ra-  
 pum videri possit. Aegin. Cyclaminus varias  
 vires habet, etenim extergit, incidit, aperit,  
 attrahit, & dissipat. Succus ipsius hæmor-  
 rhoidas sedi admotus aperit, duritias cum a-  
 liis discutit. Cum melle suffusus proficit, per  
 nares purgat abdomini inunctus aluum sub-  
 ducit, foetus corrumpit. Radix autem ro-  
 ta succo quidem est imbecillior, sed & ipsa

κυκλάμη  
 vos.

offic. cy-  
 clamen  
 messon,  
 ou pain  
 de por-  
 ceau vulg.



vehemens adeo est, vt cum malsa instar triū drachmarum pota, interanea expurget. Cutis etiam vitia exerit.

κυκλάμι  
vos ἱτέρα  
offi. sigil-  
lū Mariæ

Est & altera CYCLAMINVS, quā cissanthemon aut cissophyllon vocāt: foliis hederæ, sed minorib<sup>9</sup>: geniculatis caulibus, crassisque circa uicinas arbores, capreleorū modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua. nascitur in asperis. Aeg. Semen efficax est vt potum priori similia faciat.

κυκλάμι  
vos τριῖν

CYCLAMINVM tertiā Plinius sibi demonstratā asserit cognomine chamæcisson, vno omnino folio, radice ramosa qua pisces necabātur, quod Dioscorides nomine tenuis primæ cyclamino tribuit, ichthyotheron, à piscium venatu nominans.

κῶναον  
Cigue

CICUTA caulem ædit geniculatū, vt fœniculi, grandem in cacumine, ramosum: folia ferulæ, angustiora, graui odoratu. rami, mox umbellæ in summo prodeūt: flores quoque albicantes: & semen aniso candidius: radice non alta, concaua. Cicutę letale venenū inest, suāq; vi refrigeratoria necat. Remedio est vini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cacuminibus, priusquam semina & comæ siccescant. qui sole densatur in pastillos. Efficacissima vis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio, & Cilicia nascenti.



Aeg. Cicutæ vires summè refrigeratorias esse omnibus constat.

CYMINVM, lege Cuminum.

CINNAMOMI genera plura, patriū sibi nomen vendicātia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod cassiæ, cui Mosyliti nomē est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex vinoso in cinereum vergēs, læue, tenuibus ramulis, ac frequētibus nodis cinctum, perquā iucunde olens. Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat. Innenitur enim cum optimo, eoque quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordēs, & cum calfactione quadantenus salsum, quod non citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, læuibus tamen internodiis appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum. facilis est huiusmodi probatio: nanque fragmenta miscellanea quædam esse videntur. Quæ autem melius spirant, suo halitu cum nares primum consuluntur, olfactum explentia, deterioris dignotionem impediunt. Est etiamnum montanum, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertiū à Mosylitico, perquā suauiter olet, nigrum fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, candicans, aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ cassiam planè representat.

κινναμόνι  
Cannelle



Quintum genus, odore nares feriens, sub-  
 rufum, & cortice fuluæ casia simile, tangen-  
 ti firmum, minus neruosum, densa radice fir-  
 matum. Iis quæ thuris, casia, myrti, aut amo-  
 mi odorem spirant, minus suauitatis inest.  
 Deligito scabrum, album, rugosum. at læue,  
 lignosum circa radicem, vt inutile, reiiçito.  
 Est etiamnum simile aliud, cui pseudocin-  
 namomo cognomé est, vile inualidi odoris,  
 solutarumque virium. Vocatur etiam Zingi-  
 ber, cum tamen sit xylocinnamomum, præ-  
 bens quãdam cinnamomi faciem. Est autem  
 lignosum cinnamomum, sarmenta longa ro-  
 bustaq; ferens, odore longe cinnamomo in-  
 feriore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinna-  
 momo genere differre dicant, quod à natura  
 eius abhorreat. Est & quoddã cinnamomũ,  
 quod aliqui pseudocinnamomum appellāt,  
 perquã denso atque crasso sarmento, longè  
 tamè inualidius cinnamomo, & odore & gu-  
 stu. Aeg. Cinnamomi vis est summè tenuis,  
 non item æquè calida, sed tertij ordinis, nihil  
 autem ex iis quæ parem ipsi calorem referūt  
 adeò siccant, propter substantiæ tenuitatem.  
 Cinnamomis autem vel pseudocinnamo-  
 mum veluti inualidum quoddam cinnamo-  
 mum est.

Langue  
 de chien

CENOCEPHALAEA eadem potest vi-  
 deri antirrhino, vt mihi quidem videtur.)



**CYNIA** aut cynocrambe, cauliculum bi-  
nūm dodrantum altitudine emittit, mollem,  
subalbidum: folia mercuriali aut hederę simi-  
lia, certis interstitiis subalbida. semen foliis  
adheret: paruum, rotundum. Folia cum cauli-  
bus pota, aluum cient, oleribus commendan-  
tur. Ius decocti & pituita & bilem aquamq;  
detrahit.

**CYNOGLOSSON** folia latifoliae plan-  
taginis habet, arctiora, minora, lanuginosa:  
caule vacat, & humi sternitur. prouenit in sa-  
buletis. Contrita eius folia cum vetere suillo  
adipe, rabidorum canū morfibus, alopeciiis  
& ambustis medentur. Herba cocta & cū vi-  
no pota, aluum mollit.

**CYPRIVS**, quem aliqui eryfisceptrū, vt  
aspalathū appellāt, folia fert porraceis pro-  
xima, sed longiora & exiliora: caulem odo-  
rati iunci, cubitalem aut maiorē, angulosum  
in cuius cacumine minuta folia cum semine  
exoriuntur: radices, quarum in medicina est  
vsus, cohærentes inter se, oleis oblongis simi-  
les, aut rotundæ, nigro colore, suauī odore,  
amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cul-  
tis enascitur. Optima est gravissima, densa,  
fractu contumax, plena & aspera, odoris  
cum quadam acrimonia iucundi, qualis est  
Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insu-  
lis petitur.

κυνο-  
κράμβη  
off. sylue  
stris atrī-  
plex

κυνο-  
γλωσσόν  
Non est  
hec lin-  
guacanis  
herba-  
riorum  
κύπριος  
Souchet  
ou ionc  
blanc en  
bas, noir  
par haule



κνπαρος  
Ιουδική.

Aliud CYPRI I genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum crocivim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem psilothri vim exhibet. Aegin. Iuncus angulosus calfacit siccâtq; citra morsum, hinc etiam humidioribus vlceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris vlcera persanat: habet & vim quandam incisoriâ, qua calculos comminuit, vrinâ & menstrua promouet.

κνπαρος  
Τροϊσνε

CYPRI V S arbor est oliuæ foliis circum ramos, latioribus, mollioribus, & virentioribus, flore candido, muscoso, odorato, semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Aegin. Cypri folia & surculi mixtis constant viribus, discutiète & astrictoria, tum ea quæ sine offendiculo & morfu siccet: ideoq; decoctum ipsorû ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Itē oris eruptiones, aphthas vocât, ipsa arbor commâducata persanat: item medicinis lieni dicatis miscetur.

κνκκία.

CIRCAEA, quam & dircæam, aliqui vocant, foliis est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine milij, nascente in quibusdam veluti corniculis: dodrantali radice, triplici ferme, aut quadruplici, candida, odorata, ex calfaciente. Nascitur in apricis, saxi, & vento perflatis. Aegin. Eius radix calida est, & odorata, quæ cum vi-



no pota fœminarum locos purgat: fœmen in  
forbitione sumptum lac generat.

CIRSIUM, caulis est tener, duorũ cu-  
bitorum, triângulo similis: ab imo foliola, ro-  
sæ speciem referentia: anguli spinosi, per in-  
terualla molles: folia buglossi similia, maio-  
ra, subcãdida, modicè hirsuta, partibus extre-  
mis aculeata: cacumen caulis orbiculatũ, hi-  
spidum, in quo capitula purpurea, quæ sol-  
uuntur in lanugines. Radicem huius loco la-  
boranti adalligatam, dolores varicum sedare  
Andreas scripsit. (Aeg. non meminit.

*κίρσιον*  
off. lingua  
bouis

CISTVS, quem aliqui citharon, aut citha-  
ron vocant, ramosus frutex est sed impro-  
cerus, foliosus, saxosis locis nascens, foliis ro-  
tundis, acerbis, hirsutis. flos masculo vt mali  
punica, fœminæ albet. Hypocistis, erythra-  
non, aut cytinus à nonnullis cognominata,  
iuxta cisti radices nascitur, floris punici simi-  
litudine. quædam flaua, altera virens, tertia  
candida. Liquatur acaciæ modo. aliqui tamẽ  
exiccant, fractamque macerant, & incoquũt,  
reliquaque, vt in Lycio prosequuntur. Aegi-  
neta, Frutex est astringens, & modicè frigidus  
virtute: folia ipsius & germina adeo siccant,  
vt etiam vulnera conglutinent: at flores cum  
in secundo ferè gradu sicciores sint, intesti-  
norum torminibus, aliisque fluidis vitiis ac-  
commodati sunt: extrinsecus illiti putrida vl-  
cera compescunt.

*κίσος*  
De gari-  
cles



ῥυτίσος.

Grand  
creusle

**CYTISVS**, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargēs cubito longiores, in quibus folia scenigræci, aut loti trifoliæ, minora, dorso medio prominente. ea digitis tria erucam olent, gustatæque cicer sapiunt. Folia refrigerat. tumores inter initia discutiūt, si cum pane trita illinantur, decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod a pes alliciat, prope aluearia serunt. Aegineta, Folia discutientis leniter & tepide nostræ sunt quemadmodum & maluæ.

κίτρον.

Citron

**CITRII** medium acidum, aut qualicatis expers, in quo semen est, tertij refrigerantium siccantiumque ordinis habetur. Cortex in secundo quidem abscessu siccatur, sed non item refrigerat, acri virtute præditus. Caro ipsius crassi succi est, pituitæ generandæ apta & frigida, semen digerit & sic. 2. Folia arboris siccandi discutiendique vim repræsentat. Aegineta.

ελίμε-  
της.

Peruëca

**CLEMATIS** humi serpit, læto, pinguique solo provenit, viticulas spargens crassitudine iunci, exiguas: folia lauri figura & colore, multo minora. Gignitur in terrenis. Aeg. Appellatur & daphnoides, myosinoides, polygonoides. Siccandi virtute pollet, qua fluores alui quæ diarrhoeam dicunt, intestinorum tormina, & dentium dolores finit. Cōtra venenatorum morsus rectè imponitur. Est & altera

**Liferon** natorum morsus rectè imponitur. Est & altera off. Volu clematis, quæ viticulosum emittit ramulū, ru-



bescentem, lentum: folium gustu admodum bilis ma-  
acre, ac exulcerans. repit per arbores, vt smi- ior. & Cā  
lax. Aeg. Huius fructus cū aqua potus pituitā panella  
& bilem per inferiora educit. folia ad lepras  
arcendas illinuntur.

CLEMATIS tertia Plinio recensetur, cē. κλημα-  
tūculus Italīs appellata, rostratis foliis ad si- τίστειται  
militudinem capitis penularum iacēs, in ar-  
uis. Est eius egregius, effectus, ad sistendam  
aluum in vino austero. Idem sanguinē sistit  
cū oxymelite, aut aqua calida. sic & ad secun-  
das mulierum efficax. ( Idem ferē gnaphali  
effectus est, quod Romanis similiter centun-  
culus appellatur, hinc fit vt quid differāt ad-  
dubitem.

CLINOPODION frutex est foliis fer. κλινόπο-  
pyllo similis, surculosus, duūm dodrantum διορ.  
altitudine. nascitur in petrosīs. flores matru- Forte q̄  
bīj modo, ex interuallis distincti speciem vulgo or  
lecti pedum prābent. Aegin. Vis eius est ca- biculata,  
lida siccaque, nondum vero adurens, sed ter- quā offi.  
tij ferē ordinis. montanū

CLYMBENVM caulem fert fabæ, qua- pulegiū  
dratum: folia plantaginis, folliculis supra κλύμε-  
caulem in sese inflexis, vt in polyporum cir von.  
rhīs. Probatissimum est è montibus. Succus Sigeia  
ex herba tota cum radice exprimitur refri- offi. Cy-  
gerans, & omnes fluidas affectiones astrin- pria ou sa  
gens. ( Galenus & Aegineta indiētā reli- ponalis  
querunt.)



κνίκος,

vel κνῆ-

κος.

off. carta

mus

C N I C V S foliis constat oblongis, per am-  
bitū diuisis, asperis, spinosis, caule sesquipe-  
dali, capitulo magnitudine grādis oliuę: flo-  
re croci: semine candido, alioqui rufo, longo  
anguloso. Huius flore in obsoniis vtuntur.  
Aeg. Cnici semine ad purgandā aluū dunta-  
xat vtimur. Si quis extrinsecus eo vtatur, ter-  
tij calefacientium ordinis erit.

κόκκος

βαφικός.

Escarlate

offic. gra

na tincto

rū. narb.

vermillō

C O C C V M quo infectores vtitur, frutex  
est surculosus, paruus. cui grana ceu lētes ad-  
hærent, quæ electa congeruntur. Optimum  
gignitur in Galatia & Armenia, deinde Asia  
& Cilicia: vltimum ex omnibus Hispanicū.  
Nascitur quoque in Cilicia, è quercubus, co-  
chlearum exiliū similitudine, quod illius re-  
gionis mulieres ore legunt, & coccum vocī-  
tant. Aeg. Granum tinctorium leniter siccat,  
vnde magnis vulneribus, & neruorum iti-  
dem cum aceto, aut oxymelite leuigatum cō-  
modē imponitur.

κωδίαμι-

vor.

C O D I A M I N V M bis anno, vere & au-  
tumno emicat, æstates hyemēsque fugit. Vocāt  
& codianum bulbum syluestrem interpretan-  
tes, & codion eius florem.

κοῖξ.

C O I X Theopraſto folio arūdinis, angu-  
lari, ad nexus utilis, à quo fiscellæ genus At-  
ticæ coix, vt inquit Pollux, apud Doros  
Cois. fit & mentio de coicinis textis apud  
Strabonem.

κολχικόν

C O L C H I C O N, aliqui ephemeron, sunt



qui agrestem bulbum vocant, autumnu exi-  
tu florem edit croci, candicantem: ab eo tem-  
pore, folia bulbi, sed pinguiora: caulem pal-  
mo altum, ferentem rufum semen: radicē fo-  
ris è nigra rufescentem, quę delibrata, candi-  
da & mollis spectatur, lacteo succo madet, at  
que gustatu dulcis inuenitur. bulb<sup>9</sup> eius me-  
diam habet rimam, fissuramque, qua flos erū-  
pit, plurimum in Messenia, & Colchis enasci-  
tur. Ea comesa, fungorum more, strangulan-  
do enecat. Hanc autē depinximus, ne à quo-  
quam imprudēter pro bulbo deuoretur: mi-  
rum enim in modum saporis voluptate im-  
peritos allicit. Remedio sunt eadem quę fun-  
gis. bubulum etiam lac potū auxiliatur. itaq;  
cum adfuerit, non aliud desideratur auxiliū.  
(Aegineta nihil adiecit quān eius alexiphar-  
maca.

COLYCEA arbor circa Idam prouenit,  
alioqui rara inuentu, fruticosa, ramosaq; &  
multis aliis concaua. folio vlmi, longiore, sa-  
tis ad latifoliae laurus accedēte, sed amplius-  
culo & rotundiore, suprā viridi, infra cano,  
neruosoq; præ tenuibus neruulis fibrisq;, de  
medio callo in costarum speciem adductis,  
materiæ solida, cortice non læui & quasi vi-  
tigineo vestitur. Radicibus per summa gra-  
cilibus, & solutis, cæterum fibratis, & mirum  
in modum flauis. Sterilis & flore vidua, surcu-  
los tamen gemmasque circa folia pingues,

Canine-  
ca. offici.  
hermo  
dactyli.

κολυκιά



laues, candidos, amentacea facie fundit. Precisa, vel ignibus exusta, ab imis rediuiua resurgit.

**COLYCEA** alia est apud Theophrastum, folio salicis, comosa, ramosa, in totumque ampla, valuulis leguminum more non angustis, in quibus semen latum, paruum, durum non nimis, nec abunde pro magnitudinis ratione frutificat. (Hanc aliqui Plinio staphylodendrum dici existimant, de qua suo loco.

κολυτρία  
Bague-  
naudier.

**COLVTEA** Liparæ peculiaris à Theophrasto traditur. Arbor magnitudine præstans fructum ferens in siliqua, magnitudine lentis, qui mirum in modum oues saginet. Nas citur semine & fimo præcipue ouillo. Serendi tempus, cum arcturus occidit. Mādari solo debet præmaceratū, cum iam in aqua germinare cœperit. foliū mittit fœnogræco nō absimile. Arbor primū vnicaulis emicat, trina cōcidendis scipionibus & baculis idonea. Si quis nimis decurtauerit mox emoritur, quippe quæ lateribus haud quaquā fruticet: spargitur deinde in ramos, quadrina prorsus abhorrescit. (Si hæc arbor est quā Mauritanī Sene vocant, siliquosus eius fructus denarii pōdusculo potus pituitam & bilem deiicit. Retorridā atramq; bilem earumq; suffusiones ex gallinaceo iure depellit. Vetusto capitis dolori, scabiei, comitialibus, impetigini



succurrit. Sed ius potius fernefacti, quàm triti farina ppinatur. pulueris modo drachma, in decocto semuncia. inter aliorum obstructions explicat. (Actuarius.)

COMBRETVM baccari simillimū traditur, nisi quod procerius est, foliorum exilitate vsque in fila extenuata. Hoc totum cum axungia vulnera mirifice sanare.

COLOCYNTHIS sarmenta foliaq; satui cucumeris mittit, per terram repētia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum: quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Aegineta, Cucurbita sylvestris validā purgandi vim obtinet: viridis ipsius succus infricatus coxendicum doloribus auxiliatur.

κολοκυνθίς.  
coloqute

CONYZAE duo genera, quæ parua vocatur, odore præstantior est. maior verò frutice altior & foliis latioribus, graui odore. utriusq; folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. in maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur, in minore pedem equat flos fragilis, lutei aut fului coloris, qui in pappum abi, radices superuacue. Est & tertium conyzæ genus, caule crassiore, ac molliore: foliis quàm paruæ maiusculis, minimè pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & inuicundioris, sed inefficacior. Prouenit locis riguis, Aegineta, Conyza utraque Cal. sic. 3.

κόνηφα.  
chasse pu  
ce ou ci  
micaria.



Hinc etiam oleum in quo decoquitur rigores febrium circuitu remeantes discutit. Flores idem præstant, quorum decoctum menses citat, & foetus extrahit. De tertia non aliud tradit quàm Dioscorides.

**Esponge** **CONFERVAM** appellant à conferru-  
de riue- minando, spongiam aquarū dulcium verius  
re ou tof- quàm muscum aut herbam, villosæ densita-  
fe musc. tis atq; fistulosæ. Frequens est in Alpinis flu-  
minibus. Hanc præsentaneum esse remediū  
ad ossa confRACTA Plinius est author.

**Διάκρυον** **CONSILIGO** ætate plinii herba in Mar-  
Pulmo- sis reperta. Nascitur & Aequicolis circum vi-  
naria Ve cum Neruesiæ. Radix eius suum & peco-  
getii esse rum omnium remedium præsens est, pulmo-  
videtur. num vitio, vel traiecta tantum in auricula. Bi-  
Pomelee bi debet ex aqua, haberiq; in ore assidue sub  
ou patte lingua. Superficies huius herbæ an esset in a-  
de lion. liquo vsu, Plinio fuit incertū. Columella ad-  
uersus pestilentia ingruentem gregi præsens  
remediū huius radiculae vsu cognouit. Cō-  
sili gnē mulomedicis pulmonariam dici co-  
pisse testatur Vegetius.

**off. volu-** **CONVOLVOLI** herbæ nascentis per  
bilis. du fruteta nullo odore flos est, nec crocis intus  
liset, ou candorem tantum referens, ac veluti naturæ  
de laveil- rudimentum lilia facere condiscens.  
lere, ou **GVNLAGO** siue cunila mascula, odo-  
herbe ris est foedi, radicis lignosæ, folio aspero. Tra-  
aux clo- dunt manipulo eius abiecto omnes etiam à



tota domo blattas conuenire ad eam.

**CORIANDRVM** aut corianum vulga-  
ris est notitiæ. Aeg. Ex contrariis viribus cō-  
positum est, tenuis substantiæ, terrenæ, ama-  
ræ, aquosæque humiditatis tepidæ particeps.  
Habet modicā vim astringendi, quapropter  
inflammationibus, erysipelatis nō admodū  
feruentibus cōuenit. Tumores molliusculos  
cum aliquo in idem efficaci, discutit. Semen  
modicè quidem cum passō bibitum, lumbrici  
pellit, libeeralius autem sumptum men-  
tem tentat.

**CORIS**, quod aliqui hypericon vocant,  
frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac  
minore, non altior dodrante, suauis, odora-  
tus, acris. Aegineta, Semen eius ad vrinam &  
menses ciendos bibitur. Succurrit & phalan-  
giorum moribus, item ad opisthototon cū  
oleo inungitur.

**CORNVS** dura arbor est, baccas ferens  
oliuæ modo oblongas, quæ primum virent,  
dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ co-  
lorem repræsentant. Muria, vt oliuæ, condiū-  
tur. Sanies quam virentia folia torrendo resu-  
darunt, impetigini conuenienter illinitur.  
Aeg. Corni fructus acerbus, si edatur, validè  
vêtrems astringit. Folia autem & germina a-  
cerbitate vehementer siccant, adeò vt maxi-  
mis durorum corporū vulneribus glutinan-  
dis sint.

ches ou

des clo-

chettes.

herbe en

censiere.

κόριον.

coriandre

κόρις.

Milleper-

tuis, ou

herbe S.

lehan.

κράνιος.

Cormier

ou corni-

er.



κορωνό-  
πρις.

Capriole  
ou sagui-  
naire, ou  
dent au  
chien.

κίστος.

Du coq.  
ou herbe  
de nostre  
Dame.

CORONOPVS oblonga herbula est,  
per terram repens, fissis foliis. coquitur in o-  
lere, radicem habet tenuem, abstringentem,  
quæ in cibo coeliacis facit. Prouenit in agge-  
ribus, & locis incultis, & fecus vias. Idem a-  
pud Paulum nisi quod κολικούς pro κοιλια-  
κούς perperam legitur.

COSTVS præcellit Arabicus, can-  
didus, lenis, eximia odoris suauitate. Secun-  
dū locum sibi vendicat Indicus, leuis, vber,  
vt ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis,  
colore buxeus, & odore feriens. Optimus  
est recens, albus, abundè plenus, densus, a-  
ridus, à teredinibus non crosus, sine graueo-  
lentia, gustu calidus ac mordens. Sunt qui  
admixtis helenii comageni præduris radici-  
bus, adulterent. quod deprehensu facile est.  
siquidem neque gustu feruet helenium, ne-  
que validum odorem vibrat, vt caput tenta-  
re possit. Aegineta, Costus modicum qui-  
dem amaritudinis, plurimum verò acris &  
calidæ qualitatibus habet, idoneus si quam sit  
opus particulā calfacere, vel ex alto in sum-  
ma humorem aliquem elicere. Vrinam &  
menses ducit, lumbricos enecat. Quum ve-  
rò & flatulenti cuiusdam particeps sit, vene-  
rem cum mulso potus stimulat. Coxendi-  
cum doloribus, resolutis, febrium rigori-  
bus ante accessiones, cum oleo infricatus,  
conducit.



**COTONEA** mala & struthia frigido ac κυνδώνιο.  
terrestri donata temperamento, ventrem sup Coins.  
primunt, vulnera glutinant. Aeg.

**CRA TAG O G O N Y M**, siue vt aliis κρετακό-  
placet, cratægonon, foliis melampyro simi- γονος.  
le est, multis calamis ex vna radice emican- Curage  
tibus, multorumque geniculorum. semine  
milii. nascitur in opacis & frutetosis, sum-  
mopere acre. Eadem apud Paulum, sed fri-  
gidum semen esse adiicitur, corrupta, ni  
fallor, lectione: aliter enim apud Galenum  
legitur.

**CRITHM Y M**, seu potius, vt aliqui, cri- κρίθμος  
thamon, fruticosa & vndique foliosa herbu-  
la est, cubiti altitudinem ferè petens. Nasci-  
tur in maritimis, & petrosis: foliis pinguibus  
numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, la-  
tioribus, & longioribus, falso gustu. flores  
candidi sunt, & semen, ceu roris marini, odo-  
ratur, molle, rotundum, quod siccatum rum-  
pitur. habet intus tritici modo nucleum: ra-  
dices digiti crassitudine tres aut quatuor, gra-  
ti odoris & iucundi. estur crudum coctumve  
in olerè. seruatur etiam in muria. Aegineta,  
Crethmon salsum est simul & amarum, sed  
modicè, quare & vis ipsius est abstersoria &  
desiccans.

**CROC OD I L I O N** chamaeleontis ni- κροκοδι-  
gri figuram habet. Nascitur in syluosis, ra- λίου.  
dice longa, læui, aliquantum lata, odore, vt a carline



nasturtii, acuto. Semē ei rotundum inest, duplex vti scutum. Aegineta, Semē & succus calidam, siccam, & discutientem vim præ se ferunt, vrinas itaque & mēses mouent. Radix excreationes ē pectore iuuat, item sanguinē per nares ducit.

κρόκος.  
Safran.

CROCVM, optimū in medendi vsu Coryceum, recens, & boni coloris, paulum candidi gerēs in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, à quo detractum est nihil, quod madefactū manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacre: sin huius generis non est, aut vetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, ē tractu Lyciæ cōtermino. Tertius Lycio ē monte Olympo. dein ex Aegibus Aetolię. Cyrenaicū & Centuripinū in Sicilica omnia viribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamē ob succi copiam, & coloris venustatem, tingendis mortariis dicauerūt, quibus de causis magno venditur. Vtilissimū in medicina quod ante descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atque etiam sapæ subtiliter contrita, quò pondus adiiciatur, simul argēti spuma, aut blumbagine. sed maleficio declaratur insidens puluis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Aeg. Crocus Cal. 1. sic. 1. astringit & concoquit.

ερότον, quære Ricinus.

CYCVBRITA



**CUCURBITA** humidi frigidique in secundo abscessu temperamenti est, unde tota si imponatur, calidas refrigerat inflammationes.

κολοκύνθη  
βη

Courge,

ou courde.

σίκνος.

Cōcōbro

**CUCUMIS** esculentus quidē viridis refrigerat humectatque in 2. ordine, caro ipsius feruidas solatur inflammationes. Semen abstergendi incidendique virtute preditum, urinas mouet, & corpus nitidum efficit. Aridus siccatur in 1. ordine, vehementiusque abstergit, & semen, & radix.

**CUCUMIS** sylvestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem longē minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem. folia atque sarmenta satiuus refert: radice candida, magna nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totum amaro. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamentum quod elaterium vocatur, ad hunc modum: Decerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una: postridie imposito supra craterem rariore cribro, utrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum versus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum vas exprimitur, simulque carnosum quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur. quod ita pressum est, residere finitur, atque in vicinam peluim demittitur. coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur, & de nouo pressa abiici-

σίκνος

αχρικός

erraticus

ελατόριον

ον.



untur. humor in pelui agitur, & linteo o-  
pertus, soli exponitur. dumque steterit, tota  
supernatans aqua cum humore concreto, ef-  
funditur. hoc verò identidem fieri solet, do-  
nec existens aqua liquecat: qua stillatim ex-  
hausta, sedimentum mortario suscipitur, &  
conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad  
hauriendam protinus succi abundantiam, cri-  
bratos cineris humi inspargant, & medium  
cauantes, triplicatum linteum obtendant, per  
quod elaterium cum sua humiditate diffun-  
dunt, siccatumque, in pila, ut dictum est, con-  
terunt. Aliqui pro dulci aqua marinam per-  
fundentes, ita eluunt. Alii in nouissima lo-  
tione, mulsam aquam respergunt. Elaterium  
optimū esse constat, læue, non ponderosum,  
cum candore leniter humectum, gustu ama-  
rissimum, quodque lucernarū luminibus obie-  
ctum, facile flagret. Porraceum tamen sca-  
brumque, si turbidum spectetur, atque erui cine-  
risque plenum sit, graue & vitiosum esse solet.  
Nec desunt qui cucumis succo amyllum im-  
misceant, ut candorem ipsum & leuitatem imi-  
tentur. Ab imatu ad decennium deiectioni-  
bus utile est. Aegineta. Cucumeris syluatici  
radix detergit, dissipat, emollit. Succus sic-  
candi vires habet, qui videlicet radice & fo-  
liis expressus elaterio similis, sed imbecillior  
est. Elateriū autē cal. 2. menses prouocat. fœ-  
tus appositus propter summam amaritudinē



necat. euacuationē ex naribus cum lacte instillatum molitur. Clystere injectum pituitā nonnunquam etiam sanguinem extrahit.

CYMINVM satium ori gratum est: sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regiū appellauit. secundum locum tenet Aegyptium: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisque aliis tractibus.

κύνινον.  
Cumin.

Sylvestre CYMINVM, plurimum efficaciusque in Lycia & Galatia, Asia, atq; Carthagine Hispaniæ gignitur: fruticē paruo: drantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis foliis tennibus, veluti ferratis, & gingidii diuisura. in cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in quibus est semē acerosum, gustu satiuo acriore. nascitur in collibus. Est & aliud sylvestris cumini genus, satiuo non dissimile, quod à singulis floribus pensilia promit cornicula, in quibus semen est melanthio simile: quod potum omnium serpentium moribus præsidio est. calculosis & iis qui vrinæ stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. sed apii semen feruesfactum postea bibendum est. Aegineta: Cyminū calefacit tertio. Vrinam mouet, flatūs discutit.

κύνινον  
ἀγριον

κυνάριον  
σος.

CYPRESSVS refrigerat & astringit. Aegineta: Cupressi galbuli & turiones siccati viribus pollent, nullo calore conspicuo:

Cypres  
galle de  
cypres.



quapropter vulnera magna in duris corporibus conglutinant, & in flaccidis putridisque vlceribus in alto fixas humiditates citra noxam depascuntur, intestinorumque ramicibus opitulantur.

Sariete, C V N I L A mollis ramis ac foliis, hispida lanugine obducitur, tritaque mellis habet odorem, digitis tactu eius coherentibus.

uage, ou  
cunilage

Δαφνοει-  
δής.

Laurcole

D

A P H N O I D E S cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisq; multis, inde sursum ver-

sus foliosis. cortex supra modum viscosus ramos vestit. folia lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores candidi: bacca cum maturuit, nigra: radix inutilis. nascitur in montosis. Aëg. Laureola eiusdem facultatis est cum laure Alexandrina.

D A M A S O N I O N, quære Alifina.

Δαυκος.

Carote

fauluage

oupanez

D A V C V M aliqui Daucium vocant. Creticū foliis foeniculo simile, minoribus & tenuioribus: caule dodrantali: umbella coriandri, flore albo: semine acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo. radix digitali crassitudine & dodrantis longitudine adolefcit. in saxosis nascitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus, syluestri apio simile, acre, odoratum, aroma olens, feruētis gustus. Probatissimū Creticum. Tertiū assigna-



tur genus foliis coriandri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario pastinacæ: semine oblongo, ceu cumini, acri. Aeg. Daucus qui & staphylinus dicitur, hortensis quidem radice flarulenta est, & venerè mouet itemq; semine. Syluestris autem semen minimè flatuosum est, sed vrinam & menses citat, vt & herba ipsa, inefficacius tamen. Sed hæc magis ad pastinacam Dioscoridis quàm daucū faciunt.

DELPHINIUM, furculos emittit à radice vna sesquipedales, aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphinatorum effigiem repræsentant, unde tractū nomen est. flos violæ albae nō dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum, quo nō aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolui, atque ignauos torpescere: semota verò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis, Alterū est delphinium, quod Romani bucinum vocant, superiori simile, sed foliis & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus. (Non habetur apud Aeginetam.)

DICTAMNUM, aliquibus syluestre pulegium vocatur. Cretensis herba est acris, leuis, pulegio similis, sed maioribus foliis, quæ tomento quodam spissaq; lanugine pubescunt. florem nullum aut semē profert.

Δελφίνιον.  
ov.  
fili' ante  
patrē, a-  
liis buccina-  
ria.

Δικταμνον.  
vos.  
Dipta ou  
gingēbre  
du iardin



*ψευδοδι- Quod pseudodictamnium vocant, multis in  
αμνος* terris nascitur, antè dicto simile, sed minus  
quàm illud acre. Eisdem effectus præbet, sed  
inefficacius multo. Defertur à Creta alterum  
dictamni genus, foliis sisymbrii, ramis maio-  
ribus: in quibus flores sylvestris origani, ni-  
gri, molles. odor foliorum inter sisymbrium  
& saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem,  
sed minus nares ferit. miscetur emplastris, &  
& medicaminibus quæ aduersus serpentium  
iniurias confinguntur, theriaca vocant. Aeg.  
Tenuius est partibus pulégio, cætera simile.  
imbecillius autè est pseudodictamnion.

*διόσπυ- DIOSPYROS vel diosporos arbor  
ρος.* fructum habet ceraso similem, duro intus nu-  
cleo. Theophrast.

*διψακος. DIPSACVM aculeatarum generis est,  
chardon caulem habet altum, spinis horridum, foliis  
a foullon lactucæ, spinosis, binis, genicula singula cō-  
plectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas  
intus & extra aculeatas, in dorsi medio habē-  
tibus, cōcauo alarum sinu, in quo imber aut  
ros asseruetur. vnde dipsaci, quasi sitiētis, no-  
men traxit. in cacumine caulis, singula surcu-  
lis capitula insunt, oblonga, echinata spinis.  
quæ arefacta, candida spectantur, dissectaq;  
medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Aegi-  
neta: Huius spinæ radix siccat secundo, cum*

*διωδύκει- aliqua abstergerendi vi.  
θεος. DODECATHEO folia septem lactucis*



similia exeunt à radice lutea. in aquâ potam  
omnibus morbis mederi tradunt, item ma-  
lis quæ membratim sentiuntur: neq; non iis  
quæ totis corporibus grassantur.

Moly ho-  
meri.

DORYCNION Crateuas halicacabon,  
aut caleâ vocat. frutex oleæ nuper prædeūtis,  
similis. nascitur in petris, non procul à mari,  
ramis cubito minoribus, foliis oleæ similib;  
colore, minusculis, firmioribus præter mo-  
dum scabris: flore candido: filiquis in cacu-  
mine, ceu ciceris densis, rotundis, quinis intus  
aut senis seminibus, exigui erui magnitudi-  
ne, læuibus firmis, versicoloribus, radix ad  
digiti crassitudinem & cubiti longitudinem  
adolefcit. id somniferum esse constat. Copio-  
sius haustum mortē adfert. Nec defuere qui  
dicerent, semen in amatoria expeti. Aegin-  
ta, simile temperamēto est papaueri & man-  
dragoræ, immodicè refrigerās. Quod si par-  
cè sumatur torporem inducit: copiosius, in-  
terimit.

δρενκνιον  
ov.

DRABA herba ad cubiti altitudinē assur-  
git, tenues spargens ramos, & ex utroq; late-  
re folia, ceu lepidii, sed molliora, & cādidio-  
ra in cacumine verè sambuci umbellam ge-  
rit, candidos flores habentem. Herba hæc cū  
ptisana coquitur, in Cappadocia maximè.  
semen aridum pro pipere obsoniis admisce-  
tur. (Aegineta præterit.

δραβη  
drauc ou  
cumin  
sauuage

DRACVNCVLVS folio constat he-  
iiii

δρακον  
τιον.



offi. serpe- deraceo, magno, candidis notis insigni: cau-  
 taria & co- le recto, bicubitali, versicolore, maculis re-  
 lubrina, sperso purpureis, ita vt anguē planè referat,  
 aliis lin- baculi crassitudine. fructus summo caule ra-  
 guacerui cematum cohæret, colore primum herbaceo.  
 & cum ematuruit, croceo, gustu feruens,  
 mordaxque. radice aliquantulum rotunda,  
 bulbosa, aro nō abssimili, tenui obducta cor-  
 tice. Nascitur in sepibus vmbrosis. Aeg. Simi-  
 le quiddam aro habet, sed eo acrius, amarius  
 calidius, tenuiusq; est, cū adstrictione nō nul-  
 la. Radix ipsius pota viscera purgat, & perui-  
 caciū seu malignorum vlcerum excellentissi-  
 mum est remediū: ex æquo etiam folia, fru-  
 ctus valentior est.

δρυόφο-  
 vor.

offi. myr-  
 tus nemo-  
 ralis, cusi-  
 nes rura.

DRYOPHONYM olus sylvestre filiculā  
 siue dryopterim specie æmulatur, ramulis si-  
 ue cauliculis tenuibus sesquipedalibus, quos  
 circūdant vtrinq; folia, pollicari amplitudi-  
 ne rusco similia, nisi quod teneriora sunt &  
 candidiora, flore sambuci lacteo, semine gu-  
 stu mordaci, vnde eo vice piperis vtūtur, co-  
 quuntq;, cauliculos in cibis admodū gratos.

δρυόπτε-  
 ρις  
 Arborea  
 osmūdu-  
 la.

DRYOPTERIS nascitur in veterū ro-  
 borum musco, filici similis, multo minore fo-  
 liorum incisura: radicib<sup>9</sup> inuicem implexis,  
 hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergē-  
 tibus. Aeg. Dulcis, acris, & leniter amara est:  
 cæterum vim habet exedentem, qua & pilos  
 abolet.



DVL C I S radix plurima gignitur in Cap γλυκύ-  
ρίσα.  
padocia & Ponto. fruticosa est ramis binūm  
cubitorū altitudine assurgentibus: foliis len-  
tisci, densis, pinguibus, tactūque gummosis: off. liqui-  
ritia rigo  
flore hyacinthi: fructu pilularū platani ma-  
gnitudinis, asperiore, qui siliquas lentiū mo-  
do habet, rufas & paruas: radicibus longis, vt hisse ou  
erculisse  
gentianæ, coloris buxei, subacerbis & dolci-  
bus, quæ desantur in succum, lycii exemplo.  
Aeg. Tepidi humidique temperamenti est, ali-  
cuius etiam astringentis particeps, eoque non  
modò fauces exasperatas læuigat, sed etiam  
vesicæ scabiei medetur: eadem sitim arcet.

## E

## E

B E N V S optima habetur ethio-  
pica & nigra, nullos habens ve- "Βενος"  
narum discursus, factitii cornus Euene  
læuore. cū frangitur densa apparet, mordens  
gustu, atque astringens. suffitur iucundo odo-  
re supra carbones sine fumi tedio. recens au-  
tem ad ignem prolata, ob pinguitudinē ac-  
cenditur, & trita ad cotē flauescit. Altera est  
indica, internatis segmentis candicantibus,  
& modicè fuluis, item frequētibus maculis.  
ceterū prior bonitate antecedit. Apud quos-  
dam sesamina, aut spinea ligna cōsimilia pro  
ebeno vaneunt. quod discernitur ex eo, quod  
fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluū-  
tur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolen-  
tiæ in suffitu præferētia. Aeg. Ebeni ligni vis



est excafactoria, deterforia, & subtilis, quæ propter quæ pupillas obscurant abstergere creditur, aliisque oculariis miscetur medicinis.

ECHINVS idem erino, meo quidē iudicio.

ἑχιν.  
Herba  
hircina

ECHION, folia habet prælonga, hirsuta, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamē, subrubra, & pingüia, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutaque utroque latere folia, expansa, pinnatæque, nigra, in summo caule minuscule: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt. radix nigricat, digito tenuior. Aeg. Hæc alij doriada, alij alcibiadion vocat, nō modo à serpente commorsis cū vino pota auxiliatur, sed præsumentes quoq; percuti non patitur.

ἑλαϊόμη-  
λι.

In Palmyris Syriæ, quod ELAEOMELI vocant, ex quodam caudice manat, oleū melle crassius, sapore dulci. Aeg. Instar duorum cyathorū potum cū aquæ hemina crudos humores biliososq; ex aluo educit: qui verò id bibunt, torpescunt, quod extimescendū non est, sed excitari ipsi debent.

ἑλαφό-  
βοσκον.  
offic. gra  
tia dei

ELAPHOBOSCO fœniculaceus caulis est, aut rorimarino similis, geniculatus: foliis duū digitorū latitudine, ut terebinthi, prælongis, aliquatū asperis, circumfractis: adnata multa habet, ferentia ymbellas anethi



similes, & semina eiusdem: florē subluteum: radice ternum digitorum longitudinis & crassitudinis vnus, candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olerē manditur. contra serpentium ictus datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium moribus resistere. Aegineta, Cal. sic. 2. Substantia est tenui.

ELATINE folia habet helxine, minora, ἐλατίνη  
rotundiora, pilosa: dodrantalibus ramulis, Capestre  
quinis senisve, à radice foliosis, gustu astringentibus. nascitur in segetibus & cultis. Aegineta, Mediocri est frigiditate, & astringitione donata. ραπίστῳ

ELEOSELINVM in humidis nascitur, ἐλιοσελί  
fatuo grandius, & ad eadem efficax. Aegineta, Palustre apium idem potest quod hortense. νον.

ELICHRYSON quidā chrysanthemon, ἐλίχρον  
nonnulli & id amaranton vocāt, quo deorū σος.  
simulacra coronant: ramulum habet candidum, virentem, rectum, firmum: folia intercedentibus spatii angusta, abrotono similia: Chanosū  
comam aureæ lucis, in orbem, umbella rotunda veluti siccis corymbis dependentibus, radice tenui. nascitur in asperis, & torrentium alueis, Aeg. Eius coma cum vino pota urinæ angustiiis, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis accommodata est: mentes educit, sanguinem coactū ex mulso pota maius



dissoluit, & destillationibus auxiliatur.

ἐμπετρον  
Saxifra-  
ga.

EMPETRON aliqui phacoides vocant, nascitur in montibus, & maritimis, falso gustu. sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur. Aeg. Pituitam & bilē purgat. Est etiā falsum, quare absterfionibus accommodatur. (Cognomen eius prassoides apud Paulū legitur, non phacoides.)

ἐννεάφυλλον.  
λόν.

ENNEAPHYLON herba Plinio folia longa nouem habet, causticæ naturæ. in lumborū doloribus, & coxendicum imponitur vtilissimè: continuò enim pustulas excitat.

ἐφήμερον.  
Μουσγετ

EPHEMERON, aliqui syluestrem irin appellant, folia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem, florem candidum, amarū: semen molle: radicem vnā digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. nascitur in syluis & opacis. Aegineta. Mistæ potestatis est & repellentis, & discutientis per halitum. (Ephemeron venenosum in Colchico depingetur.)

ἐπιμήδιον.  
Epimedie

EPIMEDIUM, caulis est non magnus, hederæ foliis, denis atq; duodenis, neq; florē neque fructum ferēs, radice tenui, nigra, grani odore, gustu fatuo. nascitur in humidis. Aeg. Virtus eius est mediocriter frigida cum humiditate aquosa: quod si illinatur, mammas rectas conseruat. dicitur etiam sterilitatē potu facere.

ἐπιπακτίς.  
τίς.

EPIPACTIS ab aliis helleborine, par-



ua herba, fruticosa, exiguis foliis. Iocinoris  
vitiis utilis, & contra venena pota. Idē Aeg.

**EPITHYMON**, flos est è thymo durio. *ἐπίθυμον*  
re, satureiæ simili, capitula habet tenuia, & le-  
uia, & in eis caudiculas, quasi capillamenta.  
plurimū in Cappadocia, & Pamphylia gi-  
gnitur. Aeg. Cal. sic. 3. thymo efficacius.

**EPIROTICA** mala, quæ latinè orbicu- *ἐπαιροτικὰ καὶ μῆλλα*  
lata dicuntur, stomacho utilia, sistūt aluum,  
vrinas euocant, malis tamen cotoneis inua-  
lidiora.

**EQUISETVM** in riguis, & scrobibus na *ἰππερις.*  
scitur. cauliculi prodeunt inanes, geniculati, *Prela ou*  
in se fardati, rubescētes, scabri, & iunceæ circa *cauda*  
eos folia, crebra, exilia. in sublime equisetū *equina*  
attollitur, vicinos arborū caudices scandens,  
obuolutūmq; depēdet, comis multis, nigris,  
vt equorum cauda. radix lignosa, dura. Alte-  
rum equisetū caulis est rectus, cubitalis, aut  
maior inanis. comis per interualla breuiori-  
bus, candidioribus & mollioribus. Id cū ace-  
to tritū vulneribus remedio est, eadēmq; fun-  
gitur facultate. Aeg. Hippuris astringentē cū  
amaritudine facultatē possidet, cōq; valēter  
simul & sine morsu desiccat. vulnera maxi-  
ma committit, intestinorum ramicibus opi-  
tatur, & vitiis fluore infestantibus cū vino  
pota medetur.

**ERICA** fruticosa arbor, myricæ similis, *ἑρικήνη*  
longè minor. cuius flore apes reprobum mel Bruyre



efficiunt. tam flos quàm coma serpentiū iētibus illitu medetur. Aegineta, Vi pollet discutiente citra rosionem, flore ipsius potissimū & foliis vtendum.

ἑν' ὕγιον  
Centum  
capita.

ERYNGION aculeatarum generis est. Cuius folia in principio, sale cōdita, in cibos recipiuntur. lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica. Eryngio, cum adoleuerit, complures ramulorum striæ rubēt, in quorū summitatibus globosa capitula, durarum acutissimarūque spinarum ambitu stellatim circumuallantur, quorum colos aliās viridis, aliās albus, interdum cœruleus inuenitur. radix oblonga, lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis & campestribus. Aegineta, Calfacit quidem non manifestò, siccitatis autem haud obscure nec modicè particeps.

ἑρινος.  
Herbe a  
laict ou  
ocimum  
aquatile.

ERINVS nascitur apud fontes & fluuios, foliis ocimi, sed minoribus, parte superna diuisis, quinis, senisve, dodrantalibus furculis: flore candido, semine nigro, & acerbo. folia & caules lacteo succo turgent. Aeg. Eius seminis denarij duo cum mellis denariis quatuor illiti, oculorū fluxiones sistunt: succus aurium doloribus benefacit. Alibi de echino scribit, herba repellente & siccante ob suam acerbicatem, eadem autem erino videtur.

ἑριφία.

ERIPHIA septem lanuginosis ramulis



apii modo foliat, purpureo flore, & eo quidem perenni, semine fabaceo, totidem radiculis quot ramis. Hanc magi prodidere in aena scarabeum habere, sursum deorsumque decurrentem, cum sono hœdi unde nomen accepit. Hac ad vocem præstantius esse nihil tradiderunt.

**ERYSIMVM** cereale, vel irio, culmo cō ἐρύσιμον  
surgit ferulaceo, foliis sesamæ similibus san- σιτῶδες  
guineis, flore sesamæ foliaceo, prorsus idem Irecon ou  
erat, nisi pinguis esset. Fruges est æstiva, & an velaron  
te Vergiliarum exortum seritur. Italiæ ritu,  
alioqui in Græcia & Asia earundem o. casu.  
Recēs sato irioni pluuius imber nocet, quan  
quam reliquis frugibus, pdesse credatur: quo  
virēte sicuti sesama, nullum animal vescitur,  
quod amarus sit. Gale. Erysimū corporis co-  
alitu sesamo vicinū, sed insuauius longe esu,  
tenuis alimenti, in omnibus ipso deterius, vt  
panicum milio. Vtrunq; tamen calidum est,  
sicimque cibo concitat.

**ERYSITHALE** foliis est acanthi, luteo ἑρυσιθαλ-  
flore. datur in vino contusis & euersis. λές.

Cruda **ERVCA** venerem largiore cibo ἐν ἑρκα-  
concitat. semen eodem effectu prodest. urinā Erucque  
cit, cōcoctioni prodest. aluo perquàm cōmo ouro-  
data. semine ad cōdimenta vtuntur. quod, vtī quette  
in longū tempus asseruetur, adiecto lacte aut  
aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiam-  
num sylvestris eruca, maximè in Iberia, que



occidentem spectat, cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur. vrinam vehementius pellit, multo satiuâ acrior. Aegineta. Eruca similis erysimo est, temperamēto flatulēta, ob quod ad venerē instigat. semen ipsius urinā quoq; mouet. Syluestris domestica valentior est.

ῥαχὸς.  
Non est  
hæc du-  
relle vul-  
garis

ERVILIA genus est leguminis, folio q̄ faba longiore, flore apibus gratissimo, ideo circa alucaria feri præcipiunt. Eisdem quibus lens pinâtur modis. At eruilia syluestris herba est, amaritudinis eximiâ, colore & folio cicerculæ, quanquam minore.

ῥοβος.

ERVVM paruus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valvulis habēs, è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi vsus conueniens. Parandæ farinæ ratio hæc est: vberiora grana candidâque deliguntur, permiscendoque aqua resperguntur, donec sufficienter combibant. postea torrentur, vsq; dum hians cortex disrumpatur. molitâque, farinario cribro incernuntur. postremo farina recõditur. Aeg. Eruum cal. 1. sic. 2. cum amaritudine, quapropter incidit, detergit, obstructa aperit: liberalius sumptū, sanguinem per vrinam expellit.

πλατύ-  
φυλλος.

ESCVLVS, vel æsculus inter glandiferas folii amplitudine præstat. Hinc Græci platyphyllon, id est latifoliam vocât, vt quibusdam placet fago proceritate & glande inferior est. Galla visu quidē quernæ nō dissimili nisi



nisi quod lenior, sed ad rem nullam utili: verum alteram nigram habet, qua lanæ inficiuntur. Fert glandem hispido calyce, grandæ, bonam, fungosam, carnem fieri ea tradunt. Folium graue, carnosum, procerum, sinuosum lateribus. Quantum corpore eminet, tantum radice descendit. Autumno reddit fructum, si Vergilio credimus. (Per multa quæ assignantur latifoliæ tam à Theophrasto, quam Plinio, in esculo etiam inueniuntur: quapropter si non eadem sit, ab ea tamen non multum diffidet.)

**E V O N Y M O S**, aliqui anonymon vocant, quum alibi, tum in Lesbo insula proueniens, punicæ mali magnitudine, atque folio eiusdæ, maiori quàm vinca peruinca, & ut punica tenero. flore albæ violæ proximo, odore graui ac pestifero, folliculis sesami, in quibus acinus quadrâgulus, solidus, siue spissus, qui in versus quaternos digeratur, pecori gustatu letalis, sed & capris præcipue mortifera sunt & folia, nisi præcipiti alui deiectione succurratur. Germinat mense septembri, floret vere. Arbor est infelix.

**E V P A T O R I V M**, fruticosa herba est, vnicum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalè, interdum amphorem: foliis per interualla quinquefolii, aut cannabis magis similibus, quinquepartito aut amplius diuisis, nigricantibus, herbari-

ἑυώνυμος  
Fusaria  
ou fusaria  
num

ἑυκατόριον.  
off. agri-  
moine,  
notamen  
herbari-



orū q̄ est per ambitū ferratis. semen medio caule er-  
 hydropi pit pilosū, deorsum spectās, quod siccatum  
 per vestibis inhæret. Nec desunt qui aberrantes,  
 argemonem hanc appellarint, cum tamē lon-  
 gē alia sit, vti exposuimus. Aegin. Tenuem  
 vim & incidentē sine cōspicuo calore habet,  
 qua iecur obstructum expurgat, est & nōnūl-  
 lins astrictiōis particeps.

*εὐφώ-  
 βιον.*

EUPHORBIA Libyca arbor est, ferulæ  
 speciem habens, quę in monte Atlante iuxta  
 Mauritaniā inuenitur. ea acerrimo succo tur-  
 get, cuius eximium feruorem expauescentes  
 incolæ, ouillos vêtres elutos, arbori circumli-  
 gant, & eminus caulem contis incidunt, con-  
 festimque è plaga, perinde atque vase quo-  
 dam, in ventriculos copiosus lactis humor ef-  
 fluit, præter id quod humi sparsum, vulnus  
 eiacularur. Duo succi genera, vnū orobi ma-  
 gnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum  
 in ventriculis concrevit, atque vitreū specta-  
 tur. Eligendū est translucens, & acre. Euphor-  
 biū adulteratur sarcocollæ & glutini mistio-  
 ne. sed difficile quidem experimentum, quip-  
 pe cum leui gustu, os accēsum diu detineat,  
 adeo vt quicquid ori obiiciatur, planē eu-  
 phorbium resipiat. Eius inuētio tempore Iu-  
 bæ regis Libyæ cognita extitit. Aegin. Adu-  
 rentem vim sortitum est subtilēmq̄, aliis li-  
 quoribus similiter.



F

**F**ABA non multū à medio tēpe-  
ramēto recedit, siue refrigerādo κνῆα μοσδ  
siue siccādo: caro ipsius nōn ul- Focue

lius etiā absterforiæ qualitatē est, excreatio-  
nibus è thorace & pulmonibus utilis. Quū  
autem cortex fabæ nonnihil quoque astring-  
gar, tota ipsa in posca decocta cœliacis & dy-  
sentericis conducit, illita verò inflammatio-  
nibus & tumoribus medetur, lac in mammis  
extinguit.

Aegyptiā **FABA**, quam aliqui Ponticam κνῆα μοσδ  
vocant, in Aegypto plerunque prouenit. in αἰγυ-  
Asiæ etiam Cilicięque lacubus inuenitur. Fo- πιος.  
lia habet ampla, etiam si ad arborū frondes  
comparentur: caulem cubitalem, digiti crassi-  
tudine: florem roseum, dupla papaueris am-  
plitudine. & ubi flore exuitur, fert folliculos  
vesparum fauis similes, in quibus faba supra  
operculum, bullantis ampullæ modo, pro-  
minet. Cibotion ideo nominant, id est arcu-  
lam, quoniam seratur ipsa, humenti glebæ  
mandata, & ita in aquam demissa. Radice fir-  
matur harundine crassiore. quę cruda coctā-  
ue estur. ei colocasiæ nomen est. Faba vi-  
rens manditur, & exiccata nigrescit, vul-  
garem magnitudine superat. Aegineta, Ae-  
gyptia faba humidior nostra est, & excre-  
mentitia.

**FAGVS** easdem quercui vires habet, sed φρυγες.

g ij



Fou,  
faux, fou  
teau, ou  
hestre  
βάριξ.  
Ferule

intensiones vt etiam ilex. tenera eius folia illita non instrenuè siccant. (Alterū fagi genus quod Latini sciscimā vocant) in oxya quere.

FERULA. caules, si edantur, capitis dolores faciunt. muria condiuntur. Ferula itaque caulē profert ternū sæpe cubitorum: folia fœniculi, longè asperi ora & latiora. qua ab imo caule vulnerata sagapenū efficitur. Aeg. Ferulę semen extenuat calfacitq; medulla ipsius viridis adhuc astringit, eoq; sanguinem spuentibus, & cæliacis accommodatur. (De Sagapeno suo loco dicemus.)

σῦκον.  
Figuier

FICUS arbor calidi tenuisq; temperamenti est, adeo vt liquor & foliorum succus non rodat modò aut abstergat vehementer, sed etiam exulceret, ora venarum aperiat, & myrmecias exterat. quin etiā purgandi vim obtinet. At syluestris ficus quam caprificum vocant, in omnia efficacior est domestica. Ficus fructus aridi in secūdo ferè ordine siccāt. (Galenus habet, cal. 2. nō autem sic. 2. videlicet principio secundi, aut fine primi calefaciunt) pingues autem, duros tumores magis maturant, acriores detergunt discutiuntque. Decoctum ficuum mellis speciem referens, quod iam nonnulli siræon appellāt, viribus melli respondet. Virides quidem ficus imbecillioris virtutis sunt, vtræque tamen & virides & aridæ aluum subducunt. At ficus caprifici acres & discussoriæ sunt, quemadmo-



dum ex domesticis grossi.

TRICHOMANES nascitur eisdem in locis quibus adianton, filici simile, sed exilius: foliis lenticulæ, tenuibus, in ordinē vtrinque digestis, aduersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quæ & adianton præstare posse constat. Galenus, Trichomanes, quæcunque adiantum, efficit.

τριχομα  
νής.  
capillus  
veneris

FILICULA nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, præsertim quercuū, palmi altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura. radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu polyporū, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbaei, austera aliquantum, & gustu subdulcis, Aeg. Sic. abunde citra morsum. potum, inferius purgationem molitur.

πολυπό-  
διον.

FILICI folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine exeūt, multifida, & lateribus pinnata, subgravi odore: radice per summa cespitem nigra, oblōga, filices multas fundente, subastringēte gustu nascitur in montibus & saxosis. Filix

πίευσ.  
Feugiere

θυλύνπι-  
ς.



corrumpit, latosque lumbricos enecat, instar quatuor drachmarum cum malsa pota. Quoniam vero modicè cōstringit, vlcera citra rōsionem desiccare potest.

FLAMMEAM violā in scopa regia describemus.

μαράθρον  
Fœnuil

ἱππομά-  
ράθρον.  
ἱππομά-  
ράθρον.  
ἑτέρον.

FOENICVLVM in Iberia quæ ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret rustici demetunt, ignique admouent, quo facilius vi coloris exudans, gummi remittat. quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum. Est & syluestre fœniculum, magnum. fert autem semen cachryi simile, cuius radix iucundè olet. Traditur aliud hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio, semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo respondet, ad omnia infirmius. Aeg. Cal. 3. sic. 1. Hinc etiam lacti generando est, & suffusis auxiliatur.

τῆλιν

Freses

FOENVM GRAECVM ex secundo ordine calidum est è primo ficcum, idcirco feruidas inflāmationes irritat, minus autē calidas & induratas magis discutiēdo per sanat.

FRAGA gerēs herba sine caule spargitur humi, multis à radice lanuginosis pediculis, flore candido folio trigemino, per ambitum serrato atque venoso. fructu exiguis quidem moris haud ab simili, cæterum sui generis,



solido calloso, tenero, rubente, tū gustu tum  
etiā odore suauiss. radice foris atra, intus can-  
dida, multo fibrata capillitio. fronde perpe-  
tua. Cultus diligentia non magnitudine so-  
lum proficiunt, sed interdum etiam è rubris  
in candida degenerant. Herba cibo sumpta  
medetur lienosis, itē succus ex melle potus.  
Idem cum pipere candido datur suspiriosis.  
Fraga sitim sedant, stomacho profunt, præser-  
tim bilioso. Succus fragis exprimitur vetusta-  
te vires accipiēs, præsentaneo remedio ad fa-  
ciei vlcera, oculorū suffusiones, epiphorásq;.  
Radici decoctū iocinoris feruores mulcet  
matutino & meridie potum. Cal. sic.

**F R A X I N V S** arbor nota est. Agin. Folia  
eius pota viperarū morsibus succurrūt. Cor-  
tex crematus illitusque ex aqua lepras sepa-  
rat. Ligni verò ramenta si bibantur, letalia ef-  
fe ferunt.

μιλία  
Fresne

**E R V C I** marini generibus quoddam la-  
tum, & alterum sublongius, & rubens. tertiū  
candidum nascens in Creta, floridum valde,  
quod nulla corruptionis labe polluitur. Hoc  
fuo quidam putant mulieres suum colorem  
mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem no-  
minis qua sese fucant. Aegineta, Refrigerat  
siccátque in secundo abscessu, ac mediocriter  
etiam astringit.

φύκος  
θαλάσ-  
σιον.

**F Y M A R I A.** vide Capnos.

**F V N G O R V M** differentia duplex. aut  
g iij



enim māduntur, aut perníciales sunt. Multis de causis venenosi gignūtur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit, aut si iuxta serpētis cauernam, arborésve, quę priuatim pariunt noxios fructus, erumpant. Continent qui tales sunt, nescio quod strigmentum concretamque pituitam, terraque eruti quàm celerrimè computrescunt, atque marcore vitiantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent. largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangulant, aut choleram morbum citant. Aegineta, Frigidi & humidi admodum tēperamento sunt: nōnulli ipsorum manducati etiam exitium adferunt, præsertim qui inter ipsos natura constant putridæ qualitatis participes.

G

γαλβάνη

G

ALBANVM succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopium vocant.

Maximè laudatur cartilaginosum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minimè lignosum, retinens nōnihil adiecti seminis & ferulæ, graui odore, neque valde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina & ammoniaco. Si purgare galbanum voles, in feruentem aquam demittito, namque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt, quas hoc modo facile



separabis : mundo linteo raroque alligatum in fictili aut ærea pyxide ita pendeat, ut imum vasis non tangat : opertoque vase in feruida aqua demittito : sic enim sincerum veluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit. Aeg. Calfacit 3. sic. 2. Molliendi & discussoria vi donatum.

GALION, nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat. Γάλιον  
ramulum foliumque habet aparinae simillimum, rectum : florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. radix vernerem concitat. Nascitur in palustribus. Aeg. Siccandi vim, mediocremque acrimoniā habet : flos eius ad sanguinis ex naribus eruptio-  
nes & ambusta congruit.

GALIOPSIS, frutex in totum caulem γαλίopsis  
& folia habet viticæ, leuiora, & quæ grauem Videt eē  
odorem trita reddant : flore purpureo tenui. agripal-  
nascitur circa sepes, ædificiorum areas, ac se- ma offic.  
mitas ubique. Aeg. Scirrosos tumores dissipa-  
pat & emollit. item ad vlcera serpentia facit  
emplastri modo imposita.

GALLA fructus est quercus. Aliqua om- κηκίς  
phacitis appellatur, parua quidē, sed tubero- Noix de  
sa, solida, nullo foramine peruia. altera pla- galle.  
na, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis,  
quæ efficacior est. Aegineta. Omphacitis, id  
est immatura medicamentum est affatim a-  
stringens, eamque ob causam siccatur, fluxio-



nes repellit contrahitq; laxa stringit, & partes imbecillas firmat, fluidisque omnibus affectionibus accommodata est. Frig. 2. sic. 3. Altera quæ flauo colore inanis magnaq; est, non tantam in siccando & astringendo habet efficaciam, sedis inflammationes, & procidentias excocta iuuat. Gallæ vero combustæ, & aceto restinctæ, sanguini supprimendo sunt.

γλαῖρος.

GALLICA, genus est aceris campestre, præcipuo candore, minus crispa, rariorq;.

GALANGAE magnus usus apud recentiores medicos tã Græcos quàm Latinos erupit. Radix vulgò etiam nota, quamuis aliunde procul comportetur. Deligèda ponderosa, rubenti cortice, gustu per quàm acri, odorata. Sunt nebulones, qui in tortis iunci radicibus in aceto piperato maceratis galangæ mentiantur acrimoniam: sed impostura detegitur, cortice derafo, qui hunc sapor emebiberat. Cal. 3. coctionem iuuat. stomachi ex frigida causa dolores finit. spiritus digerit cocta ex vino. Cerebrum roborat naribus indita. Os commendat. Ex succo plantaginis datur quibus cor palpitans micat. Coeliacis, & coli doloribus noxio spiritu conceptis auxiliatur. acidis subuenit ructibus.

γεντιανή  
Géciane. GENTIANAE inuentio prima assignatur Gentio Illyriorũ regi, à quo cognomen habuit. foliis partim proximè radicem,



iuglandi plantaginive similibus, subrubris, partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumen, paulum dissectis: caule cauo, & levi, digiti crassitudine, geniculato, & ex intervalis maioribus foliato, binum sæpe cubitorum: semine in calycibus lato sine pondere, aceroso, satis ad spondylii semen accedente: radice longæ aristolochiæ, crassa, amara. Nasce- tur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisque. Aegineta, Gentiana radix efficax admodum est extenuare, per- purgare, abstergere, & meatus infarctos a- perire.

GERANTION. foliis anemones, diuisi- ris longioribus: radice sub rotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. Geranium alte- rum, caulibus minutis & pilosis, sesquipeda- libus: foliis maluæ. in summis alis sursum spe- ctantia gruum capitula insunt, cum suis ro- stris, aut canini dentes. Nullius in medicina vsus. Aeg. eadem.

GERONTOPOGON, id est, senilis bar- ba: foliis est hirci barbulae, tenuioribus, lon- gioribusque, instar capillorum prælongis: caule paruo, super quæ calyx lógus, & barbula quæ summo vertice senû more incana funditur. flore luteo nitet, qui involucre barbulas eua- uanescat. lacte manat. radix est amara. ioci- norosis & stomachicis succus decocti potus

γεράνιον.  
Duplex,  
vna offi.  
acus pa-  
storis  
alt. pesco-  
lumbin<sup>o</sup>.

γερωντό-  
πων.  
vulg. bar-  
be de p-  
stre, ou  
barbe de  
Dieu.



conuenit. Renum vitiis & vesicæ succurrit.  
Ex aceto ciet vrinas. Semen singultus sedat,  
aluum sistit, & intestinorū inferctum expli-  
cat. (Quantum ab hirci barbula differat ex  
Græci nominis descriptione, id est tragopo-  
gonis, conferendo discere potes.)

γῆθρον.  
Siboule  
oucebule  
ou ciuôs.

GETHYVM Theophrasto penè sine ca-  
pite est, ceruicis tantum longæ, & ideo totū  
in fronde, sepiusque refecatur, vt porrū: qua-  
propter & illud ferunt, non deponunt, mensi-  
bus Martio, Aprili, & Maio. Secunda semen-  
te post æstiuum solstitium defigitur. Deci-  
mo aut duodecimo die profilit, sed è recenti  
semine maturius. Nō anniculum modo, sed  
& bimum quoque fructificat. Germinat è la-  
tere, vno caule confurgit, sed quo radix ipsa  
deficiatur, foliis intus cauis. Condimentari-  
um est, & ceparum generis. Minimè autem  
durat. Plinius à Latinis pallacanā vocari tra-  
dit. Sunt è Græcis qui gethyllida pro gethyo  
acceperunt, quod & epithyllida vocauerunt.  
Didymus gethyō simile fecit ampelopraso.  
Epænetus capitatum porrum gethyllida tra-  
dit appellari.

γῆον.  
Mors a  
diable.

GEVM radículas habet odoratas, & iucū  
di saporis ad discutiendas cruditates, pecto-  
risq; & laterum dolores.

GINGIBERIS sui generis planta est,  
γινγίβη in Troglodytica Arabia magna ex parte na-  
gîngēbre scens. qua virente, ad multa, perinde atque



nos ruta, vtūtur, & primis potibus & edulis  
admiscent. Huius radices, cyperi modo, par-  
uæ sunt, candicantes, & odoratæ, atque piper  
sapore imitātur. Eligi debent quæ teredines  
non nouerunt. A multis tamen ob id cōdiun-  
tur, quòd celeriter cariem sentiant. Ficilibus  
in Italiam asportantur. Gingiberis cibo con-  
ueniens est, & cum condimento assumitur.  
Aegineta. Impensè quidem calefacit, sed nō  
primo statim occurſu, quod ineuictas cuius-  
dam & crassioris humiditatis particeps sit,  
propter quā etiam facile perforatur, firmam  
autem conseruat caliditatem.

GINGIDIVM, aliqui lepidion, in Sy- γιγγιδί-  
ria & Cilicia plerunq; nascitur. herbula syl- ov.  
uestri pastinacæ similis, tenuior, & amarior, Non est  
radice parua, candicāte, subamara. Olus hoc hęc fuma-  
crudum, coctum, conditū me estur. Aeg. Ca ria, sed  
lorem non adeò manifestum sortitū est, cate cherefo-  
rum fccat in abscessu tertio & astringit, qua lium.  
de causa & stoma. 'io vtile est.

GITH exilibus surculis fruticat, sæpe bi- μιλάνθι-  
nos dodrantes excedens: foliis, vt senecionis ov.  
minutis, sed multo tenuioribus: capitulo in Nyelle.  
cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblō-  
go, intercurſantibus intus membranīs, quib⁹  
semē includitur nigrum, acre, odoratū quod  
panibus inspargitur. Aeg. Calefacit, fccat  
tertio. tenuis est substantię, vnde destillatio.  
nibus in nares olfactu prodest, intus assum.



pta discutiendis flatibus singularis est: quin-  
etiam amari particeps deprehenditur, quo  
lumbricos interficit: abstergit & incidit, hinc  
quoque recta ceruice spirantibus commodè  
exhibetur. item lepras exterit, myrmecias  
eiicit, & menstrua incitat.

*ξιφίον.* XIPHION, alii phasganon, alii mache-  
offic. spa- ronion, Romani gladiolum, vocant. nomen  
thula fœ inde accepit, quod foliū gladii præbeat spe-  
rida. ruri ciem. iridi simile erat, nisi minus & angusti-  
gladius. us videretur, & gladii modo mucronatū, ner-  
falso lon uosumque in caulem exit, cubitalem, in quo  
chitis exi purpurei flores, in ordinem digesti, inter se  
stimatur. distant: rotundo semine: radicibus geminis,  
vna, bulborū modo, super alteram insiden-  
te. quarum inferior gracilis est, superna vbe-  
rior. nascitur in aruis. Aegineta, Gladioli ra-  
dix trahit, discutit, & ficit.

GLANDES, in quercu indicabuntur.

*καστανά,* GLANDES SARDIANÆ, quas aliqui casta-  
Chastai- neas, aut lopima, aut glādes Iouis appellant,  
gnes. similēsque effectus præbent, præsertim tunica  
quæ carnem & corticem media intercurfat.  
caro his qui ephemerum biberūt, conueniēs  
est. Aegineta, Castaneæ omni ex parte reli-  
quis glandibus præcellunt.

*βάλανος* GLANS vnguētaria, fructus est arboris  
*μυρτι-* myricæ similis, in magnitudine auellane nu-  
*κίη* cis, cuius nucleus græcarum nucum more tri-  
tus, humorē reddit, quo ad preciosa vnguen-



ta pro oleo vtuntur. nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæam. Præfertur plena, recens, candida, quæ faciliè delibretur. Aeg. Quæ intra vnguentariam glandem ceu carnosæ sunt, abstergerendi incidendiq; cū astrictione vim habet, eamq; ob causam denarii vnus pondere cum multa pota, facile vomitiones cient, & inferiore ventrem subducit, cum posca verò laxandis extis accommodata sunt. Item cutis vitia cum aceto peruncta exterunt. Cortex alioquin egregia astringendi virtute pollet.

**SATIIVVM** glastum quo infectores la- *isatis*  
narum vtuntur, folium habet plâtagini simile, Guedum  
verū pinguius nigriusq; . cuius caulis duū ou guel-  
cubitorum altitudinē excedit. Syluestre gla- dum ou  
stū satiuo simile est, folia fert maiora, lactu- lherbe de  
caceis proxima. caules prætenues multos. S. Philip-  
dos, quadam tenuis rubentes: in quorum ca- pe. ou In  
cumine folliculi multi dependent, quandam dicū à co  
linguarum effigiem referentes, in quibus se- lore. pa-  
men, flore tenui, luteo. Eadem quæ & suprâ stilli ab  
dicta præstat. potu & illitu lienosis auxilia- effigie.  
tur. Aegineta, Isatis domestica qua tinctorum  
vtuntur, siccandi vires & astringendi habet.  
hinc est quod magna vulnera in duris gluti-  
nat corporibus, sanguinem erumpentē com-  
pescit, laxos tumores discutit, ac omnibus  
malignis vlceribus resistit. Syluestris au-  
tem cum magis rodat, magisque ideo siccet,



valentius aduersus humiditas putredines pugnat, ad cætera deterior, vt quæ immoderatus mordeat. Cæterum ob virium vehementiam lienosis quoque vtiliter adhibetur.

γλαυκίον  
memitha  
offi.

GLAUCIUM, succus est herbæ quæ ad Hierapolim Syriæ nascitur, foliis ferè corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terrâ sparsis odoris tetri, gustus amari. tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, vsquedû flaccescant, deinde contusis succum exprimunt. Aegineta. Glaucium astringit, gustanti nonnihil ingratum, manifestè refrigerat, eaq; vi sacris ignibus non validis succurrit.

γλαύξ.  
Nomen  
vulgo nō  
habet.

GLAUX cytiso & lenticulæ foliis similis, quæ supernè virent, auersaq; candidiora spectantur. ramuli à terra exiliunt quini senive, tenues ab radice, dodrantè alti. flores ceu violæ albæ, purpurei exeunt, minores tamen. nascitur iuxta mare. Aegineta, Calidi & humidi temperamenti gratia lacti generando idonea est.

γναφάλιον.  
Vulg. cruciata.

GNAPHALII foliis mollibus minutisque pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero, ad dysenteriam. Sunt enim calida & modicè astringentia. Aeg. (Vide Clematis tertia.)

γοσσίπιον.  
ἄγρωσις.

GOSSIPIVM in Xylo declarabitur.  
GRAMEN geniculatis serpit ramulis, à quibus



quibus crebro radices spargit dulces, articulis præcinctas. folia dura, & ut arundinis parua, lata, in exilitatem fastigiantur, eaque iumenta & boues pascunt. Est & arundinaceum gramen, priore multo maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in Babylone: idque iuxta vias nascitur. Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat: foliis hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inutiles: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus. Natum in Cilicia gramen, quod incolæ cinnam appellant, boues inflammat, si eo virenti sæpe pascantur. Galenus: Graminis radix mediocriter frigefacit & siccatur. Parum aliquid mordax habet ac subtile. Herba frigefacit primo, inter humidum & siccum media. Huius semen alibi quidem imbecillum est, in Parnaso autem inuentum siccatur, subtile, subacribumque est.

GROSSI, quæ erinci nonnullis vocantur, acres & discussorii sunt, liquoris gratia qui in ipsis continetur. Cocti igitur duros tumores dissipant: crudi myrmecias & thymos exterunt. Aegineta.

GUMMI siccante vi & emplastica pollet, & nimirum asperitatibus medetur.

ὄλυνθοι.

κόμμι.



## H

ἄλιμος.  
Blanche  
putain.

H

**A L I M V S** frutex est sepimentis idoneus similis rhamno, sine spinis, foliis oleæ, sed latioribus. nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Aeg. Dissimilarium paritium est, salsum gustu, & leuiter astringens, maxima ipsius pars calore temperata cum humiditate insuperabili est, & lactis ubertatem conciliat.

ἡ ἄλαμος  
Câne ou  
arunde.

In **H A R V N D I N V M** genere quædam nastos, id est farctior, vocatur, ex qua sagitte factitari solent. alia scemina, qua tibiæ ligulas efficiunt, alia quod fistulis addita sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. alia crassa, concaua, apud amnes nascens: quæ à quibusdam cypria, ab aliis donax appellatur. alia phragmites seu vallatoria, gracilis, cadicans, vulgo cognita. Aeg. Calamus phragmites extergit, folia ipsius viridia mediocriter refrigerant. Cortex crematus calfacit, siccat tertio. Radicem cum bulbis illitam spicula & aculeos extrahere asserunt.

ἡ ἀσφὸδελος.  
haste roy  
alle. offi.  
afrodili.

**H A S T V L A** regia vulgaris notitiæ est, foliis maioris porri: caule læui, ferente in capumine florem, quem anthericon appellant. radices subiacent oblongæ, rotundæ glandibus similes, gustu acres. Aeg. Asphodeli radix vim habet detergentem discutientemque.



Concremate autem ipsius cinis calidior, sic-  
cior, & tenuior euadit, quo fit vt pilorū de-  
fluuiis medeatur.

HEDERA differentias multas in specie κισσός.  
fortitur, summas autē genere treis. Nam quæ Lierre.  
dā candida est, altera nigra, tertia helix can-  
dida, fructū fert candidum: nigra nigrū, aut  
croci emulum, quā vulgus Dionysiam vocat.  
helix fructū non gignit, sed albas habet viti-  
culas, & folia parua, angulosa, & concinnio-  
ra. Aeg. Hedera contrariis constat viribus, vt  
quæ astringat & refrigeret. Item acris est &  
calida, aqueæ substantiæ & tepidæ, cum viri-  
dis est, particeps. Eius folia vino incocta vul-  
neribus glutinandis, ambustis & lienosis sa-  
lutariter adhibetur. Succus ipsorum naribus  
ad pituitam educendam iufunditur. diutur-  
nis aurium defluxionibus succurrit. Lachry-  
ma hederæ, vt quæ acrior sit, pediculos enec-  
cat, & pilos abolet.

HEDYSARON, vide Securidaca.

HELENIVM folia habet verbasci angu- ἑλένιον.  
stioris folii, asperiora, oblōga: caulem qui- offi. enu-  
busdam in locis non emittit: radicem subal- la. rut. cā  
bidam, interdum subrufam, odoratam, suba- pane, ou  
crem, vegetam, magnā, ex qua agnatæ pro- enulacā  
pagines liliorū aut ari modo seruntur. Mon- pana.  
tibus in vmbrosis, siccoque solo prouenit. Fo-  
ditur æstate radix, particulatimque dissecta  
siccat. Alterum helenii genus in Aegypto



gigni Crateuas tradit. herba est cubitalibus ramulis, serpilli modo per humum repentibus: foliis, lenticulae circa ramos, sed longioribus crebrisque: radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassa cortice nigro. Nascitur in maritimis collibusque. Radix vna in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur. Aeg. Heleniū calidum est & siccum cum excrementitia humiditate. quare & eclegmatis temperatū infarctos thoraci humores educit: ac particulae ex eo ruborem contrahunt.

ἡλιότρο-  
πιον.

herb. flos  
cācri. fal-  
lūtur, qui  
soulfiz  
putēt, aut  
offi. calē-  
dulā, aut  
solis spō-  
sam.  
Siue scor-  
piuron.

HELIOTROPION magno flos est effigie scorpionis caudae, vnde scorpiuro ei nomen. & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. folia ocimi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora. ramuli à radice terni, quaterni, aut saepe quini exiliūt, multis alis concavi: flos in cacumine candidus, aut subfuluus, incuruatur vt scorpionis cauda. radix tenuis est, & inutilis. nascitur in asperis. Heliotropion paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, foliis antedicto proximis, rotundioribus: semine acrochordonum verrucarum modo, pensili rotundo. Aegineta, Maius calidam, siccam & abstergentē vim praese fert, cuius decoctū potu educit pituitā, bilēque. Illitu fructus ipsius myrmecias & huius notae vitia perficcat. Minus autem heliotropium & haec abolet, & lumbricos in-



terimit, si cum fructu, nitro, hyssopo, & cardamomo bibatur.

HELXINE nascitur in parietinis, sepi- ἐλξίνη  
bus & maceriis, folia ei mercurialis insunt, Parietai-  
hirsuta: cauliculi subrubentes, & circa eos ve re ou mu-  
luti semina aspera, adhærentia vestibus. Aeginaile,  
gineta, Hanc alii aliter nuncupant, perdi-  
cium, parthenium, sideritim, heracliam. ab-  
stergit, leuiter astringit cum humiditate sub-  
frigida,

HELXINE cognomēto cissampelos, fo- ἐλξίνη  
liis est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, κισάμπε  
quibus complectitur quodcunque contige- λος.  
rit adminiculū. nascitur in sepibus, vinetis, & vineage,  
segetibus. foliorū succus potu deicit aluum. ou vitreo  
Aeg. Vim habet discutiendi. le.

HEMEROCALLIS foliū & caulem ha ἡμερο  
bet lilii, porraceo colore. flores in caule per καλλίς.  
singulosexortus terni, aut quaterni crūpunt, liliū agre  
liliū diuisura, quoties dehiscere cœperunt, co ste ou  
lore per quā pallido. radix magna est at- marinū.  
que bulbosa. Aegineta, Radix eius viribus  
lilio respondet, similiter illi ambustis opi-  
tatur. ἡμιονίς

HEMIONITIS, quam aliqui splenion Falso ab  
vocant, folium emittit dracunculi, lunatum. off. scolo  
radicibus cohæret multis, tenuibus. nunquā pendria.  
flores, neque semen, neque caulem gignit. in ab herb.  
petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto nōnullis  
pota licnem absomit. Aegineta, Astringens lingua  
cerui.



simul & amara est, idcirco lienosis cum aceto pota succurrit.

*Ἡρμόδακτος*. *HERMODACTYLI* radix per se, & ipsius decoctum, vim habet purgandi: arthriticis priuatim cum humores defluunt exhibetur. Stomacho vehementer aduersatur. *Aegineta*.

*Ἰακίνθος*. *HYACINTHVS* folia habet bulbi: drantalem caulem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam: radicem bulbaceam. *Aeg.* Radix siccatur primo, frigefacit secundo. Pueros itaque impuberes diu conseruare cum vino illita creditur. Semen leuiter abstergit astringitque, idcirco arquatis cum vino datur, vt quod desiccet magis quam refrigeret.

*Ἰδρωπάθιον*. *HYDROLAPATHYM* rumex est in aquis nascens.

*Ἰδρωπίπεριον*. *HYDROPIPER* apud aquas nascitur quæ stagnat, aut pigro lapsu repunt. caulem off. & me edit geniculatum, prædurum, multis alis condici p cu cauum: folia menthæ, maiora, molliora, canpatorio didioraque, gustu piperis, acri, citra tamen falso vnt vllam odoris gratiam: fructum acrem, in surquemad. culis paruis, prope folia racematim coherenmodum & tem. Folia cum semine illita tumores veteresque curage duritias discutiunt. sugillata delent. quæ post & plicare quam inaruerunt, tusa pro pipere in obsoniis velint esse. admiscentur. Radix parua, nullius in medi-



cina momenti. Aegineta. Herbula est calida, sed non piperis modo. Facultates similiter Dioscoridi docet.

**HIERACIUM** magnum, caulem emit-  
tit asperum, subrubrum, spinosum, cauum:  
folia ex interuallis rariusculè diuisa, similia  
soncho per ambitum: luteos flores in oblon-  
gis capitulis. Vim refrigerandi habet, & mo-  
dicè substringendi. vnde illitum, stomacho  
æstuati, inflammationibúsq; prodest. succus  
erosionem stomachi sorbitione mitigat. her-  
ba cum radice illita, vibratis à scorpione icti-  
bus auxiliatur. Hieracium paruum, folia  
ex interuallis habet, diuisa in ambitu: cauli-  
culos teneros, virentes, in quibus lutei flores  
orbem circinātes emicant. Vim suam ad ea-  
dem ad quæ superior impendit. (Aegineta  
non habet.)

ἱεράκιον  
μέγα.  
cichoree  
iaulne.

ἱεράκιον  
μικρόν.  
cichoree  
fauluage

**HYOSCYAMUS** vide in litera, a. fo. 24

**HYOSIRIS** intubo similis traditur, sed  
humilior & tactu asperior. Vulneribus con-  
tusa præclarè medetur.

ὑόσιρις

**HYPEROON**, aliqui hypopheon vocāt.  
nascitur in segetibus aruísq;, foliis rutæ, exi-  
libus ramis. Aegin. Frig. 3. papaueris viribus  
proximum.

ὑπέρκον.

**HYPERICUM**, alii androsæmon, alii  
corion, alii chamæpytyn appellant, quoniā  
semen odore resinā imitatur, furculaceo fru-  
tice, dodrantali, rubente, folio rutæ: flore al-

ὑπερικόν  
mille per  
tuisou p-  
forata.  
vulg. ou  
herbe S.  
Ichao.

h iiii



be violæ, luteo, q̄ digitis tritus sanguineū suc-  
cū remittit, qua ex causa androsæmon cogno-  
minatur: subhirsuta filiqua, & tereti hordei  
magnitudine, semine intus nigro, resinosi o-  
doris. gignitur in cultis & asperis. Aeg. Hype-  
ricum duplex est. Alterū, quod androsæmon  
& ascyrrhon appellatur, expositum est: alte-  
rum verò calefacit & siccatur, tenui substantia  
præditū, cōq; vrinas elicit, & menstrua citat.  
Totum ipsius semē si cum foliis illinatur vi-  
ride, cicatricē vulneribus obducit. Arida ve-  
rò folia oblita vlceribus medentur. dantur  
etiam potioni aduersus coxarum dolores.

Al. hypo  
glosson.  
ὑπόγλωσ-  
σος.

HIPPOGLOSSON, frutex est folia ha-  
bēs rusci tenuis figura, & spōsam comā, & in  
summo ceu linguas ē foliis exeūtes. Capitis  
dolorem corona ex comis imposita minuit.  
malagmatis radix succūsq; admiscetur. Aeg.  
Frutex est pusillus, cuius radix & succus e-  
molliendi virtute pollent.

ἵππολά-  
παθον.  
offi. pari-  
celle, ou-  
grāde o-  
zeille.  
vulg. pa-  
relle.

HIPPOLAPATHON olus est ma-  
gnus in paludibus nascēs. easdem habet vi-  
res quas supradicta rumicis genera. Aëtius:  
Consimile est facultate lapatho, sed imbe-  
cillius.

HIPPOMANES, secundum Crateiam,  
planta est fructu cucumeris sylvestris, folio  
autem nigriori, tāquam papaueris spinoso.  
Hæc Theocriti interpres. Sed apocynon  
etiam hippomanes cognominatur.



**HIPPOPHAES**, quo fullones vestes interpolât, in sabulosis maritimisque nascitur, furculaceo frutice, vndiq; denso & largo, foliis oleæ longioribus, mollioribusque: inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angulosæ, interstitio quodam distantes. flores hederæ corymbis similes, racematim cohærent: minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes. radix lacteo succo madet, crassa mollis, amara gustâti. ex qua, perinde ac thapsia, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad vsum reconditur. Aegineta, Alij hippophyes vocant. Radicis liquor cum erui farina instar denarii datus, bilem ac pituitam purgat. Item totus ipse frutex siccatus, ad purgationes accommodatur.

**HIPPOPHAESTON**, id quod aliqui hippophaës appellât, nascitur eisdem locis quibus hippophaës, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: foliis parvis, spinosis radículas habens molles, crassas. Succus radice, foliis, & capitulo exprimitur, & exiccatur Aeg. Succus trium obolorum pondere, cum aqua mulsa ad pituitam & aquâ vacuandam exhibetur: maximè congruit non nisi subrepta ceruice spirantibus, comitialibus, & nervorum affectibus.

**HIPPOSELINYM**, Latini olusatrum

ἵπποφαίνε  
Lappago  
seu lap-  
pula

Al. hypo-  
phæston.  
ἵπποφα-  
στον.  
Lappago  
seu mol-  
lugo

Ache ou  
hacche



appellât, aliqui smyrnion. quamvis aliud sit, quod propriè smyrniō dicitur, vt paulò pòst referemus. Est autē maius, & satius apio candidius: caule alto, cauo, molli, habēte veluti lineas: foliis latioribus, in puniceum vergentibus: coma roris marini, florum plena, dependentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflorescat. ea semine turgēt nigro, oblongo acri, solido, aromatico. radix dimittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat. In umbrosis & palustribus enascitur. olerum generis, vt apium. radix cruda coctāve estur. folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudāque muria condiuntur. Aegineta, Cum apio domestico virtute cōuenit, nisi esset imbecillius.

H I R C I barbulam in Tragopogone describemus.

ὑσσωπος.  
Hysope

H Y S S O P V M, herba nulli non cognita, duūm generum est, montanum & hortense. Optimum est Cilicium. Aeg. Calefacit, siccit. 3. tenuisq; substantiæ est.

ὄλκος.

H O L C V S in saxis nascitur ficcis, aristas habet in cacumine tenues, culmo quale hordeū restibile. Hæc circa caput adalligata, vel circa lacertū educit aristas è corpore: quare nonnulli Aristidam vocauerūt. Multis eam esse contendunt inter saxa proueniētem. Alij syluestrem esse volunt auenam.



**H O L O S T I O N** quadratalis herbula est, *Al. δλο-*  
 humi repens: folius viticulisq; coronopo aut steum  
 graminei proximis, gustu astringentibus: *ra- δλόσεων*  
 dice alba, pretenui vsque in capillamenti spe Herb.  
 ciem, longitudine quatuor digitorū. nascitur mollegra  
 in collibus terrenis. Carnes coguntur, deco- men. ruri  
 ctionibus addita. Aegni. Siccatur, astringitque, canis deti  
 hinc eo ad rupta vtuntur.

culus &

**H O R D E V M** optimum est, candidum duua. nō  
 purūque. Aegineta, Frigefacit, siccatur pri- est hec pi  
 mo. Nonnihil etiam extergit. Cæterum faba losella  
 rum lomento siccitate præcellit, minus flatu  
 lentum est. Polenta hordeo multo magis sic- *κρίτη.*  
 cat. Præfana præter quod largius humectat, Horge  
 etiam abstergit vehementius.

**H O R M I N V M** herba est, foliis marru- *ορμινον*  
 bio similis, caule semicubitali, quadrangulo, Satiū,  
 circa quem eminentię siliquis similes prode- oruale  
 unt, quæ ad radicem spectāt, in quibus diuer- toute bō  
 sum semen recluditur. siquidem in syluestri ne  
 rotundum, fuscūque inuenitur: in altero, ni offic. gali  
 grum, & oblongum, cuius est vsus. Syluestre tricum  
 magis viribus pollet: quare vnguentis, præ herb. cen  
 ferim gleucino, permiscetur. Aegineta, Cali trūgalinē  
 dum est mediocriter siccum & abstergens, vulg. sal-  
 uerem igitur stimulat. oculorum crassities uia trans  
 cum melle repurgat, tumores laxos discutit, marina  
 & extrahit aculeos. Syluestre domestico est  
 valentius.



## I

Nō mul-  
tū differt  
à liferon  
ou life-  
rotte

## I

ASIONE olus est syluestre, hu-  
mi serpens, copioso lacte, flore  
candido, & in hoc nobili quod  
singulari folio constet, sed ita implicato, vt  
plura videantur, floris margine in angulos  
exeunte. Plinius florem Cōcilium ait appel-  
lari: sed quę Theophrastus de folio floris, ea  
Plinius de folio herbæ scribit. Commēdatur  
herba ad stimulandos coitus. Cruda, & ex a-  
ceto pota, lactis vbertatem præstat. Salutaris  
est tabem sentientibus. infantium capiti illi-  
ta, nutrit capillum, tenacioremq; eius cutem  
efficit.

ἰβηρίς.

Lepidiū  
syluestre  
fortē. her-  
ba. pratē-  
sis Vale-  
riana

IBISCVS, quęre Althæa.

IBERIS, siue cardamantica, folia habet  
nasturtij, vere virentiora: caulem cubitalem,  
aut minorem. in incultis nascitur. æstate la-  
cteam florē promit: quo tempore efficacior  
est. Radices duas nasturtio similes habet, cal-  
facientes & adurentes, ipse enim ischiadicis  
cū salsa axungia emplastri modo vtilis, qua-  
ternis horis alligatæ, vt dein in balneas descē-  
datur, & postea oleo cum lana locus perun-  
gatur. (Aeg. omisit.)

ἰδαία  
ῥίζα.

IDAEAE radici folia sunt ea quæ rusco.  
adhærent his veluti exigui pampini, in qui-  
bus flos. Aegineta, Gustu acerba, & viribus:  
sanguinis eruptionibus & reumaticis affecti-  
bus tum pota, tum extrinsecus imposita ac-



commodatur.

**I L E X** similes quercui vires habet, sed multo ea est validior. Galen.

**I L E X** est gemina Columelle, minor apibus quæ sita: & prolixior, omnibus improba ta mellificio.

πρίνος.

**I L L E C E B R A**, vide semperuium tertium. ἀνδρά-

**I L L E C E B R A**, quæ Græcis andrachne agria nonnullis minus semperuium, syluestris est portulacæ genus, maiori semperuiuo simile, nisi quod folia habet, pusilla, sed latiora, maculosaque: item breuius cacumē, fuluis cauliculis, gustu salsum, lacteo succo, radice tenui, candida. Nascitur in petris, & in sterquiliniis. Colligitur cibi causa, esturque cum ficibus. Succo bilem regio morbo laborantibus per aluum exigit. Ructus compescit acidos. Vētris tumores, & iocinoris vitia leuat, vrinam ciet. Eodem ægilopas Aesculapius curauit.

χρη.

ἀνδρά.

Pourpie

faulUAGE

**I M P I A** Plinio vocatur incana, roris mari ni aspectu, thyrsi modo vestita: inde alij ramuli adsurgunt, sua capitella gerentes. ob id impiam appellauēre, quoniam liberi supra parentem excellāt. Alij potius ita appellatā, quod nullum animal eam attingat, existima uēre. Hæc inter duos lapides trita feruet, præcipuo aduersus anginas succo, lacte & vino admixto. Mirumque traditur, nunquam ab eo morbo tentari, qui gustauerit: itaque &

offi. Chri  
stoculus



suibus dari, quæque medicamentum id noluerint haurire, eo morbo interire. Sunt qui & in auium nidis inseri aliquid ex ea putet, atq; ita non strangulari pullos avidius deuorantes. Floret vere, tuncque decoquitur ad serpentium morsus. Succo eius, vel etiam cinere, fistulas impleri tradunt.

INTYBUS. Quare Seris.

*Ἰόςαν*  
*Ἰος.* IOVIS flos inodorus est, nec nisi coloris gratia coronamenti additus: æstius est, colore purpureo.

*Coque-*  
*lourdes*  
*ἰερίσιμον*  
*Iron, ou*  
*bruca ge*  
*ratina,*  
*outorte-*  
*la*  
ERYSIMON, Latini irionem vocant, iuxta vrbes, rudera, hortosque nascitur, foliis cruce sylvestris: cauliculis in lori modum latis, & obsequiosis: floribus luteis: siliquis in cacumina gracilibus, ut fœnograeco, corniculatis: semine nasturtij, exiguo, vrentis gustus. Aegineta, Erysimi semen igneum calefactorium: que est, nasturtio similiter: quare in fermento tostum, thoracem purgat in eclegmatis assumptum, duritiasque emollit, & cæcos cancrios illitu adiuuat.

*ἶρις.*  
*Herb. cœ*  
*leste liliū*  
*rur. flāme*  
*ou glain*  
IRIS à cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, leste liliū latiora, & pinguiora. Flores à caule æqualibus inter se spatiis distat, varij: siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei, aut cœrulei conspiciuntur: qua diuersi coloris specie, quædam cœlestis arcus imago representari videtur. Radices subiacent geniculatæ, du-



ra, odorata: quæ frustatim dissectæ, in um-  
bra siccantur, & traiectæ lino reconduntur.  
Melior est Illirica, & Macedonica: & inter  
has laudatissima, quæ pumila ferè & densa  
constat radice, frangenti contumax, subru-  
fo colore, gustu amaro, odore perquam sin-  
cero, ita ut nullum prorsus situm redoleat.  
quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Se-  
cundum locum habet Africana, candicans,  
gustûque amara. Teredines in vetustate sen-  
tiunt, tûc tamen odoratiores reddi solêt. Ae-  
gineta, Affatim calfacit, extergit, & maturat,  
tenuis substantia, tussi utilis. humores in pe-  
ctore contumaces extenuat, torminibus me-  
detur, sordida vlcera purgat, cum mulsa pota-  
lium inanit.

ISCHAE MON serpit in terra milio simi *ἰσχαμον*  
les, foliis asperis, & lanuginosis. Thracia eâ *Miliû syl*  
inuenit, qua ferunt sanguinem sisti, non a- *uestre q-*  
perta modò vena, sed etiam præcisa. Farci- *dam esse*  
tur in nares ad cohibendum inde sanguinis *volunt*  
profluuium. Quæ in Italia nascitur, & san-  
guinem sistit eadem adalligata vnde cruor  
manat.

ISOPYRON aliqui Phasiolon ob simili *ἰσόπυρον*  
tudinem vocant, quoniam folium, quod est  
aniso simile, in pampino torquetur. capitula  
sunt in summo caule tenuia, plena seminis,  
melanthii gustû imitantis. Aeg. Semen ama-  
rum ac modicè acerbum est, ob quod crassos



glutinososque humores abstergit & incidit, sic vt corpora contrahat stringatq; hinc etiã quæ altè defident expurgat, excreationibus sanguinis non inefficax.

*σχοῖρος.* I V N C I duo genera. vnũ læuis nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera. Vnum sterile, reliquum fert semen nigrum, rotundum: & crassiore constat calamo, carnosioreque. Tertius est iuncus qui vocatur oloschoenos, prioribus carnosior, asperiorque. is similem supradicto fructum in cacumine parit. Aethiopici iunci semine somnus allicitur. sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat. Aegin. Oxyschoeni, id est, acuti iunci semen est somnificum: holoschoeni autem dicti, minus, idem & capiti dolorem facit. Vtriusque semen frixum si cum vino bibatur, alui fluores desiccet, & mulierum fluxiones cohibet.

Merisca  
balgo

*σχοῖρος ἀρωματικός.* Offi. sguinātiũ vulgo pestilhis camelorum  
Odoratus I V N C V S, in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus repletus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit. igne mordacitatis ad linguam. floris, culmorum, radicisque est vsus. Aegine. Flos modicè calefacit, minus astringit, tenuem naturam fortius, quæ urinam mouet, & menses trahit,



obstructaque referat in fomentis, potu, & cataplasmatibus adhibitis: radix adhuc magis flo-  
re astringit, sed ille calidior.

IUNIPERI genera duo. altera maior, ἀρκυτογενή altera minor. Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine nonnunquam grande-ou genere scere, aliæ nucem Ponticam æquare inveniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ: quæ arceuthides etiam, id est, δασ. baccæ iuniperi, nominantur. Aeg. Cal. sic. 3. fructus autem cal. 3. sic. 1.

## L

δυναύθην.

ABRYM Veneris, Dipfacus. Vigne

## L

LABRVSCA duorum generum saulage est, alterius vua non maturescit, viorne sed flore tenuis cenanthen nominatam perducit. altera ad frugem peruenit, parvis acinis, nigra, & astringens. Folia, caules, & clauiculæ, quibus repunt, vim habent cultæ viti similem.

LABVRNVM arbor alpina Plinio, nec vulgo nota, dura & candida materia, cuius florem cubitalem longitudine apes non attingunt. odit aquas, nec nisi in ficcis provenit.

LACTORIS nota vulgò, secundum Plinium, plena lactis, quod degustatum vomitiones cõcit. Eandem hanc aliqui esse dicunt, bula alii similem illi quam militarem vocant, quo-

Lactaria ou ana- bula



niam vulnus ferro factum, nullum non intra dies quinque sanat, ex oleo imposita.

*ῥαδάξ.  
Lactue*

LACTUCA olus est non summè frigidū humidumque, sed pro fontanæ aquæ temperamento, quapropter calidis inflammationibus cōuenit: præterea sitim potu restinguit, & genituræ fluorem cohibet.

*ῥαδάξ  
ἄγριος.  
Videi  
esse off.  
candidia*

SYLVESTRIS lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. amaro gustu est, & viribus aliquantum papaueri similis. unde lacteum eius succum aliqui in conio permiscuerunt. Aegineta, Superiori minus & refrigerat, & humectat, verum succulentior existit.

*λάδανον  
Strobon  
recentio-  
res vocāt*

Est & alterū cisti genus, LEDON à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascentis, longioribus foliis, & nigrioribus, quæ verno tempore quiddam cōtrahunt pingue. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hircique, pinguitudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adhærescentem reportant. quam depectentes incolæ, colantesque cogunt in offas, & ita recondunt. Alii vero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomérantque in ladanum. Maximè probatur odoratum, subuiride, facilè mollescens, pingue, quod arenas nō collegit, nec squalore oblitum est,



resinosum, quale, in Cypro gignitur. Arabi-  
cum verò, Libycumque, vilius. Aegineta, La-  
danon medicamen est præstantissimum, in  
secundo ferè abscessu calidum, natura te-  
nue, emolliens mediocriter, discutiens & ma-  
turans: eòq; vteri affectionibus peculiariter  
còuenit. habet præterea nonnullas astringen-  
di vires, quibus defluos capillos confirmet.

L A G O P Y S herba sistit aluū in vino po-  
ta: aut in febris, ex aqua. eadē inguini alliga-  
tur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.  
Siccæ facultatis est. Aeg.

λαγώ-

πρς.

Vulg. tri-

nitas

L A M P S A N A sylvestre olus est. plus alit  
quàm rumex, & stomacho vtilius. cuius folia  
caulesque coquuntur in cibo. Aeg. Manduca  
ta prauum succum gignit, illita verò nonni-  
hil abstergit, discutitque.

4. trifolii

genus sit

λάμ-

πανα.

Sanure

L A N A R I A, memorabitur in Radicula. blanche,

Ex generibus rumicis, oxylapathum vo-  
cant, quod in acutum tendit. prædura habēs ou pou  
extrema, nō nisi in palustribus nascens. Alii  
us est satius, illi dissimilis. tertiū genus syl-  
vestre, paruum, plantagini proximum, hu-  
mile & tenerum. Quartum est quod alii ox-  
alida, alii anaxyrida, aut lapathon vocant. surelle o-  
folia eius sylvestri ac exiguo rumici similia, zeille me  
caule nō magno, semine subacuto, rubente, nue Ace  
acri, in caule & agnatis appendicibus emicā-  
te. Aegin. Rumex mediocriter discutit. Oxy  
lapathū præter id etiam paxillum repellit.

λάπαθον.

offi. lapa-

thū acutū

surelle o-

zeille me

nue Ace

tosa nūc,

Oxy oze ille



Semen autem, præsertim oxylapathi, astringens, alui profluuiâ (diarrhœas dicunt) & intestinorû tormina persanat. Folia verò semini contraria faciunt: hæc etenim comesta aluum mouent, illud potum ipsam cōprimit.

σέλφιον.

LASERPITIVM in Syria, Armenia, Media & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maspetum vocant: foliis apio similibus: lato semine. Radix in cibis agrè coquitur, os commendat cibis aut salî permissa. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. præfertur autem rufum, translucens, myrrhæ æmulum, non porraceum, odore valens, suavi gustu: quod dilutum facîle albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet. blandissimo odore, adeò vt ne os quidem gustanti nisi paululum spîret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento: quod maleficium deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magudarin, & folia maspeton vocauêre. Efficacissimum laser, mox folia, postremò caulis. Fertur & altera magudaris in Libya nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus: eiusdem cum lasare facultatis. Aegineta, Probè calefacit, flatulentum est, & cōcoctu per-



uicax. à foris corpori applicatū efficacius de-  
prehēditur, magisq; liquor ipsius, extrahen-  
di potēs, item & superexcreſcentia amoliēdi.

**LATHYRIS**, quam aliqui tithymalū, λαθύρις  
offi. cata  
putia ma  
ior, vulg.  
espurge  
appellant, eamque tithymalorū numero ad-  
scribunt, caulem emittit cubiti altitudine, &  
digitali crassitudine, inanem. gignuntur in  
cacumine alæ, & folia in caule oblonga, a-  
mygdalinis proxima, latiora, & læuiora. quæ  
autem in summis ramulis exierunt, minora  
conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblonge he-  
deræ figura. In cacumine fructū summis sur-  
culis gerit, triplici loculamento insignem, ro-  
tundum, seu capparin, in quo grana intercur-  
santibus membranis inter se distincta conti-  
nentur, eruis maiora, rotunda. quæ dum cor-  
ticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dul-  
cia. Nullus radicis vsus. totus frutex lacteo  
succo turgēt, vti tithymalus. Aeg. Succus eius  
instar tithymali purgat, semen autem præci-  
pua purgandi vim habet.

**SION** in aquis inuenitur, frutice pingui,  
recto, foliis latis, olusatro similibus, sed mi-  
norib<sup>9</sup>, & odoratis. Quæ cruda coctâq; viriū σιον  
Lauerlat.  
off. beru-  
le vulg.  
suarum gratia eduntur. De Sio Crateuas tra-  
dit, herbam esse fnticis specie, pauca folia fe-  
rentem, rotunda, maiora quàm mentha, ni-  
gra, & ad erucam accedentia. Aeg. Sion cali-  
dum est, urinam ciet, digerit per halitum, re-  
num calculos terit, menses euocat.



Δάφνη.  
Laurier

LAVRVS quædam tenui folio cōstat. al-  
tera latiore. Aegin. Lauri arboris folia ficcāt,  
& calefaciunt insigniter, magis quoque fru-  
ctus. Radicis cortex amarus, & leuiter astringens,  
calculos comminuit, & iocinorosis opit-  
ulatur cum uino odorato triobolari pon-  
dere potus.

Δάφνη  
Ἀλεξάν-  
δρεια.

LAVRVS Alexādrina, folio est rusci ma-  
iore, molliore, & candidiore: semine inter fo-  
lia rubro, ciceris magnitudine, ramos spar-  
git in terra dodrātales, interdum longiores:  
radice syluestri myrto simili, maiore, molli-  
ore, odorata. inuenitur in montosis. Aegin.  
Calida, acris, & subamara est, idcirco mēses  
& urinas commouet.

Φακή.  
Lentille

Aeg. LENTES in 2. ordine ficcant, medio  
caloris & frigiditatis temperamēto donatæ:  
sed astrictiōnis quoque nonnihil habent. To-  
tum quidem lentis corpus ficcatur, aluūmque  
sistit: decoctum vero ipsius proritat, ideoque  
prior aqua defunditur, quum astringēdi gra-  
tia lentes assumantur.

Φακὸς ἐπὶ  
τελμα-  
των.

Lenticule  
de d'eaue

οχίνος.  
Létische

LENS palustris, inuenitur in aqua non  
fluente, muscus lenticule similis. Aeg. Hume-  
ctat, refrigeratq; in secundo abscessu.

LENTISCVS nota arbor est. Aegine-  
ta, In omnibus sui partibus ficcatur secundo  
absolutè, calefaciendo autem & refrigeran-  
do medius est, adeò astringens, vt ad hypo-  
cistidis succum astrictiōne accedat.



Lenciscus resinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. præfertur nitedulæ modo resplendescens, & candore Tyrrhenicæ ceræ similis, adulta, rectorrida, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinæq; pinæ nucis mistura. Aegin. Ma μασθική  
stiche, Chia quidem calefacit & sic. i. Cæterum compositæ est facultatis, astrictoriæ simul & emollientis: hanc ob rationem stomachi, ventris, intestinorum, & iocinoris inflammationibus rectè accommodatur. Aegyptia, nigriore colore quodammodo, siccat magis & discutit, minus astringit, hinc furunculos quoque dissipat.

LEONTOPE TALON, caulem emit tit dodrantalem, aut altiore, plurimis al- λεοντοπέ  
ταλον.  
offic. &  
herb. πα  
talconis  
lis concanum, & in cacumine semina parua duo: aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemonæ similes, punicei coloris: folia brassicæ, sed papaueris diuisura. radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis. nascitur in aruis, & segetibus. Aegineta, Radix cal. sic. 3. discutitque.

LEONTOPODION duum digitorum λεοντοπό  
διον.  
Vide ē ef  
se quæcra  
ciata  
herbula est, folia forēs angusta, longitudine ternū quaternūve digitorū, hirsuta, quæ iuxta radicē lanosiore flocco canescūt, capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri;



semenvsq; adeò spissa lanugine inuolutū est, vt sæpe fallat: radice parua cohæret, quā tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere. Aeg. non habet.

LEONTOPONTIVM à superiori differre videtur, alii liceron, dorypetron, & toriuetoron vocant, radix eius aluum sistit. Purgat bilem in aqua mulsa addito pōdere denariorum duūm. Nascitur in campestri & gracili solo. Semen eius lymphatica somnia facere dicitur, & tela omnia infixæ corpori extrahere tritum cum polenta, & cū eadem spicula sagittariorum elicere.

λεπιδιον  
offic. &  
herb. ra  
phanūvo  
cant,

λευκά  
κανθα  
Rham-  
nus est.

λευκάρι  
Atriplex  
rustica  
esse videt̃

LEPIDIVM aliqui gingidium vocant. herbula vulgò nota. muria cū lacte seruat̃. Aegin. Aliqui hyperiadem vocant. cal. 3. Naphantio proximum viribus, minus autem eo deficcat.

LEVCA CANTHA prædita est radice cyperi, valida & amara. quæ māducata dolorem dentium sedat. veteri laterū dolori, atq; ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino poto. eadem ruptis & cōuulsis medetur. radice epotus succus eosdē præbet effectus. Ag. Alii polygonatum, alii ischiada vocant. radix incidit. Cal. i. sic. 3.

LEVCA S mōtana, latioribus quàm vrba na foliis, semine acriore, amariore, ori in grato, efficacior tamē quàm satiua habetur. vtraque ex vino contra animalium venena, præ-



cipue marinorum opitulatur. Aeg. Cal. sic. 3.  
acrimonia præpoller.

LEUCOION vulgaris est notitiæ, sed in floribus differentia quædam. nanque aut cœ rulei, albi, purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea verò præcipui in medicina vsus. Aegineta, Lecoii totus frutex absterge di extenuandi que vires possidet: magis autem flores, & ex eis, sicciore. iccirco & menses stimulant, fœtus corrumpit expelluntq;. Quod si quis aquæ mistura vim ipsorum obtundat, etiam inflammationibus conducent, præsertim uteri. Radices eadem præstant, crassiore magisque terrestri natura præditæ: ex aceto inflammationibus in scirrhum coalescentibus imponuntur.

LICHEN qui saxi est familiaris, aliqui bus bryon appellatur. asperginosis petris adhæret, ut muscus. Aegineta, Vis ei est extendo purgare, mediocriter siccare & refrigerare. impetigines sanat, inflammationes arcer. sanguinis eruptiones sistit.

LYCHNIS coronaria, flore est albæ violæ simili, quo corollæ factitatur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxilium. Lychnis sylvestris, omnia urbanæ similis. Aegineta, Lycnidis coronariæ semē Cal. sic. 2. absolute.

LYCIVM, quod aliqui pyxacanthan vocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorū

λευκόιον.

violette

ou giro-

flee.

λεχύν.

off. herb.

hepatica.

λυχνis.

châdelle

de N. Da

me. altera

flore pur

pureo,

Mariæ ro

sa ou Me-

lon blâc.

λύκιον.



aut longioribus: foliis buxi, densis: fructu piperis, nigro, leui, amaro, densoq; cortice pallido, non dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque aliis locis. aspera loca amat. Succi extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis tusi, & ante per multos dies macerati coquuntur, tū abiectis lignis itidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurca, aut absceynthii succo, aut felle bubulo. Innatas spuma inter coquendū exempta, oculorum medicamentis additur. reliquo ad alia vtūtur. Simili modo fit lyciū, semine expresso & insolato. Optimum quod vri potest, restinctūq; rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus cum fregeris rufis, odore minimè viroso, cū amaritudine adstringēs, crocino colore. cuiusmodi Indicū est, cæteris præstātius. Tradunt Indicū fieri lycium, ex frutice lonchitide appellato. ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ternū cubitorū longitudine, maiorēve, rubo crassiores, à radice numerosos. fractus cortex rubescit, folia oleę similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammationibus & regio morbo mederi, & foeminarū purgationes elicere. Assueuerant etiam crudam in potu eosdem effectus præstare: semen cyatho dimidio potum, pituitā expur-



gare: venenis quoq; auxilio esse. Aeg. Lyciū ex diuersis genere substantiis cōstat, calida, tenui & discutiente, terrestri verò frigida & leuiter astringēte, vt in secundo abscessu deficcet. Calefaciēdo refrigerandóq; medium est: hac de causa ceu abstersorio in oculis obscuratis eo vtuntur: tanquā astringenti, in cœliacis, torminibus intestinorum, & maleficis vlceribus: at contra inflammationes, vt discutienti. Cæterū primas obtinet Indicum.

**LYCOPSIS**, quæ à nōnullis anchusa vocatur, foliis lactuæ longiorib. asperioribus, latioribúsq; crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore paruo purpureo: radice rubra, & adstringente. nascitur in campestribus. Aegineta, Lycopsis quàm onoclea anchusa, astringit quodammodo efficacius, similiter erysipelatis cum polenta illita cōuenit. Si læuis cum oleo inungatur, sudores elicit. Meminit Aegineta primū inter anchusas, & iterum suo loco.

**LYCOPVS** herba marrubio syluestri similis est, folio lupini pedis effigie, dissecto, grauis odoris, caule anguloso geniculatōq; fungosa intus medulla, radice frequenti capillamento fibrata. folia trita præsenteo remedio imponuntur dissoluto stomacho.

**LIGVSTICVM**, quod alii panaceā, alii panaces vocant, plurimum in Liguria nasci-

λύκοψις.

4. genus  
anchusæ  
Gal. her.  
lague de  
chien.

λυκόπυξ

Patte de  
loup. ou  
pectora-  
le, ou  
main de  
S. Marie.

λιγυστικόν



Non est tur, in monte Apennino, Alpibus contermi-  
hoc offi- no: vnde nomen traxit. Panaces incolæ non  
cinorum ab re appellant: quoniam & radice & caule,  
leuisticū. heracleotico panaci simile fit, & viribus ei-  
dem præditum. Gignitur in altissimis aspe-  
risque montibus, ac vmbrosis, maximè iuxta  
fluëta. cauliculum fert anethi geniculatum,  
tenuem, & in circuitu folia fertule campanæ,  
molliora, odorata, propè verticem gracilio-  
ra, & longè magis diuisa: in cacumine musca-  
rium, in quo semen dependet nigrum, solidū  
& oblongum, fœniculo proximum, gustan-  
ti acre, & aroma olens: radix candida hera-  
cleotici panacis similis, odorata. Aeg. Eius &  
radix & semen adeò calefaciunt, vt menses ci-  
tent, flatūsque probè discutiant.

φιλυρία.

Troescne  
ou druy-  
ne. offic.  
halcanne  
ou hēne.

λίσια.

Lys.

LIGVSTRVM arbor est cypri magnitudine,  
foliis oleæ, nigriorib⁹ & latioribus, fructu lē-  
tisci, nigro, subdulci, racemati coherere. a-  
speris nascitur. Aeg. Tiliae arboris folia sylue-  
stri oleæ similiter astringūt, quibus cōmādu-  
catis oris vlcera iuuātur: eorūq; decocto col-  
luūtur: quod etiā potū vrinā & mēses trahit.

LILIA coronamentis se dedunt, Liria à  
quibusdam vocata tradunt & rubra esse lilia.  
Aegineta. Lili flos temperamēto mixtus est  
ex tenui substantia, terrestri & nonnulla a-  
quosa temperata: quapropter oleum quoque  
ex eo cōfectum discutiēdi vires molliendūq;  
representat, vuluē inflammationibus accom-



modatum. Radix ac folia siccāt, abstergunt  
discutiuntq; mediocriter, quo sit vt ambustis  
conferant: succus ipsorum & neruorum vul-  
neribus cum oxymelite prodest.

**LIMONION**, folia habet beta, tenuio- λαμώνιον  
ra & longiora, decem, sæpe plura: caulem te- Limoine  
nuem, rectum, lilio æqualem, seminibus ru ou bette  
bris scatetem, quæ gustata adstringunt. Semē de pre-  
tritum, & ex vino acetabuli mensura potum  
dysentericis celiacisq; prodest. rubra scemi  
narū profluua sistit. Nascitur in pratis & pa  
lustribus. Aegineta, Semen eius austerum cū  
vino, celiacis, dysentericis, & sanguinē spuē  
tibus datur, item ad fluorem muliebrem ace-  
tabuli mensura.

**LINI** semen ex primo gradu calidū est, λιμόσπερ  
inter humectantia siccantiaq; medium. Man μον.  
ducatum flatus creat, etiam si frictū fuerit.

**LINGVA** herba Plinio nascitur circa  
fontes. Radix eius combusta & trita cum a-  
dipe suis, alopecias emendat vnguentiū inso-  
le. (Eandem alibi lingulacam vocat.)

**LYSIMACHIA**, quā aliqui lytron ap- λυσιμά-  
pellāt, caules emittit cubitales, altioresve, fru χιον.  
ticosos, tenues, prodeūtibz geniculatim fo Corneol  
liis, tenuibus, salicis figura, gustu adstringen le, soucy  
tibus: flore rufo, aut aureo. gignitur in aquo deaue,  
sis & palustribus acerrimum nidorem suffita ou pelli-  
reddit: qua de causa serpētes fugat, & muscas posse.  
interficat. Aegineta, Vm habet excellēter a-



strictoria, qua & vulnera glutinat, & sanguinem cōpescit, tum ipsum, tum ipsius succus: intestinorum tormina & potum, & ab inferioribus partibus iniectum sanat.

λιθόσπε  
μον.  
offic. &  
med. οἶ-  
b<sup>o</sup> Moliū  
folis.

**LITHOSPERMON** à seminis duritia nomē accepit, foliis est oleæ longioribus, & latioribus, mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt ramulis surculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iūci, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent foliis longis, inter quæ paruum semē, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Aeg. Alii diosporon, alij heraclion vocāt herbæ ætonichi dictæ semen est lapideum, album, quod cum vino albo potum calculos frangit, & vrinam pellit.

αἶρεν.  
Iuraicou  
gasse.  
λογχίτης  
Nigri ca  
petti.

**LOLIVM**, quod inter segetes nascitur. Aeg. Calfacit, siccit, tertio fermē ordinē, iridi facultatibus simile.

**LONCHITIS** folia habet porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, veluti in terram procumbentia, pauca in caule, in quo flores ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exerentes velut linguā, quæ ad labrū inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile, triangulum: vnde sibi cognomen tum arrogauit, radix dauci. Nascitur in sitiētibus & asperis. Radix ex vino pota vrinam



ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui asperā lonchitin dicunt. folia scolopendrii emittit, sed asperiora maioraque, ac multo magis diuisa. Folia viridia. Vulneribus mirum in modum profunt, in eisq; inflammationes excitari non patiuntur. arida pota ex aceto lienem absumunt, vel indurato medentur. Aeg.

**L O T V S** arbor est vastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, citis gratā, stomacho facilem. Aegineta. Extenuat, siccat, & mediocriter astringit: qua de causa ad fluxū muliebrem, alui fluores si cū vino aut aqua bibatur, aut etiam infundatur clystere, salutaris est. pilos defluos cōfirmat.

λωτός.  
Alyfier  
& bacca,  
alyse.

Est & in Aegypto **L O T V S**, quæ in campis flumine inundatis provenit, caule fabæ: flore paruo, candido, lilio simili, quem tradunt occidente sole comprimi, occludique: ad ortum autem aperiri. adduntque, caput ipsum vespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana ceu milii, quæ Aegyptii exiccant, & in panes cogunt. Radicē lotos hæc habet mali cotonci similitudine, quæ cruda coctaque manditur, decoctaque lutei oui qualitatem exhibet. (Aegineta nihil præterea.

λωτός αἰ.  
γυπτία.

**L O T V M** urbanū alii trifoliū vocant. nascitur in hortis. extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, cæterasque

λωτός η.  
μερος.



caligines discutit. Aegineta, Abstergit, modice sic calore temperata est.

λωτός &

γείος.

forte hęc

off. anda

cocha, &

corona

regia.

θέρμοι.

Lupin.

Sylvestris LOTVS nascitur plurimum in Libya. Caulem fert bicubitalem, aut etiā maiorem, multis alarum cauis. folia loto trifollio in pratis nascenti similia: semen fœnogrecæ, multo tamen minus, sapore medicato. Aegineta, Semen eius cal. secundo, habet non nihil etiam absterforium.

Satiuus LUPINVS non est. Gignūtur & sylvestres lupini, satiuus similes, sed omnino minores, qui eadē quę satiuus possunt. Aegineta, Lupinus esculentus quidē obstruendi viribus pollet: amarus abstergit, dissipat, & sine morſu deficcet, lumbricos occidunt illiti, & poti. Viscera purgant cum ruta & pipere potui. Cutis vitia extergunt. tumores dissipant cum oxymelite illiti. Sylvestres autem lupini amariore sunt, & omni ex parte satiuo valentiores.

offi. lupu

lus. gall.

houblon

LVPVM salictarium Plinius inter oblectamenta verius quā cibos numerat. Caulibus aculeatis longissimis quia in vepribus & salictis reptat, foliis vitis albæ, hispidis & nigrioribus, flore cinereo ac multis exilibus folliculis squamatim compacti. Hoc frugibus admisto Germani suam condiunt ceruissiam. Teneris eius turionibus in acetariis utimur. Refrigerat, & collectionum impetus lenit. Sedat stomachi inflammationes ex sero potus.



potus. Bilem regio morbo laborantibus detrahit. Pituita in aqua intercutem exigit per aluum. in capitis dolore, qui medium capitis occupet, eius succus illinitur: item quoties immodicos æstus mitigare necessum fit.

**LUTEAE** herbæ Vitruuius meminit. Qui nō possunt, inquit, chrysocolla propter charitatem vti, herba quæ luteum appellatur, cœruleum inficiunt, & vtuntur viridissimo colore. (Luteam sunt qui lysimachium interpretentur.)

## M

**MACER** ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perquam astringens. Aeg. Cortex μακερ  
offi. Macis.

est qui ex india importatur, sic. 3. inter calorem & frigiditatem medium obtinet. Est etiam astringens, tenuisq; unde cœliacis & intestinorum torminibus auxiliaris habetur. Porro macer, siue macis Arabum, quære in Moschocario.

**MALABATHRUM** arbitrantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione. permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, niris, secus autem res se habet. Namque malabathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris modo innata aquis, sine radice. Id collectum statim lino transluitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus viti: quod ubi

μαλάβαθρον.  
offi. folium Indicum cinnamomi est, non malobathri.



non euenerit, ne amplius quidem renasci. laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu insuauis odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmum verò & minutim contusum, præsertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Aeg. Malabathri folium æquales spicæ nardi vires repræsentat.

μαλακό-  
κιστος.  
off. sigil-  
lū D. ma-  
riæ.

MALACOCISSVM Democritus aquilex mollibus hederæ foliis depingit, caule tenero, sese cuiusq; quod fuerit nactus inuolūtē. Subesse aquam ubi reperitur affirmat.

MALICORIVM in punica malo dicitur.

μαλάχη.  
Mauluc.

MALVA satiuæ esui longè aptior syluestri. Aeg. Syluestris mediocriter discutit, & emollit. Hortensis autem ceu humidior, etiā imbecillior est. Semen tanto viribus præstat, quanto & siccior est.

μολόχῃ.  
trāsmari-  
na rosa.

MALVAM maiorem Græci molochen vocant, hæc Apuleius hastulā regiā dixisse mihi videtur: quāuis eadē sit asphodeli appellatio.

μήλα.  
Pomicr.

MALIS omnibus frigida & excrementitia inest humiditas, quæ in eorū censu tenera & aquosa sunt, frigiditate cæteris & humiditate præstant. Dulcia aquosa quidem, non tamē manifestè frigida sunt. Austera dulcibus quidem frigidiora, sed minus humida. Acida frigida quidem & ipsa, verū incidendi humores ventriculo inhaerentes vim testantur.



Acerba, cuiusmodi cotonea & struthia sunt, frigido & terrestri donata tēperamento, ventrem supprimūt, vulnera glutinant. Pari modo folia succi, & cortices arborū inter se differunt. Aegineta.

MAMIRAS veluti radiculae herbae cuiusdam est eeu geniculis frequentibus nodosis, quae cicatrices & albugines extenuare creditur, exterendi nimirum facultate praedita. Aegineta.

μαμίρας  
Videi et  
doron-  
cū offi. &  
herbar.

MAMDRAGORAM, aliqui antimalū, alii circæam vocāt, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera. niger, quae foemina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus foliis, ac minoribus quam lactuca, graueolentibus, in terra sparsis. mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorū radicibus inheret bene magnis, binis, ternisve, inter se coeunt, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis. verū is mandragoras caule viduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis norion vocitatus. huius folia, magna, alba, lata, laevia, ut betae: mala quam alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucundè cum gravitate quadam olentia: horū pomorū cibo aliquantum opiliones soporantur. radix, alterius similis, maior & candidior, orbata caule. Succus fit e cortice recetis radicis tuso, & praelis subiecto: qui insolatus ubi

μανδρα-  
γορας.  
Mandra-  
gore.



concreuit, fictili reconditur. Malis quoq; succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defæcatum ius seruât, cyathoque vno vtuntur, in perurgiliis, & doloribus, & ante sectiones vstionesque, ne sentiatur. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erumpens lachryma, cauo vase recipitur. liquamentum autê succo lacteo præstantius est: sed non vbiq;, vt experiëntia docet, radices lacteum succum delachrimant. Alium tradunt esse mādregoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatū, foliis albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicē ambientibus, quę mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradūt eam in pane, ossa, obsoniōve, drachmę pōdere deuoratā, vsum rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo ferē quo comederit habitu, sensus impos, ternis quaternisve, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur, cū scindendi, vrēdiq; necessitas adest. Antidotū esse volūt radicē, cū manico salano potā. Aeg. Mandragoras frige facit 3. Mala ipsius etiā caliditatē quampiam cū humiditate id referunt, vnde soporem grauē homini possunt accerfire. At radice cortex vehementissimus, nō refrigerat modò, sed etiā siccatur interior eius pars imbecillior est.



**MARRUBIVM**, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. foliū pollicem equat, subrotundum, hispidū, rugosum, gustu amaro. semē in caulibus, & ex intervallis. flores verticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. Aeg. Cal. 2. amplius autē siccat, iecur lienemq; obstructionibus liberat, excreationes è thorace & pulmonibus, mensesq; promouet. Illitum extergit, discutitque, præcipua extensoria incisoriaque vi præditum.

κράσιον.  
Porcum.  
Marrou.  
off. prassi  
on viride

**MARVM** herba cognita vulgò, surculo sa, flore origani, foliis multo candidioribus, flore odoratiore. Vim habet sisymbrio consimilem. substringit enim, & modicè calfacit. qua de causa illitu serpētia vlcera sistit, & in calidas illitiones additur. iuxta Magnesiam & Tralleis copiosissima gignitur.

μάρον.  
herb. forte  
mētha  
sylvestris

**MASTICHE**, vide Lentisci resinam.

**MEDICA** cum recenter prodiit, foliis & caule trifolio pratenſi similis est. procedens verò folia contrahit, caules edens trifolii, & filiquas corniculorū modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Id ficcatum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. viride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt. (Aeginea non habet.

μυδική.  
grād tres.  
fle ou foi  
de Bour-  
gongne.



μεδίων

**MEDION** in saxis & opacis nascitur. folia habet iridis: caulem tricubitalem, & in eo florem grandē, purpureum, rotundum: semine cnici, minuto radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Aeg. Medii radix vires semini contrarias præ se fert. est enim austera, & fluxiones comprimit, ideoq; muliebrem fluxum sistit. Semē quum tenuis incidentisque sit facultatis, menses quoque proritat.

**MELAMPYRO** in Myagro describitur.

**MELANTHIVM**, vide Gith.

μελίλω-  
τος.

offic. &  
vulg. melilot.  
alii pratellū,  
ou courō  
ne royal.  
lc.

ἡδύσ-  
μος.  
Menthe.

**SERTVLA** Campana landatissima in Attica & Cyzico & Chalcedone nata. cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum languescēte, odore infirmo. Aeg. Diuersis facultatibus pollet: astringendi, discutendi, & concoquendi.

**MELISSOPHYLLON**, vide Apiastrū.

**MENTHA**, cognita herba est. Syuestris mentha, Latini menthastrū vocāt, hirsutior est folio, & prorsus maiore quā silymbrii, grauiori odore: quare minus ad sanorū vsus expetitur. Aegineta, Mentha Cal. 3. tenuis, acris, cum humiditate semicocta existit, cuius causa etiam in venerem incitat. Amari quoq; nonnihil obtinet, quo lumbricos enecat. Qua verò acerba est, recentes sanguinis eruptiones coërcet.



**EINOZOSTIS**, aliqui parthenion, alii *Λινόζωσις* hermûbotanion appellant, foliis cōstat ocy- Mercuri-  
mi, minoribus helxinæ cognatis: ramulis du ale,  
plici geniculorum nodo cinctis, alarū cauis  
multis: fructu fœminæ copioso, quandam ra  
cemorū speciem præbente: mari è foliorum  
finu depédente, paruo, rotundo, ceu binis te-  
sticulis vnà cohærentibus. frutice dodrantali,  
aut maiore. vtraq; in oleribus manditur, ad  
aluū ciendam. Aeg. Aluum liberaliter subdu  
cit illita discutit. Sciendūmq; est, eius semen  
infricatum corporis excreſcentias præter na  
turam, quas vulgus vocat naphia, abolere,  
sicut experientia comprobatum est. Sed vi-  
ride semen esse oportet, & frequenter tuber-  
culis illis infricari.

**MESPILVS**, quæ à nōnullis Aronia vo- *μίσπιλος*  
catur, spinosa arbor est, folio acutę spinę fert Neflier,  
pomum suaue, exiguum, tribus intus ossicu- meslier.  
lis. qua ex causa id nonnulli tricoccon appel  
lauere. tardè matureſcit, esu adstringit, sto-  
macho gratum est, aluumq; supprimit. Alte-  
rum mespili genus in Italia nascitur, quod a-  
liqui setanium, alii epimelida vocant. arbor  
foliis mali, sed minoribus: pomū fert rotun-  
dum, esui aptū, vmbilico latiore: quod aſtrin-  
git, seroque matureſcit. Aeg. Mespila, alii tri-  
cocca vocant, fructus est affatim acerbus, &  
vix esculentus, aluumq; continens. Germina  
foliāque mespili impensè acerba sunt.



*μῆον.* M E O N, quod Athamanticū vocant, in  
offi. anet Macedonia & Hispania plurimū gignitur,  
faulua ge anetho folijs & caule simile, sed eo crassius bi  
her. anet nūm fermē cubitorum altitudine attollitur,  
tortu. sparsis in obliquum rectūq; radicibus, lon  
gis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacien  
tibus. Aeg. Mei radices Calefa. 3. sic. 2. ideōq;  
vrinam & menses cient. Liberalius meon as  
sumptum, capitis facit dolores.

*μῦαγρος.* M Y A G R O N, aliqui melampyron vocāt  
Cameli - herba est surculacea, foliis rubiæ, pallidis, tre  
ne ou ca - pidanea. semen oleosum, scenogræco simile.  
maminc. Quod contusum igni torrent, perunctisq;  
virgis ad lucernarum lumina vtuntur. hoc  
pingui, scabritias corporis leuigari, atque  
expoliri, constat. Aegineta, Quod in semine  
oleosum habetur, viribus est opplendi. Per  
peram apud Aeginetam duobus in locis, pri  
mum in Myagro; dein Myaro, eadem de re  
tractatur.

M Y L E S radix paruo bulbo similis est,  
constringit: itaque cum lolii farina apposita  
vterū apertū sanat. Galenus: (Eandē esse ap  
paret Dioscoridi dictā Moly. itaq; illius de  
scriptionem hinc emendare poteris.

M I L I A R I A herba milio gentilis est: no  
men habet, quod milium implicādo enecet.  
Hæc trita, & cornu cum vino infusa, poda  
gras iumentorum sanat.

M I L I T A R I S, vide Lactoris.



**MILIVM** in panes coactum, minus cæ- κίχρεος,  
Μίλετ  
teris frugibus alit. Aeg. Miliū frig. i. sic. 2. Ha-  
bet etiam modicam extenuandi facultatem:  
extrinsecus igitur in sacculis ad fouendū ad-  
hibitum, & illitum deficcare consuevit.

**MILIVM** Indicum in Italiā Neronis κίχρεος.  
ινδικός.  
Μίλιū sa-  
racenicū  
.i. pegri-  
num  
principatu conuectum, nigrum colore, am-  
plum grano, arundineo culmo: Adolefcit ad  
pedes altitudine septem, prægrandibus cul-  
mis, lobas vocant, omnium frugum fertilissi-  
mum. Ex vno grano terni sextarij gignūtur.  
Seri debet in humidis.

**MYRIOPHYLLVM**, siue millefolium, μυριόφυλ-  
λον.  
Μίλε  
feuilles  
caulis est tener, singularis, vnica nixus radi-  
ce: plurimis foliis, læuibus, fœniculo simili-  
bus: vnde nomen accepit. caulis flauescit va-  
rius, ac veluti ex industria delimatus. nasci-  
tur in palustribus. Aegin. Adeò siccat, vt vul-  
nera glutinet.

**MYRICA**, seu tamarix, arbor vulgò co- μυρίκη.  
Bruyre.  
huius ra-  
dix casia  
off. vocat  
& pro o-  
dorata ca-  
sia vtūtur  
gnita est, cū apud pigras & stagnantes aquas  
enascatur, fructum quasi florem ferens com-  
page muscosum. Aegyptus Syriāque alteram  
gignunt mitiorem, syluestri cætera similem.  
Fructum parit galle proximum, inæqualiter  
astringentem gustu. Aegin. Tamarix incidit,  
extergitque, ita vt manifestè nō siccet, sed a-  
strictionem quoq; nonnullam obtineat, qua  
de causa decoctū ipsius potū lienes adiuuat,  
dentiūmque doloribus medetur. Fructus &



cortex ipsius, gallæ virtute proximus est. Cinnis arboris vehementius exiccat.

*μύρρα.*  
Myrrhe

MYRRHA lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ nõ dissimilis. è cuius vulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. alia circũ caudicem cõcrescit. Dicitur ex his aliqua pediasimos, præpinguis qua expressa, stacte emittitur. alia gabirea, pinguisima, læto & pingui solo nascens: ea copiosam sudat stactem. Omniũ prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine ab loco, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. quinetiam legitur tenuis quædã, quæ à troglodytica secunda est, bdelij modo mollis, verũ odore grauiuscula, apri cis nascens. Alia caucalis cognominatur, prætermo dum exoleta, nigra, & retorrida. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur: pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gũmis imaginem vergens, & viribus eius proxima. improbatu r aminnea cognomine. Ex iis pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è ficcioribus haudquaquã pingues, & inodorati. minus odore pollet, quæ oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gũmi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obfita, leuis, vndique concolor, quæ confracta venas vnguium modò candidas & læues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata



calfaciens. superuacua & inutilis est ponderosa, coloris picei. Fit è myrrha, perinde atque thure, fuligo, & (vt postea ostendemus) ad eadem cōueniens. Bœotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascentis. Melior est quæ myrrhæ odore repræsentat. Aegineta, Cal. sic. 2. Capitis vulnera si illinatur glutinat. item amarā vim obtinet, qua ventris lumbricos & fœtus occidat. ad hæc abstergit, eoq; oculariis medicinis temperatur. humores pectori infixos expurgat, ita vt fauces nō asperet. Bœotica myrrha vires habet calefaciendi, emolliendi, & dissoluendi.

MYRRHIS, simillima est cicutæ, caule μυρρῖς  
foliisque. radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo non insuavis. Aegineta, Calid. 2. ac cicutaria  
nonnihil etiam extenuat. radix illi odorata dulcisque est, mensibus mouendis, & humoribus è thorace ac pulmone repurgandis idonea.

MYRTVS fatiua nigra utilior est medicinæ quàm cādida, & in hoc genere multò magis montana. semen tamen imbecillius parit. μυρσίνη  
Myrte

MYRTIDANVM dicitur myrti adnatum inequabile, verrucosum, intumescensq; μυρτιδα  
vov.  
& cōcolor. quod perinde quasi manus myrti caudicem amplectitur. magis quàm myrtus adstringit. tusum addito austero vino reponitur, coactumque in pastillos ficcatur in



umbra. multo efficacius & folio & semine, cerato, pennis, in fessionibus, cataplasmatibus admistum, ubi adstringendum aliquid est. Aeg. Myrtus ex diuersis composita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, qua valenter siccatur. Myrtula verò, seu myrtidanum, maiore vi in astringendo & siccando scaturit. Folia etiam aridiora viridibus magis siccant. Fructus succusque, tum foris applicati, tum intus assumpti, persimiles vires præ se ferunt.

μυθριδά-  
τον.

M I T H R I D A T I O N folia habet, inquit Plinius, duo à radice acantho similia, caulibus inter utraq; sustinens florem roseum.

μύξα.  
Myxaria  
fructus  
offi. & se-  
besten

M Y X A arbor Damascenæ pruno popularis, in Syria & Aegypto olim gignebatur, nunc est familiaris Italiæ. Fructus etiam myxa, vel myxaria dicuntur, olim Sebastii, in Augusti honorem, ut verisimile est. Aegin. Arboris fructus est minor quidem prunis, facultate verò consimilis.

μωλν.

M O L Y folia habet graminis latiora, humi sparsa: florem albæ violæ similem, sed minorem, lactei coloris: caulem candidum, quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid quod alij speciem referat. radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum valet ad aperiendas vulvas, si trita cum irino vnguento in pectore subiiciatur. (Aeg. non habet, præter rutam sylvestrem.) Vide Mylen.

Aliud M O L Y in ruta sylvestri describitur.



**MOLYBDAENA** herba, id est, plumbago, Plinio in aruis nascitur, folio lapathi, radice crassa, hispida, qua commanducata, oculisque subinde religata, plumbum (quod est genus vitij) ex oculis tollitur.

**MOLLIGO** hippophæstum est.

**MORI** fructus maturus quidem aluū subducit, & medicamentis stomaticis alijs, quæ moderatam requirunt astringentem, vtiliter miscetur: immaturus ubi exaruerit, perquam astringens fit medicamentum: cortex autem radice arboris etiā amaritudinis cuiusdam particeps, purgare potest, eoq; latos lumbricos occidit. foliorum autem surculorumque vis subducentium & comprimantium media quodammodo existit. Aeg.

**MOSCHOCARYON**, vel moschocarydion Græcis recētiorebus appellatū India mittit (nos ea imitatione nucem moschatam nominamus) Hic fructus dum recens est, totus succo pingui & oleoso madet, sic ut in vnguentum exteri possit. vnde multis myrsifica, seu myristica, id est, vnguentaria nux dici cœpit. Probatum recens, quæ nullam sentit cāriem, ponderosa, præpinguis, colore in rubrum inclinato. Aluum astringit, distendentes stomachum spiritus discutit, oris suauitatem commendat, stomachum & iecur roborat. Lētigines in facie, & impetigines emendat. lienem incremento laborantem reprimat.

μολύβ-

δαινα.

offic. ma

ior petfi

caria

συκάμι-

νος.

Meuricx

μοσχοκα

ρυον.

Noix mu

scade



Apud Aëtium Caryon hoc aromaticum (sic enim vocat) calefacit ficit. 2. Arabes macis nomine extimā intelligūt huius nucis membranā vel folliculum. Antefertur is qui colore ruffo vel flauo rutillet, odore suauī, cum leui acumine. improbatu r nigricās. Sic. 3. partiumq; tenuitate prāstat, cāteras habens suā nucis dotes. Arbos autem ipsa vulgari Persico similis traditur, roseo flore, & nuce, quam declarauimus, eiusdem propē effectus cuius & caryophyllon.

Βρυον.

Bryon, id est M V S C V S, à quibusdam spiachnon appellatur. in cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimū est cedrinum: proximum populneum. in quo genere candidum & odoratius prāstat, nigricans improbatu. Aeg. Inuenitur etiam in piccis. Discutiendi simul & molliendi vim moderatam obtinet.

Βρυον θαλάσσιον.

Marinus M V S C V S nascitur in scopulis, testaceisq; haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis ex pers. Aegin. Refrigerat simul & astringit, coque feruentes inflāmatōnes illitum adiuuat.

Βρυονισι

N

N

A P I cocta radix inflat, modicum alit. semen eiustorum venenorum vires hebetat. antidotis admiscetur. Conditur sale radix, Aeg. Napus



& rapa si bis coquatur, nihilominus quàm reliquę stirpes alunt: continuè autem assumpta, crassum succum procreant.

NARCAPHTHVM ex India deferitur, Nabach. Lasahatē corticosum, simile sycomori libro. quod iucūdi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis. Aeg. Naocáthon, sunt qui nacaphthon dicunt, Indicum est odoramentum, quod ad astrictos fœminarum locos suffitu vaporatur.

NACISSVM sunt qui, vt lilium, lirim *váxiaros* *Narces.* appellarint. folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora: caulis vacuus, & sine foliis, supra dodrantem attollitur. flos albus, intus croceus, in quibusdā purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrū, longū. probatissimus nascitur in montibus, suavi odore. cæteri porum imitantur, atque herbaceum virus olēt. Aegineta, Radix eius adeò desiccat, vt maximis vulneribus sit glutinandis: imò etiam tendinum præcisionibus confert. Cæterum abstergerendi & attrahēdi vim quandā habet.

Duo NARDI genera: vnum Indicum, alterum Syriacum appellatur, non quòd in Syria proueniat, sed quòd mōtis in quo oritur, *váxiaros* pars vna ad Syrios, pars altera ad Indos fluitur. Ex hoc Syriaci genere præcipuum est recens & leue, largam gerens comam, flauum colore, perquàm odoratum ac cyperum



redolēs, breui spica, amaro sapore, linguam  
 ficcāte, quod diu in sua odoris gratia perma-  
 neat. Ex indicis autē nardum quoddā Gan-  
 gitis vocatur, à fluuio Gange, apud quē ena-  
 scitur, montem præterfluente. quod genus ob  
 multam loci, in quo prodit, viginē, viribus  
 infirmius est, atque procerius adolescit, plu-  
 res ferēs spicas ab vnica radice comosas, vnā-  
 que conuolutas, ac grauiter olentes. Monta-  
 num autem odoratius, spica breui ac mutila,  
 odore cypero vicino, cæteras habens Syriaci  
 dotes. Est & genus quoddam, cui Samphari-  
 tico nomē locus indidit, frutice breui, in ma-  
 gnas se spargens spicas, candidiore interim  
 medio caule, hircorum virus supra modum  
 redolente: quod improbat. Madefactum  
 vendi solet. quod vitium ex eo deprehenditur,  
 quod candida sit spica, & squalida, nulloque  
 puluere obsita. Adulteratur stilbio cum aqua  
 aut palmeo vino, inspissationis ponderisque  
 causa inspirato. Intueri autem oportet si lutū  
 radicibus insideat, & incerniculo puluerem  
 excutere, eluendis manibus vtilem. Aeg. Spi-  
 cæ nardi radix cal. 1. sic. 2. particeps est etiam  
 astringētis cuiusdam qualitatis, acris & suba-  
 maræ. Iocinori prodest & stomacho, extrin-  
 secus admota & ebibita. Vrinā mouet, & in-  
 teraneorum fluxiones desiccāt. Indica valen-  
 tior est quā Syriaca, & nigrior.

νάρδος

κελτική

Celticū N A R D V M nascitur in Liguria



Alpibus, *faliūca* patrio nomine appellatum, prouenitq; in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat vsus est, & odoris suauitas: vnde pridie fasciculos aqua abluerè expedit, & exempta terra paulo solo atque humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidem utile, cum aceroso alienoque propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. namque herba candidior est, sine cauliculo, minoribus foliis, radice neque amara, neque odorata, uti verum nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis foliis triti secernuntur, vino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maximè recens, iucundi odoris, radice numerosa cohærens, plenum, nec fragile. Aegineta, Nardus Gallica superiori vires habet æquales, sed imbecilliores, præterquam ad urinam ciendam. calidior enim est quàm illa, minúsque astringit.

Montanum *NARDVM*, quod ab aliquibus thylacitis & niris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, surculo & foliis eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis

*vāpēlos  
δρῶν*



asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluri-  
bus, nigris, odoratis, ceu hastulæ regiæ, sed  
longè gracilioribus, & lōgè minoribus. Ne-  
que caulem, neq; fructum, neq; florem pro-  
fert. Ad eadem, ad quæ Celticū, efficax. Aeg.  
Nominatur etiam pyritis, iam commemora-  
tis est infirmior.

καρχα-

NACAPHTHVM. Vide Narcaphthum

μον.

NASTVRTIVM optimum constat ei-

Nasitert

ou cresō

de iardin

se Babylonicum. Aegineta, Semen eius fina-  
pis modo vrit, vnde etiam illitum cutem ex-  
asperat. Crassos humores cum aliis potum  
incidit. Herba quidem arida semini viribus  
respondet humida moderatior est, ideoque  
crudam ipsam assument.

νηριον, ρο

δοδερ-

ρουν.

Rosages

NERION aliqui rhododaphnen, alij  
rhododendron vocāt, frutex est vulgaris no-  
titia, longioribus quàm amygdala foliis, a-  
superioribusque: flore in rosam conformato:  
fructu nuci græcæ simili, corniculato, qui pa-  
tesfactus quandam lanoſam naturā ostendit,  
spinarum pappos repræsentātem: radice lon-  
ga, acuta, lignosa, gustanti salsa. nascitur in a-  
mœnis, maritimis, & secus amnes. Aegineta.  
Nerion extrinsecus illitū discutit: in corpus  
assumptum occidit.

NIGELLA quære Gith.

νυμφαία

offic. Ne

nuphar

NYMPHAEA nascitur in paludibus &  
stagnantibus aquis, foliis fabæ Aegyptiæ, mi-  
noribus, & longioribus. aliis in summa aqua



aliis demersis, pluribus ex radice eadem pro- vulg. iaul  
deutibus: flore lilio simili albo, & in medio net deau,  
crocos habente, cum defloruerit, vt rotundum ou chou  
malum, aut papaueris caput, extuberat. ni- deaue  
gro semine, denso, & lato, lenti gustus. caulis  
est læuis, niger, minimè crassus, ciborio co-  
gnatus. radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ  
autumno sequatur. Nymphææ nomen sibi  
vendicasse videtur, quoniam aquosa amet.  
plurima inuenitur in Elide, in Anygro ame-  
ne, & in Bœotia Alharto. Est & altera nym-  
phæa, cuius flos blephara dicitur, foliis ante-  
dictæ, radice alba, scabra, flore luteo, niten-  
te, rosæ simili. Nascitur in Thessalia, amne  
Peneo. Aegin. Nymphæa vires habet, sine ro-  
sione siccas, quibus & ventrem reprimat, &  
genituram arefacit. Quæ radicem albam ha-  
bet, valentior est, eoquæ fluxum muliebrem  
cū vino nigro & austero pota persanat. Quæ  
verò nigram, deterforia quoque vi nonnulla  
pollet, eaque vitilignes, alphos dictas, cum  
aqua exierit: pilorum defluuia cū pice liqui-  
da illita replet.

N V C E S auellanæ, quas & leptocarya vo- Noysette  
cant, stomacho infestæ sunt. Aeg. Vocant & ou auc-  
ponticas. frigidiores sunt, & austera: in cæte laine  
ris, iuglandibus æquales.

N V C E S iuglandes, quas nonnulli Persicas σιλικόν,  
vocant. Aegin. Nucis arboris coliculi aliquid ἢ πρσι-  
habent quod astringat, plurimum inglan- κόν, ποix



dium calyx puluvinatus. succus itaque eorum decoctus cū melle, stomaticū fit medicamentum. Interius inde putamen carinatū vltum extenuādi vim acquirit, & sine rofione ficit. Quod in eo clauditur edendo aptū, natura oleosum, facillē bilem auget. Confectum ex eo oleum extenuandi tumores, & putredines quas sepedonas dicunt, discutiendi vim obtinet. Flacceſcentes itidē vetuſtate nucis membranæ, cutis vitia abſtergunt.

κάριον  
ινδινόν.  
La grāde  
noix

N V X Indica à recentioribus Græcis recensetur. Fructus palmæ cuiusdam Indicæ præmagnus atque pinguis, cuius oleum butyro quoque præferunt, bonitate succi. Calefacit ſecundo, humidat primo. Bilioſis eo vſu interdicitur. Tineoſis ventris animalia pellit. Oleum quod ea exprimitur, cum ſentit vetuſtatem, ſtatus digerit. Lumborum & genuum dolores mulcet. Sanguini à ſpiraculis venarum ſedis mananti ſublinitur ex oleo, quod nuclei malorum Perſicorum reddiderunt. Veſicæ quoque malis opitulatur, & aluum ſiſtit oleum quod recens nux ſtilauit.

ὠκίμοι  
des.  
offic. &  
herb. al.  
ba cacia

O C I M O I D E S, Latini ocimaſtrum vocāt, folia fert ocimi, & ramos dodrantiles, hirsutos: ſiliquas hyoſcyamo ſimiles, ſemine vt githnigro, prægnantes. Aeg. Sunt qui philetarion



vocent. Inutilis quidem radix est: semē verò vulg. potularia  
 particulis tenue, citra rofionem siccans.

O C I M V M vulgò cognitum. Aegin. Cal. Basilic.  
 2. habet & humiditatem quandam extremē-  
 titiam, propter quam neque vtile est intus as-  
 sumptum: extrinsecus autem illitum discutit,  
 & concoquit.

O C Y M V M pabuli genus apud antiquos Dragee  
 erat, segete viridi, dissecta, antequam gereret  
 filiquas: eo citabant aluum bubus. Varro di-  
 ctum putat à celeritate proueniendi.

O D O N T I D E S fœni genus fruticosum, Dragee  
 triangulis flagellis, geniculatis, nigro arti-  
 culorum nodo, foliis polygono lōgioribus, Rust. fœ-  
 hordei semine in alis, cauliculis dēsis, ab ea-  
 dem radice geniculatis, flore purpureo pusil-  
 lo: nascitur in pratis. Dentium dolori mede-  
 tur cauliculorum eius decoctum in vino au-  
 stero: inde ductum nomen.

O E N A N T H E folia habet pastinacæ flo-  
 rem candidum: caulem crassum, palmi al-  
 titudine: semen atriplicis radicem magnam,  
 in multa rotunda capitula extuberantem. na-  
 scitur in petris. Caulis eius, & folia, cum mul-  
 so vino pota, secundas eiciunt. Radix è  
 vino, vrinæ stillicidio conuenit (& regio  
 morbo, vt Paulus adiecit, Dioscoridem ci-  
 tans.)

O E N A N T H E N diuersam in Vite sylue  
 stri dedimus.



**ἐλαία.** **OLI EA** E ramusculi quantum astringunt,  
**Oluiet** tantum etiam refrigerat. Fructus qui exactè  
 ematuruit, moderatè calidus est. Immaturus  
 maiorem tum astringendi, tum refrigerandi  
 vim repræsentat. Aeg.

**ἐλαίας** **LACHRYMA** quâ Aethiopica olea stil-  
**αἰδιοπι-** lat, scammonia similis quadantenus est, ful-  
**κῆρ δ' α-** ua, stillis exilibus constans, mordax. quæ au-  
**μενον.** tem ammoniaci, aut gummi similitudinē re-  
 fert, colore nigricans, nec gustu mordens, su-  
 peruacua est. Nostrates oleæ, oleastrique, si-  
 milem lachrymā sudant, quæ commodè ad  
 oculorum hebetudines illinitur. Appellatur  
 autem Aethiopica & agrestis olea. Aegine-  
 ta, Oleæ Aethiopicae lachryma ammoniac-  
 co tenui similis, vires habet extersorias: qua-  
 re ad cicatrices, albugines, hebetudinēsq̃ue  
 oculorum ea vtuntur, & ad dentium dolo-  
 res, si cauis ipsorum iniiciatur, efficax est.  
 Nonnulli verò syluaticam esse hanc oleam  
 asserunt.

**ὀνάγρα.** **ONAGRA**, siue onothera, aut onuris, fru-  
 tex est arboris instar, prægrandis, amygda-  
 lino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flo-  
 re rosaceo, magno: radice candida, longa: cū  
 ficcata est, vinum olente. nascitur in monti-  
 bus. Aqua in qua radix maduerit, in potu da-  
 ta, feras mitigat, & cicures facit. illitu quoque  
 tetra vlcera mulcet.

**ὀνοβρυ-** **ONOBRYCHIS**, folia habet lentis, lon-  
**χis.**



giora paulo, caulem dodrantalem, florē purpureum, radicem parvam: nascitur in vliginosis & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat. cum vino pota, strangurias sanat. illita ex oleo, sudores mouet. Rarefacit, & discutit. Reliqua sunt eadē Dioscoridi.

ONOSMA, oblonga folia habet. ad similitudinem anchusę, longitudine quatuor digitorum, & vnus latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore. radice nititur longa, tenui, infirma, rubescēte. gignitur in asperis. Aegineta, Onoma, vel onomis, vel phlomitis, vel ononis, acrem amarāq; vim obtinet, eāque ob causam folia eius cum vino pota, foetus occidunt, expelluntq;. (Hippocrates, Onosma simpliciter radicem appellasse mihi videtur.

ὄνοσμα.

OPIVM optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non vt cera coeat, & in sole diffundatur: dein admotum lucernis, non atra luceat flamma: extinctum denique, odoris vim cōseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucę succo adulterant. Verū glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi vitiatum,

Papaue-  
ris succus



splendescit, & infirmum est. Nec desunt qui eò dementiæ deueniant, vt adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorū medicamenta, dum mollius atque rufius appareat. Hoc autē modo is excipitur succus. Alii qui capita ipsa & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentēsq; in mortario digerunt in pastillos: id meconium vocatur, multū opio ignauius. Porro opij faciendi ratio hæc est, Cū ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutē incidere oportet, lachrymam exeūtem digito in concham abstergere: nec multo post redire, vt cōcreta inueniatur. etenim quæ tum, aut postero die etiā offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos cogi. Cū tamen inciditur, retrocedendum est, ne vestibus succus deradatur. Aeg. Papauer, quod prolixiore & proceriore cōstat calyce, medicatius vniuersis est: quapropter stuporē inducit, quousq; interimat. Nam & ipsum, & eius lachryma, quam per excellentiā opion nūcupant, quarto refrigerantium abscessui ascribuntur.

O P O P A N A X, lege Panaces.

obier ou  
opier

O P V L V S corno similis arbor, arbusculo Gallico faciundo idonea, vltimi proceritate adolescit, caudice recto, enodi, rarioribus ramis brachiato, frondibus ferē vitigneis, bacis racematim dependentibus, prima puber-



tate viridibus, à maturitate puniceis. Ieiunū solum horret. Vitem alit: verum quia frondē non habet idoneam, à plerisque repudiatur. Nullus eius in medicina traditur vsus.

Testiculus, quem Græci cynosorchin vocāt, foliis circa caulem mollis oleæ similibus in terra stratis, longioribus angustioribus, leuibus caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, vt bulbi. nascitur in petrosis, & sabuletis. Testiculus alio nomine serapias, Andrea authore, vocatur: quoniam radix ad multa utilis sit. foliis est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarū sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis, radice testiculis simili. Aegineta: Maioris in cynosorchi radice humida vis & calida est, eoque venerem incitat. Minoris calida & sicca, vnde venerē coërcet. Serapias, vel thriorchis, priore valentius desiccatur, quare laxos tumores dissipat, vlcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpetas abigit: inarescēta autem magis siccatur. Quoniam verò substringere idonea est, aluum quoque cum vino pota retinet.

OREOSELINVM, caule est dodrantē alto ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum rami & capitula cicutæ, multo tamē te-

ὄρχις.  
offi. testiculus  
canis  
& satyri-  
on min.

σεραπίας

ὄρειοσειλή.  
von. Nō ē  
apiū mō-  
tanum.



nuiora : semine cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. nascitur in petrosis, & montibus. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in saxis provenit. aliud enim est petroselinum. Aegineta, Viribus domestico æquale est, validius tamen.

ὀρίγανον.

Origane  
ou mario  
laine dā-  
gle terre.

ὀνίτις.

Mastich-  
ma herba  
vulg.

ὀρίγανον  
ἀγρίον.

ORIGANVM Heracleoticum, quod & cunilam vocant, folium habet hyssopo non dissimile, umbellamque nō in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti multifidam, semine in summis virgis haudquaquam denso.

Quæ onitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei origani Heraclæi, sed multo inefficacior. Sylvestre origanum, aliqui panaces Heraclion, alii cunilam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius : foliis est origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi, radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente, folia & flores ex vino poti auxiliatur. Aeg. Omnia origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, & calefaciendi vires in tertio abscessu ostendunt.

ὄρυζα.

Riz ou  
hordeū  
gallaticū

ORYZA frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Mediocriter alit. Aeg. Vim quandam astringentiam præ se fert, qua etiam ventrem mediocriter cohibet.



**ORNEOGLOSSON** arbor est vlmī spe- ὄρνιθον-  
γλασσον.  
off. lague  
doyse.  
cie, foliis amygdalæ, prælongis filiquis in sur-  
culorum cacumine prodeuntibus oleagina  
magnitudine, in quibus medulla inest lin-  
guæ auis similis, vnde nomē: exterius rubra,  
intus ex candore in luteum vergens: sapore  
acri, cum nonnulla amaritudine, Ea cal. 2. la-  
terum dolores sedat, vrinam ciet, venerē sti-  
mulat, genituram auget.

**ORNITHOGALVM** cauliculus est te- ὄρνιθον-  
γαλον.  
Charles.  
ner, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus  
aut quatuor in cacumine mollibus agnatis, à  
quibus flores prodeunt, foris herbacei: & cū  
hiantes se pādunt, lactei visuntur: inter quos  
dissectum, cachryos modo, capitulum emi-  
cat. Coquitur cum pane, vt melanthium. ra-  
dix bulbosa, cruda & cocta manditur. (Aeg.  
non scripsit.)

**ORNVS** arbor satis procera, caudice te- Fresne  
chāpe-  
stre.  
reti, læui cortice, spisso, ramulis vtrinque pin-  
natis, folio fraxini, paulo profundiorib⁹ cre-  
nis per ambitū serrato, bacculis racematim  
coactis, ab adolescentia rubescentibus, secun-  
dum maturitatē ex purpura nigricātibus, sa-  
pore ex acido in amarū degenerante, mespi-  
laceo quasi concretu, multo graciliore. Habi-  
tu reliquo & effigie tota fraxinum æmula-  
tur. quare Lucio Columellæ orni sylvestres  
fraxini sunt, foliis quàm ceteræ latioribus,  
nec deteriorem frondem, quàm vlmī præ-



stant. Capræ autem & oues libentius etiam hanc frondē appetunt. Asperis & frigidis locis gaudet, mōtes amat: In plana etiā descendit, ita ut viti quoque copuletur. folia ex vino bibuntur ad iocinoris & laterum dolores, aquæ subter cutē tumores reprimunt. Corpus obesum sensim ad maciem reducunt, si cum vino terantur ad virium portionē, ita ut puero quinque; folia tribus cyathis dentur, robustioribus septem quinque vini cyathis. Scobs eius & ramenta perniciose traduntur, proinde vitanda.

ὄροβανχον  
Tenic.

OROBANCHE cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, & in luteū vergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quædam legumina nasci constat, & ea strāgulare. vnde orobanche sibi cognōmētum usurpauit. Estur, ut olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. legumentis addita, coctionem accelerare creditur. Aegineta, Frig. sic. i.

ὄσυρις.  
offi. linaria.

OSYRIS, frutex est niger, ramulos ferēs tenues, lentos, fractūque contumaces: & in his folia quaterna, quina, senave, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescētia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos. Aeg. Osyris, è qua scopæ fiunt, amara est, & iecoris referandi vires habet.



**OSTEOCOLLON** Macedones vocant ὀστεόκλον.  
 herbam saxi & mœnibus familiarem, medi  
 ci polygonion, aliqui talantion, vulgus sym Symphy  
 phyton appellant. Perpetuò viret, viuítq; fo ton uulg.  
 lius vidua: ramulos instar iuncipensiles, cir-  
 rosos, tenuioris proceriorisque spartí simi-  
 les spargit. Hac tradunt dissectas carnes coa-  
 lescece, si coquatur vnà, itidē ossa fracta fer-  
 ruminare.

**OTHONNA** aliqui maioris chelido- ὀθοννα.  
 niæ succū esse aiunt. quidam glauci. alii suc-  
 cū floribus corniculati papaueris expressum.  
 alii permistos cœruleæ anagallidis, hyoscia-  
 mi, & papaueris succos, esse contendunt. alii  
 Trogloditicæ cuiusdam herbæ succum, quæ  
 othonna vocatur: nascíq; eam in eo Arabia  
 tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna  
 foliis erucæ, perforatis cribri modo, & velu-  
 ti à tineâ derosis, squalore obfritis, paucis, flo-  
 re croci, latifolio. quare quidam anemones  
 speciem esse putauerunt. Aliqui tamen affir-  
 mant, lapidē esse Aegyptium, in Thebai-  
 de nascentem, exigua magnitudine, æreo co-  
 lore, gustu, cum feruore quodam & astricti-  
 one mordaci. Aegineta, Othonna detergit,  
 erodítq; omnia quæ claritati oculorum offi-  
 ciunt exterens.

**OXYACANTHA** Quære Acuta  
 spina.

**OXYAN** Græci fagi genus alterum vo- ὀξύαν.



**Non est** cant. Lydi Myson, nostri Scissimā: in tenuissi-  
**ornus.** mas enim secatur laminas. Glandifera non  
 est, abietis aspectu, florens, erecta, enodis, il-  
 li crassitudine proceritateque ferè æqualis.  
 materia colorata, robusta, neruosa, cortice le-  
 ui, folio crasso, bifido, longiore quàm pyri,  
 per extremum aculeato. Fructus glandea ef-  
 figie læuis, calyculo includitur echinato qui  
 dem, sed placido ac blando, nec vt castanea  
 hispido, cui nihilominus similis est & dulce-  
 dine & succo. Radices arbor nec multas nec  
 altas agit, quæ summo cespite gaudeant. Mi-  
 noribus nauibus cōmendatur: ad carinas, itē  
 ad testudinē plaustrorum, veltabulorūque  
 vilem fabricam specie visenda.

**pain à co** qu, offic. **O X Y S** herba Plinio à sapore dicitur, tri-  
**trifoliū a** bus tantum foliis.

**cetosum,** **P**  
**ou alle-** **AEONIA**, siue glycyfide, Græcis  
**luya.** **P** aliquibus Pétoboron dicitur. sunt

**παιονία.** qui Idæos dactylos radicem παο-

**Piuoine.** niam vocant. caulis altitudine sesquipedis a-  
 dolescit, comitātibus multis stolonibus. Hu-  
 ius duo genera, mas folia iuglandis habet: in  
 fœmina verò, smyrnii more diuidūtur. sum-  
 mo caule filiquas emittit, veluti græcas nu-  
 ces. in quibus, cum dehiscunt, multa granula  
 rubra, acinis puniceorum similia, inueniūtur,  
 & in medio nigra, quinque aut sex, purpurea.  
 radix maristenuis, digitali crassitudine, &



palmi longitudine, gustu astringēs, alba: foeminae radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inherēt, vt in hastula regia. Aeg. Alii qui pētameron vocant. radicē habet acré, & leuiter subamaram, & ficcantē cum nōnulla astringēte. menses cit, renes & iecur purgat instar amygdalæ pota cum vino: quod si austerum sit, alui quoque fluores coërcet. adalligata verò puero, morbum comitiale abigit.

**PALIVRVS** frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. Aegineta, Paliuri folia & radix astringunt, cōque aluum fluentē sistunt: eubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis calida discutiunt. Semen eius tam vehementi incisoria virtute valet, vt & calculos conterat, & excreationibus è pectore auxiliatur.

παλίχρος  
Aubepi-  
ne, senel-  
les, grose-  
lier. aliis  
ioumarī,  
ou ioma-  
rin.

**PALMA** in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis vigore, autumnō decerpi solet, Arabici myrobalani similis, pomatis cognomine, colore viridi, & odore mali cotonei. Quod si ad maturitatem peruenire sinatur, phoenix balanus fiet.

φοίνιξ  
Palme.

**PALMA**, quam aliqui elaten aut spathan ἑλάτῃς appellant, fructus palmarum adhuc florentium, inuolucrum est, calyxque, quo inspissamenta vnguentarii vtuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa: præ-



**Palmula** clusa, intus pinguis. Aegine. **Palmae fructus**,  
 vulg. **Da-** qui iam ematuruit, calidus mediocriter est,  
 res ou fi- visceribus roborandis & stomacho idoneus,  
 gues roy tum intus assumptus, tum foris applicatus.  
 alle. Reliqua palmae portio vehementer astrin-  
 gens est: quamobrem stomachicis & hepaticis medicinis temperatur: longè magis astringit, quod fructus enascentis veluti in uolucrum est.

πάνακις  
 ἡράκλει-  
 ον.

**PANACES** nonnullis heracleum dicitur, ex quo opopanax colligi solet. plurimū in Boeotia & in Phocide Arcadiae nascitur: ibiq; compendii & questus, qui ex eo liquore factitatur, gratia studiosè colitur. foliis est asperis, in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulaea accedentibus, in ambitu quinquepartitò diuisis: caule, ut ferulae, altissimo, qui lanugine quadam incanescit, foliis etiā minutionibus obsitus, muscaris, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato, feruentēque radices habet multas ab origine vna, candidas, graueolentes, crassae corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libya, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice recenti cauliū pullulatu. ea candidum succū emittit, qui ficcatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentē autem succum excipiunt, foliis excavato folio statis, quae siccata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximunt.



eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; siccæ, quæ carie non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maximè in hoc succi genere probatur, quàm amarissimus, internè albus, aut subfulvus, foris ad croci colorem inclinans, lævis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco, aut cera. Sed sinceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resol-uatur, & lactescat. Aeg. Opopanax cal. 3. sic. 2. emollit, discutitque. Radicis cortex est imbecillior liquore. habet nonnihil & abster-gens, & carni inducendæ idoneum. Semen menses quoque citat.

ὀπὸπᾶ-  
ναξ.  
Succus.

PANACES Asclepii caulem à solo emit tit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus quàm fœniculi foliis, hirsutioribus, odoratis: aureo flore, acri, odorato, ex mustariis dependente. radix parua est, & tenuis. Auxiliarem vim habent flores & semina, cōtra vlcera, phagedænas, & tubercula, si trita cum melle imponantur, aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum vocant, alii cunilam, de qua in Origani mentione diximus.

πάνακις  
ἀσκληπι-  
όν.

PANACES Chironium in Pelio monte

πάνακις  
χειρώνιον

m



maximè prouenit. folium eius amaraco simile. flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu acris. Pota radix, serpentium veneno resistit: illita coma, eadem præstat. Aegineta, Asclepion panaces & chironion priori calidiora sunt (malim cum Galeo dicere, minus calida) hinc floribus ipsorum & semine ad malefica vlcera & phymata vtuntur.

παγκράτιον.

Aliis choriū.

PANCRATIUM, quod aliqui scyllam appellat, radice est magni bulbi, subrufo colore aut sub purpureo, gustu amaro ac feruente: foliis lilii, sed longioribus. Aegineta. Specie ac viribus scyllæ simile est, verum imbecillius.

μέλινοσ.  
Painz.

PANICUM frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile: eodémq; modo in panes subigitur. eosdem habet vsus: minus tamen & nutrit, & stringit. Aëtius: Extrà illitum refrigerat & exiccat.

μῆκκν.  
Pauot of  
sic. papauer cor-  
nutum.

E satui PAPAVERIS genere, quod hortense est, semen in panē densatur, qui sanis in vsu sit. eo etiā ex melle pro sesama vtūtur. thylacitum vocant. capitulum habet longū, & semē candidum. Syluestre verò, caput infidens demissumque, & nigrum semen, quod pithitis nominatur: nonnullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniam eius scapo lacteos succus emanat. Tertium magis syluestre, & ad medicinas valētius, multo his lon-



gius productiore capitulo. Aegineta, Hortē-  
sis papaueris, thylacitin etiam uocant, semē  
esculentum mediocriter somnum conciliat.  
Quod veluti decidēti ac depresso calyce est,  
nigrum semen habet & medicatum, nimis  
quā frigidum. Quod prolixiore & proce-  
riore cōstat calyce, medicatius vnuerfis est,  
quapropter stuporē inducit quousq; interi-  
mat: nā & ipsum & eius lachryma, quam per  
excellētiā opium nuncupant, frig. 4.

PAPAUER erraticum, quod rhœada vo *ῥοιὰς*  
cant, vere quidem in aruis cum hordeo nasci off. papa-  
tur, flore protinus deciduo, vnde & nomen uer rubrū  
apud Græcos accepit. folia crucæ, aut origa rust. coco-  
no, aut cichorio, aut thymo similia spectan-  
tur, sed longiora, diuisa, scabra. iunceus ei quelicoc-  
caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris ou pou-  
anemones, puniceus, interdum albus: ob-  
longum caput, sed quā anemones minus:  
semen rufum: radix longa, subalbida, mi-  
noris digiti crassitudine, gustu amara. Aegi-  
neta: Rhœas appellatur quod flos ipsius cele-  
riter defluat (vel semen, vt apud Aeginetam  
legitur.) Validius hortensī est. Manducatur  
itaque non per se, sed momentum copiosio-  
ri melli mixtum.

PAPAUER ceratites, id est, cornicula-  
tum. folia habet candida, hirsuta, verbasco *μήκων*  
similia in ambitu syluestris papaueris more *κίχαλῖτις*  
ferrata: caule non dissimili: flore pallido,



caliculo fœnigræci, in corniculorū modum inflexo, vnde nomē mutuatur. semine papaveris, pusillo, nigroq; radice per summa cespitum nigra, crassa. nascitur in maritimis & asperis. Sunt qui glaucium hoc papaveris genere factitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione. Aegineta: Abstergendi vires sortitur, ideoque radicis ipsius decoctū potu iocinorosis auxiliatur: folia autem & flores per quā sordida vlcera expurgant, crustasque tollunt.

ἄφροδης

Aliud papaveris genus aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab aliis heracleum, caule dodrantali: foliis admodum parvis, radiculæ similibus, fructu inter ea candido. Nam herbula alba est, & spumea tota: radice in summo cespite. Aegineta, Semen habet pituitæ purgandæ accomodatū.

πάπυρος.

Non est charta, q̄ vulgo papier.

PAPYRVS, qua chartæ fiunt, nullis nō cognita. Aegineta: Papyrus ignē non experita, materia quædam efficitur: vsta, siccat charta crematæ modo, verū papyri cinis viribus inferior est.

παρωνυχία.

PARONYCHIA exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus foliis. Aegineta: Illita paronychis atque duritiis remedio est. Vis eius extenuare & siccare, idque citra rosionem.

παρθένιον.

PARTHENIVM, aliqui amaracon vocant, foliis est coriandri, tenuibus: flore per



ambitum albo, intus melino, odore graui, sa of. & her.  
pore amaro. Aegineta: Amaracus calefacit Matricai  
tertio, siccat secundo.

re.

PASTINACA syluestris folia gingidii  
habet, latiora, subamara: caulem rectum, sca Panetz.  
brum: umbellam similem anethi, in qua flo-  
res insunt candidi, & in medio purpureum  
quiddam, ferme croceum. radix digiti crassi-  
tudine, dodrantalis, odorata, que cocta man-  
ditur. Satiua ad eadem pollet, inefficacior ta-  
men, & cibo aptior. Aegineta: Vrinas & me-  
ses mouet, praesertim semen ipsius, & radix.  
folia autem absterge di viribus praedita, pha-  
gedaenicis affectibus congruunt, viridia cum  
melle. Syluestris ad omnia valentior est do-  
mestica.

Pastina-  
de ou ca-  
rottes.

PEPLIS, quam aliqui syluestrem portu  
lacam vocant, Hippocrates peplion, in mari  
timis maxime nascitur, late opaco frutice, ca  
didi succi pleno: foliis satia portulacae, ro-  
tundis, inferne rubentibus: semine sub foliis  
rotundo, uti in peplo, feruente gustu: radice  
singulari, superuacua, tenui. Colligi, & repo-  
ni ac dari, uti peplos, & sale codiri solet. Eas-  
dem habet vires. Aegineta, Peplion caetera  
quidem inutile, semen autem ipsius feruidi  
saporis, peplo consimiliter expurgat.

πεπλίσ.  
Non est  
fena.

πέπλος.

PEPLOS frutex est lactei succi plenus, rur. reueil  
foliis paruis, ut rutae, paulo latioribus: rotun-  
da coma, fere dodrantali, humi respersa: se.

de vignes

m iii



mine sub foliis rotundo, minore quàm candidi papaueris. pluribus scatet auxilijs. vnicam radicem habet, superuacuā, ex qua fruticat. nascitur inter vites, & in hortis. colligitur messibus, ficcatur in vmbra, & continuè versatur. fructus tusus & feruefactus reconditur. Aegineta: Nonnulli papauer spumeum vocant, liquorem habet, & tithymalorum modo purgat.

πέπων.  
Pepon.

PEPON abstergēdi facultate efficax est, inde veluti caro ipsius ephelidas, & confimilia viria faciei exterit, semē renes obstructione liberat. Aegineta.

PERICARPVM bulbi genus est, eius duæ species Plinio, cortice rubro alterum, alterum nigro, papaueri simile, sed vis maior quàm priori: vtrique autem exalfaciendi, ideo contra cicutam dantur.

περικλῦ-  
μενον.  
Capri-  
feuille,  
ou vinci.  
bosce.

PERICLYMENON simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcādida, hordeacea. inter folia surculi exeunt, in quibus baccæ, hederæ similes: flos fabæ, candidus, aliquantū rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficilè euellatur: radice rotunda, crassa. nascitur in aruis ac sepibus cōuolvens se adminiculis, propter assidētibus. Aegineta, Eius folia & fructus incidendi simul, & calefaciendi vires obtinent, quapropter vrinam cruentam eliciunt ad sex dies pota.



(Quidam hic numerum dierum perperam quatuor aut quadraginta legunt.) Geniturā viri exiccant quadraginta (aut secundū Dioscoridem triginta septem) diebus in portione assumpta: item lienosos & agrè spirantes adiuuat.

**PERISTEREON**, siue verbenaca nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videtur, quod columbæ circa hanc per quā libenter versari soleant, dodrātis altitudine, & interdum amplius adolescit. folia è caule prodeunt incisa & subalbida. ea singulari ramo, radiceque sola, constare sæpius inuenitur. Aegineta, Adeò ficit astringitque vt vulneribus glutinandis, & sanguinis eruptioni sistendæ sit. Eius alterum genus in Sacra herba quære.

**PERSEA** arbor est, in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho utilem. in quo phalāgia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in perfide exitiosam esse, translatamque in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam. Aegineta, Folia siccant, & astringunt, eoque sanguinis eruptionem compescunt.

**MALI** Perficæ furculi & folia euidenter amara sunt, eoque concisa tritaque vmbilico

περίσσων.  
Nō ē hęc  
ornalaou  
toute bō-  
ne.

περσία.

μηλία  
περσική.  
Peschier.

m iiii



imposita lumbricos enecant. fructus autem  
ipſius, nempe Perſicum hoc eſculétum, frig.  
hum.2.

ἀρεῖον,

προσώπι-

ον. Glete

ron.offi.

bardana

ou lappa

maior.

Videtur

eſſe cor-

nu cerui.

πετασί-

της.

Rur.ma-

ior barda

na.

PERSONATA folia habet cucurbitæ,  
maiora & hirsutiora, nigriora & craſſiora:  
caulem albicantem: quanquam & interdum  
vidua caule reperiatur, radice intus candida,  
foris nigra. Aegine. Diſcutit, ſiccatur, & aſtrin-  
git, quapropter & folio ipſius vetuſta vlcera  
perſanant.

PES MILVINVS à Columella in v-  
ſum colligi & reponi iubetur, ſed qualis ſit  
non explicuit.

PETASITES pediculus cubito maior,  
craſſitudine pollicis, à quo prægrande foliũ,  
galeri modo amplum, ceu fungus dependet.  
Contra phagedænas, & vlcera quæ cacoëthe  
vocant, efficaciter illinitur. Aegineta, Sic.3.  
vnde ad malefica & phagedænica vlcera eã  
uſurpant.

Oillet

dinde.

PETILIVS flos eſt autumnalis, circa  
vepres naſcens, calyculo verſicolori, foliis  
quinq;, paruis. Tantum colore commenda-  
tur, qui eſt roſæ ſylueſtris. Mirũmq;, in eo flo-  
re inflecti cacumen, & non niſi retorto folia  
naſci. Semẽ luteum paruo calyci includitur.  
Vſus in medicina nullus. Huic Plinius Italiã  
ait nomen dediffe, tanquam nimirum Græ-  
cis ignoto.

πετροσί-

λινον.

PETROSELINVM in Macedonia pro-



uenit, in præruptis locis: semine ammij, odo- Persil de  
 ratiore, sapore acri, aroma olente. Aegin. Se- Macedoi  
 men cal. sic. 3. Vi incisoria præditum, vrinam ne  
 ciet, mensesque trahit, flatibus discutiendis  
 accommodatissimum.

PEUCEDANVM, caulē emittit tenuem, πευκεδά  
 gracilentum, fœniculo similem. comam ha- νον.  
 bet statim ab terra foliosam, spissamq; flore Peucedā  
 luteo, radice nigra, crassa, plena, graui odore ne oucne  
 succosa. gignitur in mōtibus opacis. Tenera de porce-  
 radix cultello conciditur, profluensq; è pla au.  
 ga succus vmbraē mandatur. in sole siquidem  
 confestim euanescit. Colligitur, capite prius  
 & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor  
 premat, & vertigo sentiatur. affatione radix  
 inutilis fit. Tam lac quàm succus radice &  
 caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora.  
 verum inefficacior succo lachryma habetur,  
 & velocius expirat. Interdum etiam concreta  
 inuenitur lachryma thuris similitudine, cau-  
 libus radicibusq; adhærēs. Præfertur succus è  
 Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore  
 graui, feruens gustu radix eligi debet recēs,  
 quæ cariem nō senserit, firma, odoris plena.  
 Succus ad potiones amaris nucibus, aut ruta  
 aut pane calido, aut anetho resoluitur. Aeg.  
 Peucedani liquore & succo affatim calefaci-  
 enti, discutienti, extenuantique vtimur, tum  
 naribus admoto, tum in potione assumpto,  
 ad pulmonum & pectoris vitia ex humorum



crassitudine contracta, item ad lienē induratum: dentibus autē perforatis impositus, dolorē protinus sopit. neruorum affectibus idoneus est. Radix squamas ossium separat, maleficis vlceribus succurrit. Cal. sic. 3.

φαλάγγιον.

PHALANGIVM à quibusdam phalangites vocatur. ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve, indiuersa tendētes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habēs. semine nigro, lato, ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multo tenuiore: radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur. prouenit in collibus. Aegineta, Nomen hoc inuenit quod phalangiorum moribus medeatur. Naturæ subtilis est excicantisque, qua torminosis auxiliari putatur.

φάλαρις.

PHALARIS cauliculos emittit ex culmis similes minutis ac nulliusvſus radicibus, multos, duūm palmarum, geniculis cinctos, graciliores tamen ac dulces: semen cādīdum, oblongū, milij magnitudine. Succus eius folia & semen pota vesicæ doloribus auxiliatur. Habet eadem herba tenuem quandā vim naturamque calidam.

φάσιος.

φάσιλοι.

PHASIOLI mentio facta est in Isopyro. PHASELI, aut phasioli qui & dolichi appellantur, macerati donec radices succreuerint, ex garo ante cibū sumpti, aluum subducunt, ac plus quàm fœnumgræcum alimenti exhibent. Integri verò cum filiquis virides



comesti, plura pariunt excrementa. (Descriptionem habes in similace hortensi.)

PHELLANDRION in palustribus nascitur folio apij. Bibitur semen eius propter calculos & vesicæ incommoda.

PHYLLITIS, folia promit rumici similia, longiora, & viridiora, sena aut septena, recta, quæ parte anteriore lævia cernuntur, à tergo autem pèsiles quasi vermiculos tenues ostendunt. in vmbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbis. neque caulem, neque florem, neque semen profert. Aeg. Cum acerba sit, non immeritò alui profluuiis pota auxiliatur.

PHYLLVM, quod clæophyllon vocatur, in saxosis nascitur. duùm generũ est. quod autem thelygonũ appellat, vuas habet floribus oleæ similes, pallidiores tamen. foliis itidem oliuæ est: caule tenui, breui. radice exili. florẽ album profert: semẽ papaueris maiusculum, Sed arrhenogonum cætera huic simile, solo fructu distat, habet enim racemosum quiddã deflorentibus oleis non dissimile. Ferunt potum alterius semen maris, alterius verò fœminæ conceptũ facere. Tradidit hæc quondam herbarius Crateias, placuitq; mihi vsque ad historiam, nec vltra de his docere. (Aeg. non meminit.)

PHYTIVMA folia habet radiculæ, minoræ: copiosum semen, perforatum: radi-

φειλλάν

δριον.

potatur

esse offic.

filipédu.

la aut

herb. filer

aquaticũ

φυνκίτις

Non est

lingua

cerni off.

φόλλον.

φύπνμα.



cem paruam, tenuem, per summa terræ nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt. Aeg. non memorauit.

φλίον.  
Dubitat  
an sit sca-  
bioſa  
vulg. &  
pſora Aë-  
tij.

PHLEON Theophrasto, nonnulli stœbā appellāt. (sed nos infrā stœben longè diuerſam afferemus.) Non solum caulē habet aculeatum, sed & folium quoq; hispidum, iuxta cuius spinas aculeos etiam condit, radice nō in profundum acta. Germinat cum Vergiliis, primōque aratro vna nec folia dimittit, etenim annicula illi vita, sæpēque bimatū excedit.

φλοῦμ.

PHLV M à superiori longè diffidet, cuius lanugine, vt inquit Theophrastus, ad lixiuū mulieres vtantur, molle & placētaceum est, colore subrubido. Fœmina sterilis est, ad nexu idonea. Mas prorsus habetur inutilis. in insulis fluitantibus prouenit. Pars ab radice pueris cibo grata est. Radix ipsa pecudū pabulo vellitur. (Phlum Iulius pollux nominauit, vnde Phloinas vestes in Herodoto quis legat, & Pausania.)

φοῖνιξ.  
Aucine  
ferule  
multis

PHOENIX folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicam lolio similem: calamos digitorum senūm, radici aduolutos: septenas octonasve spicas. In aruis tectisq; recter illitis nascitur. Aegin. Aliter rhu vocatur: astringēdo, in vino austerā pota, omnes fluidos affectus sistit.

φόρμιον.

PHORMION tenuis, absterſoria, & at-



tra&ricis est facultatis: semen igitur cū melle albugines extenuat, & spicula ē corporibus extrahit. Galen. & Aeg. (Hoc ab hormino, cui eadem ascribuntur, non dissidere iudico: nam Galenus phormij tantum meminit, nō etiam hormini.)

PHV, quod & aliqui syluestre nardū ap-  
pellant, nascitur in ponto, folio olusatry, aut  
claphobosci, caule cubitali, aut altiore, læui,  
cauo, molli, in purpuram vergente, genicu-  
lis intercepto: floribus narcisso proximis, ma-  
ioribus, teneris, & exalbicante purpureis: ra-  
dice superius ad digiti minoris crassitudinē,  
ex obliquo villosa in nigri veratri aut iunci  
odorati modum: capillamentis inuicem con-  
textis, flauescens, odoratis, cum quadam  
odoris grauitate nardum emulantibus. Adul-  
teratur radice rusci admista: sed maleficium  
deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frā-  
genti contumax, sine vlla odoris gratia. Aeg.  
Radice habet nardi persimilem, quæ tamē  
ad pleraque infirmior sit: sed vrinas magis q̄  
ea elicit, nardi Gallicæ modo.

PINVS Picea generi eidem ascribuntur,  
sed quandam flagitant specierum distinctio-  
nem. arbores vulgò cognitæ. Piceæ cortex a-  
stringendi vim eximiam possidet, qua inter-  
trigenes & ambusta illitum persanat, vērem  
potus reprimit: folia etiam vulnera congluti-  
nant. (Eadem ferè de pinu tedāq; scribuntur.)

φoῦ.

Valeria-  
na maior  
ou vertē-  
tre cumπίτυς  
πίυκη  
Pin



Aeg. Peuce, id est, teda vires habet piceæ, sed imbecilliores.

ΠΙΤΥΙΔΕΣ

PITYIDES fructus sunt picearū, mistæ facultatis, astrictoriæ & acris, quamobrè reiectionibus è pectore opitulantur. Aeg.

ΠΥΚΝΟΚΟΜΟΝ.

PYCNOCOMON constat crucæ foliis, actioribus, scabris & crassis: caule quadrangulo: flore ocimi: semine marrubii: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redolente. inuenitur in saxosis locis. Aegineta, Discutit & acre est. folia igitur panos & furunculos dissipant. Semen infixæ corporibus extrahit. Radix flauam bilem purgat.

ΠΙΠΕΡΙ  
Poure

PIPER in India nasci, breui arbore traditur. quæ inter initia, prælongū fructum, veluti siliquā promit. quod longum piper est, habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectū piper euadit. id autem suis temporibus dehiscēs, pandensq; sese racemos emittit, grana ferentes qualia videmus. Ea acerbæ candidum piper faciunt, aptum ocularibus remediis, antidotis, & medicaminibus, quæ cōtra venenata parantur: theriaca vocāt. Longum verò vehementius mordet. Et quoniam priusquàm ematurescat decerptum est, subamarum relinquitur, antidotis & theriacis medicaminibus expetitur. Nigrum verò, utpote quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratum esse constat, candido sua-



uius, acrius, & ori gratius, nec non ad condimenta vtilius. Sed candidum, & adhuc in acerbum vergens, antè dictis infirmius est. Eli gi oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis recens minimè furfurosum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, casta, inania, minimèque ponderis, quod vocant brasma. Non est huius arboris radix gingiber, vt aliqui existimauere, sicut paulò pòst ostendemus. Námque piperis radix cocto similis est. ora gustatium accendit, saliuam ciet. hæc lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota. caput etiã purgat, manducata cum semine pedicularis herbæ, quam staphidem agriam vocant. Aegin. Piperis radix, costi vires refert. fructus nuper quidem germinantis arboris, oblongum est piper, humidum natura, & calidum. fructus veluti acerbus immaturusque album est piper, nigro acrius, vt quod multo magis asatum sit: vtrunque verò & calefacit & deficcet.

PYRETHRVM saliuarem vocant, folia caulèmq; emittit vt daucum syluestre & fœniculum: umbellamque anetæi, circinata rotunditatis. radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Aeg. Radix eius vrentè obtinuit facultatem. dentiũ ex frigidityate dolores mitigat. ad febrium rigores ante accessionem infricatur cū oleo, Corporibus

πύρετρον  
Piretre  
ou pie  
d'Alexan  
dre



à perfrictione stupentibus resolutisq; efficacissimè adhibetur.

*ὄνη, ἄποιος* PYRVM terrestre aliud sortitū est, aliud  
Poire aquosum, ob quod stomachum iuuat, sitim-  
que arcet: illitum verò sic. frig. mediocriter.

*ἀκίνα* Aegineta.

off. fisti. PISTACIA, quæ cōstat in Syria gigni, pi-  
ca & fisti neis nucib<sup>9</sup> similia sunt. Aeg. Stomacho me-  
corū gra- diocriter conducunt, iecur obstructum rese-  
na rant, præcipuè summi & odorati eorum ope-  
rimenti ex vino decoctum. Prosumt etiā con-  
tra serpentium morsus.

*πισολοχία* PISTOLOCHIA Plinio aristolochiæ  
genus est quartum, tenuior quàm clematidis,  
densis radicis capillamentis (vnde & polyr-  
rhizos nominatur) iunci plenioris crassitudi-  
ne. Odor vt reliquis medicatus. Illita serpen-  
tiū moribus medetur. Quin & omnino sus-  
pensa supra focū fugat domibus sepentes.

*πίσον* PISVM pariter Græci & Latini vocant le-  
Pois gumen, caulibus fistulosis in terram sparsis,  
ramosisque, prætenui surculo, folio frequēti,  
præter cæterorū morem longiusculo, siliqua  
cylindracea, granis rotundis, candidis, flore  
papilionis forma, circa vmbilicū purpureo,  
radice imbecilla. Grana in valvulis se inuicē  
quasi tangunt, vt in eruo. Galenus, Pisa fabis  
non dissimilem retulere naturā, nec diuerso  
ab illis modo manduntur. sed nō adeò vt fa-  
bæ inflāt, nec abstergūt: ideóq; segnius aluo  
quàm



quàm ille excernuntur. Decoctorum cremor aluum ciet. Recentia, quæ cum suis valuulis manduntur, ructus mouent.

**PITYVSA** M specie à cyparissia differre πῖτυς  
constat, & si tithymallorū generi assignetur. σα.  
caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geni off. herb.  
culatus: foliis piceæ, acutis, exilibus: flore par & med.  
uo, velut purpureo: semine instar lenticulæ, esula. græ  
lato: radice crassa, candida, succo referta, qui ci turbet  
busdam in locis frutex hic prægrandis inue- & turbe-  
nitur. Aeg. Liquorem vt tithymallus habet, ton.  
eique similiter purgat.

**DUO PLANTAGINIS** genera. minor ἀρνόγλωσσος  
folia habet angustiora, minora, molliora, læ σεν.  
uiora, & tenuiora: caule anguloso, in terra off. lance  
sessili: floribus pallidis: semine summis cauli. lotte  
bus emicante. Altera maior, lætior, viren plantain  
tiorque, latis constas foliis, oleracei generis,  
cuius caulis cubiti altitudinem petit, angu-  
losus, subruber, à medio ad verticem tenui se-  
mine circumdatus. radicibus nititur teneris,  
hirsutis, candidis, digitum crassitudine æ-  
quantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, &  
locis humidis. multo vtilior magna est. Aegi-  
neta, Plantago frigefacit, siccatur. Tempera-  
ta est ex aquea & terrestri substantia, cui e-  
tiam distractionis nonnihil adest: quo nomi-  
ne ad maligna vlcera, fluxiones, putredines-  
que accommodata est, temperamenti mode-  
ratione sanguinis quoq; profluvia cohibet,



& plurimum congruit. compos enim est siccitatis minimè rodentis, & frigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

πλάτα-  
νος.

PLATANVS vi humidior & frigidior poller, eaq; de causa folia viridia ad inflammationes nascentes proficiunt. Cortex & pilulæ quoniam maiorem siccandi potentiã habent in aceto decoctæ dentium dolores sopiunt, ambusta cum adipe persanât. Cortex autem crematus siccatur vehementius, & abstergit, eoque lepras pellit, & humidis vlceribus medetur. Aeg.

πολύμω-  
νον.  
bosci sal-  
uia. falso  
ambrosia  
offic. &  
herb. cre-  
ditur

POLEMONIAM alij philetæriam. Cap padoces chiliodynamin appellât, ramis exilibus, vtrinq; pinnatis: foliis paulo quàm rutæ maioribus ac longioribus calaminthe aut sanguinariæ proximis, quibus summis velut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicante, radicula simili. nascitur in montosis & asperis. Aeg. Polemonij vis subtilis & exiccans: inde nonnulli contra coxendicis dolores, intestinorû tormina lienē induratum, radicem eius cum vino propinant.

πολύκνη-  
μον.

POLYCNEMON, frutex est furculosus, foliis origani: caule, vt pulegii, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Aeg. Cal. sic. 2. eoq; vulnera glutinat.

πολύγα-  
λα.

POLYGALA palmi altitudinem petit: foliis lenticulæ, gustu adstricto. Aegine. Poly-



galon calidi humidique temperamenti compos est, foliis mediocriter acerbis. potū lactis abundantiam facit.

POLYGONATVM nascitur in montibus, frutice cubito altiore: foliis lauribus, & leuiorib<sup>9</sup>, sapore mali cotonei, aut punici, cū quadā adstriptione. flores per singulos foliorū exortus promit cādidos, foliis numerosiores, incepta à radice supputatione, radicem habet albā, mollem, longā crebro geniculatā, densam, graucolentē, digitum crassitudine equantē, quē vulneribus efficaciter illinitur. quinetiā maculas in facie delet. Aeg. Variæ particeps est facultatis, astrictoria, aseris, amara, & cuiusdam gustu ingrata: quæ verbis nequeat exprimi, quapropter in multiplices vsus haud est accommodatū. Radicē ipsius nonnulli ad faciei labes, ptilos Græci dicunt, abstergendas illinunt.

POLYGONVM sylvestre Plin. describit pene arboris frutice, radice lignosa, stirpe ceteri rubicundo, ramis sparti binum palmorū, nigris, geniculorū, ternis quaternisq; articulis, sapor mali cotonei (Diuersum hoc genus est à duobus reliquis polygonis sanguinariis, sub voce numerandis.

POLYTRICHON, adiantum est.

Duo genera POLI. montanum, cui teu- thrio nomē est, & cuius est vsus. tenuis frutex est, cādidos, dodrātalī, semine refertus: capi-



tulo in cacumine quandam corymborū specie[m] præ se ferente, paruo, canis hominis simili, grauitè olente, nō sine quadam suauitate. Alterum fruticosius, non vsq; adeò valens odore, & viribus infirmius. Aeg. Polium minus, quo & in antidotis vtimur, cal. sic. 3. itaq; omnia viscera reſerat, vrinā mensesq; trahit. Viride adhuc, magna glutinat vulnera. aridum maleficis inspersum vlceribus proficit.

POPVLVS alba aquosa, tepida, terrestrique substantia, viribus absterforiis. Aeg.  
 λεύκη ἢ γειρος.  
 Tramble  
 Poplier  
 POPVLVS nigra cal. i. sic. modicè, & tenuis est substantia. folia cū aceto illita podagricos dolores sopiūt. Eius resina floribus calidior miscetur acopis & malagmatis. fructus cum aceto potus comitialibus auxiliatur.

PORRVM mali succi est & acris. Grauiā facit insomnia, teste Diosc. aluum mollit, vrinā ciet, extenuat, vim aliquā abstergendī habet, qua pectoris excreationes elicit. Semē eius prisanae incoctū nephriticis temperatur medicamentis. folia etiā nonnihil astringūt, ideoq; succus ipsorum sanguinem supprimit.

POTAMOGETON, folium betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat. pruriginibus vtile, & contra veterum vlcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus & aquosis enascatur, Aeg. Refrigerat & abstringit sanguinali herbæ cōsimiliter, iisdem vir-



tutibus præditum.

POTERIVM, lones neurada vocant, ποτήριον  
largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus tragacanthæ proximis: foliis parvis, rotundis: flore exiguo candidi coloris: semine nullius vsus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus, radices demittit binū ternūve cubitorum, nervosas, & firmas. quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. tusæ, præcisus nervis & vulneribus glutinandis illinuntur. decoctum quoque eius nervorum affectibus prodest. Aegineta, Vocant alij phrynion. Radices concisæ, nervos præfectos & vulnera glutinant. Decoctum ipsius epotum, nervorum affectionibus auxiliatur.

POTHOS Theophrasto duorum est generum: alterum hyacinthi flore, alterum sine colore, candidam, quo sepulchra coronabant, à quo & nomen, quasi desideratis esset dicatum. floret æstate, sed diuturnius est candidum.

PRUNI fructus ventrem subducit, recēs magis, aridus minus. Decocto ipsius faucium & gutturis inflammationes utiliter colluuntur. Gummi quod ex arbore destillat, incidit, extenuat: vesicæ calculos cū vino potum nonnulli frangere affirmāt, ex aceto puerorū

n iiij

πόθος

κοκκύμυλον



rum impetiginēs sanare. Syluestrium prunorum bacce euidenter astringunt, ventremque reprimūt. Nominatur hæc planta in Asia prunum. Domestica sunt quæ Damascena appellantur.

ψόρα.

PSORA Aëtio herba nuncupatur (forſan ab habitu ſcabo, aut quod ſcabiei medeatur) eius uſtæ fumo arborum erucas mori ſcriptum reliquit.

ψύλλιον.  
Herbe a  
pules

PSYLLION foliis coronopo nō diſſimilibus hirsutis, longioribus: ſarmentosa ſœni modo in totū herbula, ramis dodrantalibus. coma à medio caule exoritur, duobus tribusve conuolutis in cacumine capitulis: in his ſemine duro, nigro, pulicum ſimili, unde & nomē in aruiſ & incultis naſcitur. Aeg. Herba pulicariſ ſemen, frig. 2. ſiccādo humectandoque medium eſt.

πάρμι-  
κη.  
offic. &  
herb. py-  
rethrum  
ſylueſtre

PARMICA frutex eſt, furculos habens paruos, multos, & rotūdos, abrotano nō diſſimiles. & circa eos folia oleæ, longa, multa, & in cacumine capitulū, uti anthemidis, paruum, rotundum, quod ſuo acro odore ſternutamentum excitat: unde nomē accepit. flores ſternutamenta efficaciffimē mouēt. Naſcitur in montibus & petroſis. Aeg. Folia ſternutamenta proritant. Totus autem frutex viridis ſugillata, liuoreſq; alioſ diſſicit. Eſt enim herba cal. ſic. viridis quidem 2. arida 3.

βλέγιον.

PVLEGIUM herba vulgaris notitiæ.



Vocant aliqui blechona, quoniā dum floret poulicū  
gustatum à pecoribus, balatum concitat. Ae ou pou-  
gineta, Calefacit & extenuat vehemēter, vn- liot  
de si illinatur ruborem excitat, & crassos vi-  
scososque humores è thorace & pulmone e-  
molitur.

πίπυρος

PULMONARIA, quam aliqui pepanū  
vocant, buglossi folio cōspicitur, sed promif-  
fo magis, atq; læuiori, colore insuper dilutio-  
re, albicātibus maculis notato, instar pulmo-  
nis, inde nomen nascitur in humidis. Volunt  
aduersus morbos visceris sui nominis pecu-  
liari esse remedio, in cibo sumptā, vel potā.  
(Aliam eodem nomine, cum de consilagine  
mentio fieret, docuimus.)

ῥοιᾶς μῆ-  
λον.

Granade

MALVM punicum omne astringendi vi-  
res eximias habet, quibus refrigerat siccātq;  
verum dulce aliis minus: austerum magis re-  
frigerat, siccīusque est, & stomacho amicum.  
Acidum refrigerat quoque, & maiorē quan-  
dam incidendi virtutem representat. Verum  
acini succo magis adstringunt siccātque: ef-  
ficacius his adhuc malicorium, quod fidion  
Græci vocant. Huic virtute respondet mali-  
flos, qui cytinus appellatur. Aeg.

Q

πικρά

Q

VINQVE folium ramulos fert φυλλον  
furculaceos, tenues, dodrātales, in quinte  
quibus semen: folia mēthæ, quina feuille

n iiij



singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata: florem ex luteo pallescentem, auri æmulum. nascitur in riguis, & aquariis ductibus. subrubram habet radicem, oblongam, veratro nigro crassiorē. Aeg. Sic. 3. minimè acre, eoq; in multos vsus accommodatur.

deus

Chesne

QV ER CVS & folia & fructus siccante & tepida vi pollent: quamobrem vulnera recentia glutinant, inflammationibus incipientibus medentur. at quod sub glandis corio & circa fructus carnem membranę simile includitur, valentius astringit: eoq; ad fluxum muliebrem, aliósque fluidos morbos exhibetur. Aeg.

R

spovθiov  
Herbeau  
foullon  
off. saponaria.

R

ADICVLA seu struthiũ herbã vulgò nota, qua purgandis lanis vtuntur, qui eas eluunt. Gale. Radicis vsus est præcipuus. Acris est, cal. sic. 4. Abstergit, irritat: hinc est quod sternutationes cit similiter aliis, quorumcunq; cum acrimonia calidum temperamentum est.

ῥάφανος.  
Rauē re  
forũ, raphan.

RADIX, quæ græcis raphanus dicitur: sylvestris raphani, quam Romani armoriaciam vocant, folia satiuo similia, sed magis lapsanam imitantur. radix gracilis, tenera, subacris. Tam foliũ quàm radix in olera recipitur. sed hæc excalfacit, vrinam concitat, æstuosa est. Aegineta. Radicula cal. 3. sic. 2. Sylvestris efficacior est in ambobus. Semen



utriusque planta ipsa vehementius, itaq; su-  
gillata aliósq; liuores difficiliter.

**RADIX** Hippocrati nominatur quod-  
dam genus sati, sine flore, sine semine, tribus  
duntaxat foliis, sed proceris, & in terra stratis,  
duorum digitorum magnitudine, simili-  
bus anchusæ, radice purgandi viribus, sed exi-  
liter. (Eadem mihi Dioscoridis Onosma vi-  
detur.

**RANUNCULI** complura sunt genera. vis tamen omnibus vna, acris, & vehemēter  
exulcerans. Nam vnum coriandri foliis con-  
stat, latioribus, subalbidis, pinguibus: flore  
luteo, interdum purpureo: caule gracili, cu-  
bitū alto: radice alba, exigua, amarāq; mul-  
tis capillamentis, hellebori modo fibrata, na-  
scitur in limitibus humidis. Alterum la-  
nuginosius, longiori caule, pluribus foliorū  
incisuris, plerunque in Sardinia proueniens,  
quā acerrimum, quod sylvestre apium ap-  
pellāt. Tertium minimum, odore graui, flo-  
re aureo. Quartum huic simile, flore lacteo.  
Aegineta, Omnia ranunculi genera excellē-  
ter sunt calida, sicca, acria, vrentia, adeò vt vl-  
cus cū dolore excitent: quibus si modicè vta-  
rīs, cutis vitia tantum exterūt. Radix autem  
arida sternutamentis ciendis est medicamen-  
tum. (De altero ranūculi genere multa leges  
in Sardonīæ mentione.)

**RAPĪ** radix & semen flatulenta, & semi-

ῥίζα.

βατρά-  
χιον.

Apiū ru-  
sticū, &  
Apiū ri-  
sus herb.

ρεγγυλίδ  
Rabe.



ni creando sunt, veneremq; excitant. Aeg.

ρογγυλὶς  
ἀργία.

Reponce  
of. rapha  
nus sylue  
stris.

Syluestre R A P V M in aruis nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramosum, laeue, in cacumine folia fert leuia, digitali latitudine, aut maiora: & fructū in siliquis calyculatis. cūmq; eorum inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet, in qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totōq; corpore vtimur, præsertim quæ ex lupini, aut erui tritici, aut lolii farina fieri solent.

ἐντὶν.

Liquida R E S I N A è pinu & picea, & Gallia & Hetruria conuehi solet. atq; olim à Colophone petebatur: hinc Colophonix sibi cognomētum vendicauit. A Gallia quoq; subalpina quam vernaculo nomine laricem appellant incolæ, ea in linctū, & per se magnopere prodest tusci veteri. Colore inter se distant. siquidem alia cādida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinā, quæ ad eadem pollet. Quæ verò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, trās-lucens, non retorrída, neque diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E picea & abiete resinæ ceteras antecedunt: odo-



rate enim sunt, atq; thus odore imitatur. Prestantiores à Pityusa insula deferuntur, quę secundum Hispaniam sita est. Sed quę è picca, nucibus pineis & cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quorū & illę sumi solent. Lentiscina terebinthinę respondet. Virtur resina omnis liquida in vase quadruplę capacitatis ad humorem qui infunditur. Itaque resinę congius in duobus aquę pluvię coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrida reddatur, ac digitis cedat. cæterum vbi refrigit, in fictile non picatum, quod aconitū vocant, id est, nō illitū, receditur. Fict etiā eximii cādoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quò sæculēta sordes excernatur. Vritur quoq; sine aqua, primū lento igne: & vbi coire cœperunt, maior carbonū strues supponitur, & triduo citra intermissione discoquantur, vsq; dum antedictas naturę suę notas exuerint, mox, vt dictū est, reponuntur. Aridas vnus diei spatio decoxisse satis est. Aeg. Resinę omnes calefaciūt & desiccant, verū terebinthina principatum obtinet, discutientis naturę, emolliētis, tenuis, & absterforiæ, eaque scabiem corrigit. & larix huiusmodi est. Quę verò è teda destillauerit, atque hac magis adhuc pinea, acrior est, non tamen aut discutit magis, aut attrahit.



medium inter ipsas locum tenet, & quæ de piicea & quæ de abiete raditur.

ῥάμνος.  
Burgaspi  
na ou ne  
prum.

RHAMNVS fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ modum, foliis paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. tertium nigrioribus latioribusque foliis constat, & quadatenus rubentibus. cuius rami quinam cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusque; rigentibus aculeis. Fructum edit latum, cādidum, tenuem, follicularii specie, verticillo similem. Aegineta, Siccat 2. frig. primo, Quare herpetibus & erysipelatis non admodum calidis medetur. sed teneris eius foliis utendum est.

ῥά ροντι-  
κόν.  
Reubar-  
be. offic.  
rhaponti  
cum.

RHAPHANVM in Radice habes.

RHA, aliqui rheum, Latini rhaponticū vocant, prouenit in iis quæ supra Bosporū sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, centaurio magno similis, sed minor & ruffior, fungosa, aliquantum læuis, sine odore. Optimum habetur quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, manducatūque colorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Aegin. Compositum est ex terre stri frigida & tenui substantia, aëreāque calida & leniter acri: eamque ob causam conuulsis, ruptis, recta ceruice spirantibus opitulantur. Quod



discutiendi vim habet, liuores emēdat: quod astrictoriam, cruētas excreationes, cœliacos, & intestinorum tormina sanat: vtraque verò facultate iocinorosos iuuat.

Gignitur RHODIA radix in Macedonia, costo similis, leuior, inæquabilis, quæ cōtrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momento imponatur. Aegineta. Calēfacit secundo, tenui & discutiente vi prædita.

ῥοδία ρι-  
φα.  
Rosaceū  
lignum.

RHVS, quæ obsoniis aspergitur, ab aliquibus erythros appellata, semen est coriarii fruticis: sic vocati, quoniam coriorum infectores eo vtantur ad inspissandas pelles. arbuscula in petris nascens, binūm cubitorum altitudine, foliis oblongis, subrubentibus, in ambitu serratis, acino vuarum gracilium dēso, magnitudine terebinthi, quadam tenuis lato. Cuius corticosa tunica perquàm utilis est. Aegineta, Rhu coriariæ à medicis dictæ fructus præcipuè, & succus, magno in vſu sunt: astringit enim, & sic. 3. frig. 2. (E mendatimus ῥυπτικοῦ, vt iuxta Galenūm ῥυκ-  
δικοῦ legatur.

ῥῥς.  
rur. viur-  
ne.

RHVS herba syluestris Plinio, colicis breuibus, foliis myrti, tineas & venena pellit.

CICUT, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine. arbor prouenit parua.

κρότων



Herb. ca- ficus altitudine : folio, platani, sed maiore,  
 taputia læuiore, & nigriore : ramis, caudicibus  
 maior. of que cauis, in arundinis morem : semine in  
 fi. et vulg. uis asperis, quod corticibus exutum, ricinū  
 palma animal repræsentat: ex quo oleum, nomine  
 Christi. cicinum, exprimitur, cibus fœdum, lucernis  
 emplastrisque vtile. Aegineta. Ricini fructus  
 quæadmodum purgat, abstergit, digerit: sic  
 etiam folium, sed imbecillius.

R O D O R A Gallis appellata herba, vt in-  
 quit Plinius, iuxta viduas populos prouenit,  
 caule instar ficulneæ virgæ articulado, foliis  
 vrticæ in medio exalbidis, quæ processu tem-  
 poris tota rubent, flore argenteo. Præcipua  
 contra tumores feruorésque & collectiones  
 per se, vel cum axungia veteri tusa.

ῥόδον.  
 Rosc.

R O S A refrigerat & astringit, sed sicca  
 multò magis. Succus recentibus foliis ex-  
 primitur, defectis forfice vnguibus (sic appella-  
 tur candidæ foliorum partes) reliquum in pi-  
 la premi & teri debet in vmbra donec coga-  
 tur & ita ad oculorum circumlitiones recon-  
 di. Siccantur etiamnum folia rosarum, conti-  
 nuò versata ne muceant, nè sitis in iis infi-  
 deat. Aegineta, Rosc mixta constant substan-  
 tia, aquosa scilicet, calida, astringenti & ama-  
 ra: flos autem ipsarum magis adhuc astringit,  
 eoque desiccatur.

λιβανώ-  
 τισ.

Duo ROSMARINI genera, vnum fœ-  
 cundum frugiferumque, cuius semē cachrys



vocatur. folia fœniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè olentia. caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concavum alis. in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum, resinaceum, quod in mādendo linguam exurit. radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum vti sphondylion, odoratum, minimè exurens, radice foris nigra, intus si frangatur alba. Verū id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neq; caulem, neq; florem, neq; semen promit. nascitur in saxosis & asperis. Rosmarinum cū erica nasci, foliis lactucæ sylvestris amaræ asperioribus, candidioribûsque, radice brevi. Theophrastus author est. potūque id ipsum alterutra parte purgare.

ROSMARINVM, quo coronarii vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, dēsa, longa, exilia, subter incana, superne virentia, graui odore. Aegineta, Libanotis vna sterilis est, duæ fructum ferentes. Vires illis exurgendi, incidendi, discutiendi, & emolliendi. Succus earum oculis ex humorum crassitie hebetibus salutariter ex melle imponitur. Coronariæ verò libanotidis decoctum, regio morbo laborantibus re- & bibitur.

Incēsaria  
ou Ros-  
marin.

λιβανω-  
τίς στεφα-  
νωματι-  
κή



ερυθρόδα  
 208.  
 off. rubia  
 tinctorū.  
 vulg. ga-  
 ranse.

**ERYTHRODANVM** radix rubra est, qua tinguntur lanæ. vna sponte prouenit, altera feritur, vt in Thebana Gallia, & Rauenna Italia, in Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur. hanc non sine quæstu ferunt. nanque maximū ex ea sentiunt prouentum. asperi caules & quadranguli, longi, aparinae non dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores: foliis per intervalla certa circum articulos stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia viride, mox rubrum, postea cum ematurus nigrū: radix tenuis, longa, rubra. Aeg. Radix acerba amarāque est. Lienem iecur, & renes ita purgat, vt cruenta quoq; per vrinam & menses euocet. Cutis vitia rancida abstergit.

βατος

**RVBVS**, notitiæ vulgaris. Aegi. Rubi runce, ca fruticosum abundè astringit & siccatur, qua de therine, causa & vulnera cōmittit, & defluxiones siou franc- stit. Radix autem præter astringentē, non parbofier. rū etiam subtilis est, vnde renum calculos cōfringere est idonea. Fructus si maturus est, magis calefacit, simulque mediocriter astringit, ac ideo cibo idoneus est: immaturus aut, & acerbus est, & validè siccatur, præsertim aridus. Eadem etiam flos efficit. (Chamæbatū rubi genus humile suprà diximus.)

βατος  
 ἰδαῖος.

**IDAËVS** **RVBVS** appellatus est, quoniā passim in Ida proueniat. Est autē longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquā  
 & sine



& sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat quæ supradictus. Aeg. non recensuit.

RUBUS canis frutex est arboris instar, κυνόσβητος.  
engléties rubo longè maior. folia fert multò latiora myrto, firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Aegineta, Rubi canini fructus non instrenuè astringit: folia id præstant medicriter. At quod in fructu lanæ speciem præ se fert, ceu arteriæ inimicum caueri debet.

RVMEEX, vide Lapathum.

Syluestris MYRTVS, aliquibus oxy-myrsine, aut myrtacantha, Latinis ruscum appellatur. folium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum. baccae per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo. cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modò lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis simili, acerba, & subamara. Folia & baccae in vino potæ vrinam cient, menses pellunt, vesicæ calculos frangunt, stillicidio vrinæ medentur, dolores capitis sanant, & regiâ morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radice in vino potum, eisdem præbet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed vrinâ mouent. (Galenus & Aegineta nullam fecere mentionem.

ὄξυμυρσί  
vii.  
Hou ou  
houfse.



πῦλλον.  
Ruc.

RUTA mōtana syluestrisq; satiua & hor-  
tensi acrior est, & in cibis dāmnata. satiua ve-  
rò quæ sub ficu arbore enascitur, magis in ci-  
bos admittitur.

πῦλλον  
ἄγριον.  
offi. har-  
mela &  
syluestris  
ruta.

vocāt etiamnum syluestre rutam, quod  
in Cappadocia & Galatia Asiæ finitima mo-  
ly dicitur. Frutex est qui ab vna radice mul-  
tos emittit cauliculos: foliis multò quàm al-  
terius rutæ longioribus, tenerioribúsq; odo-  
re graui: flore candido: capitulis in cacumi-  
ne paulo maioribus quàm satiux rutæ, quæ  
tribus maximè partibus constat: in quibus  
triangulum semen, subrufum, gustu amarū  
recluditur, cuius est vsus. semen autumno ma-  
turefcit. quod cum melle, vino, croco & fœ-  
niculi succo, ac gallinaceo felle teritur cōtra  
retusam oculorum aciem. Sunt qui eam har-  
malam vocent, Syri besafan. qui Cappado-  
ciam incolunt moly, quoniā quandam cum  
moly seruet similitudinem: radice nigra, flo-  
re cā dido. In collibus & læto solo prouenit.  
Aeg. Ruta syluestris calefacit, siccāt quarto.  
Satiua vsq; ad tertium. Vis eius est crassos len-  
tósque humores incidere, & dissipare, vrinā  
mouere, attenuare, & flatus discutere, vnde &  
venerem coërcet. Alio loco in moly, quæ  
etiam ruta syluestris est, substantia renuem  
esse prodit, calefacit 3. & reliqua cum supe-  
rioribus eadem.



## S

**ABINA** duorum generum est. *βραβη.*

**S** Vna foliis cupresso similis, spinis *lauiniere*  
horridior, grauitus olens, acris &  
ferues. arbor est coactæ breuitatis, quæ sese  
magis in latitudinem fundit. huius foliis nõ-  
nulli pro suffitu vtuntur. Altera tamarici fo-  
lio similis est. Aeg. Cal. sic. 3. tenuissimâque  
est, extenuat, & digerit pota, tum in putredi-  
nes cupresso similiter efficax est.

**SACRA** herba, quæ & peristereon nomi *ισοβολε*  
natur, ramulos emittit cubitales, aut maius- *vn.*  
culos, angulosos, in quibus ex interuallis fo-  
lia quercus, sed minora angustioraque, eisdẽ  
diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæ-  
sio. radix longa, tenuis. flores purpurei, gra-  
ciles. Galen. & Aeg. tacitâ præterierunt. Dio-  
scorides serpentibus aduersari scribit: mor-  
bo regio cum aliis quibusdã succurrere. Vete-  
res tumores & inflammationes illitam leni-  
re, sordida purgare vlcera, tonsillarum cru-  
stas cum vino erumpere: oris depascentia vl-  
cera compescere.

**SAGAPENIVM** ferulaceæ herbæ succus *σαγαπην*  
est, quæ in Media nascitur. Optimũ est trãs- *von.*  
cès, fuluo forinsecus colore, & intus albo, ne-  
scio quid inter laser & galbanũ redolēs, gustu  
acri. Aeg. Liquor est calidus & tenuis, cui etiã  
absterforia quedã vis inest, qua & oculorum  
cicatricibus & suffusionibus prodest.

*offi. sera-  
pinum.*



ἰτιά.  
Saulx.

**SALIX** vulgò nota est. Aegineta. Salicis & folia & flos facultate cōstant quæ citra ro-  
sionem siccet, tum quæ nonnihil etiam astrin-  
gat. Cortex autē paulo siccior est, cuius peru-  
sti cinis ex iis habetur quæ vehementer exic-  
cent, quippe clauos & myrmecias cum ace-  
to exerit.

ἐλελίσφα  
κος.  
Saulge.

**SALVIA** siue elelisphacon, frutex est ra-  
mosus, longus, virgas, habens quadrāgulas,  
& canas: folia mali cotonei effigie, sed lon-  
giora, asperiora, crassiora, & quæ sensim at-  
tritarū quasi vestium scabritiem referant, hir-  
suta, subalbida, perquā iucundo odore, sed  
gravi. semen summis in caulibus sylvestri or-  
mino simile gerit. In asperis nascitur. Aegin.  
Euidenter calfacit, & leuiter astringit.

ἄκτν.  
Sus, ou  
suin.

**SAMBUCI** duo genera. Vnum in arbo-  
rem assurgit, surculos spargēs arundinaceos,  
teretes, cauos, candicantes, proceros. folia iu-  
glandis, terna quaternave, ex interuallis cir-  
ca ramos exeunt, graui odore, minutim in  
ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus  
cauliculisque circinnatæ umbellæ, quæ flo-  
rem candidum pariūt, mox acinum terebin-  
tho similem, in nigredine suppurpureum, ra-  
cemosum, succo madentem, vinosumque.

Alterū genus chamæactæ vocatur, Roma-  
nis ebulum, longè humilior est, magisq; her-  
baceo generi assignandum, caule quadran-  
gulo, geniculato: foliis amygdalæ, ex inter-



uallo longioribus, geniculatim expāsis, pin-  
natīsq; graueolētibus, in ambitu ferratis, mu-  
scario sambuci: flore & acino eiusdem. radi-  
ce nititur longa, crassitudine digitali. Aegi-  
neta: Sambucus pariter & ebulus deficcant,  
modicè digerunt & conglutinant. Potu autē  
esūve per aluum aquam educunt.

SAMPSEVCVM in Cypro & Cyziceno σαμψυ-  
laudatissimū. secundum sibi locum vendica χος.  
uit Aegyptum. Amaracū gens Sicula & Cy- Mario-  
zicena appellat. Herba est ramosa, per terrā laine.  
repens, foliis eius calaminthæ quæ tenui fo-  
lio constat, leptophyllos appellatur, hirsutis  
& rotūdis. suauissimum odorem spirat: ideo  
coronis inseritur. Aeg. Cal. sic. 3. Est etiam te-  
nuis naturæ & discussoriæ.

SANGVINARIA, vel polygonū mas πολύγωνος.  
ramos habet teneros & molles, frequentibus vos.  
geniculis cinctos, qui per terram, vt gramē, offi. corri-  
repunt: folia rute, sed molliora longioraque: giola, &  
semine sub omnibus foliis turgescere: vnde centino-  
marem appellari volunt. flos ei cādīdus, aut dia.  
puniceus. Sanguinaria foemina fruticat vno  
caule arundini teneræ simili, dēsis geniculis,  
& in se tubarū modo fārctis. articulos in or-  
bē cingunt. apices foliolis piceæ similes. radi-  
cis nullus vsus. nascitur in riguis. Aeg. Habet  
sanē vim quandā astringendi, sed humiditas  
in secūdo ordine frigida in ea præpollet. Sto-  
machi feruori frigida inspergitur vtiliter, sa-



cris ignibus inflammationibúsq; calidis illini-  
tur, ac talis quú sit, fluxiones repellit, atq; hac  
ratione ficcatoria esse putatur. Fœmina autē  
mas vehemētior est. (De tertio quodam eius  
genere in polygono syluestri iam diximus)

σάντα-  
λον.

SANTALVM Græcis recentioribus li-  
gnum est, quod India mittit. Luteum præfer-  
tur, si pingui quodam scatet. Secundas partes  
obtinet rubrum, & frigidius aliquanto cæte-  
ris existimatur. Tertio loco reponitur albū.  
Cal. 3. sic. 2. Excalfactis auxilio sunt, imbecil-  
litatē stomachi leuant, itémq; cardiacos effe-  
ctus, quos irrepens bilis excitauerit. Ex albo  
oui liquore fronti imposita defluxionum im-  
petus quæ ad oculos decumbunt, cohibent.  
Trita ex stillatitio rosarum liquore, & illita  
temporibus adiecto caphuræ momento, ar-  
dētes capitis cruciatus mitigāt. Incandescēti-  
bus articulorū inflammationibus, podagrisq;  
ex succo solani, aut sedi, vel portulacæ, lenti-  
culæve palustris illinūtur, repelluntq; humo-  
res, qui eò loci se conferunt, præcipuē rubrū.  
(Nunc nullæ non ferè medicorū potiones vt  
gratiam odore suo à sumentibus incant, iis  
imbuuntur santalis.)

σαρκο-  
κόλλα.

SARCOCOLLA lachryma est arboris  
in Perside nascentis, pollini thuris similis, ru-  
fa, gustu amara. Vulnera glutinat, oculorum  
fluxiones inhibet. emplastris inseritur. A-  
dulteratur admisto gummi. Aegineta, Op-



plet, citra rofionem fccat, ideoque vulnera glutinat.

**SARDONIA** vel sardoa herba pro altero ranūculi genere intelligitur, copiofiffimū in Sardinia, guftus acerrimi, priuatim apium ruficum cognomināt. Sunt qui apiaftro, id eft, fylueftri apio fimilem faciant. Meminit Dioscorides libro fexto. hac vefcentibus mētem adimi, & quadam neruorum diftētionē dehifcere in rictu ora cogi, ita vt ridentium imaginem præbeant. Inde Homerus & pofteri rifum nullo falubri fenfu dignum, fardonium nominant. Strabo ex hac herba toxici genus Hispanos confeciffē prodidit, hauftu cuius vrgente vi maiore citra dolorem ipfi fibi mortem confeifcebant. Nafcitur fecus fontes, nullum tamen virus peftilens aquis impertitur, Paufanias apud Sardos cam gigni fcripfit.

**SATYRIUM** aliqui trifolium vocant, quoniā tria fert folia, ad terrā infracta, rumici aut lilio fimilia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalē, nudum: florē lilii effigie, cādidū: radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluā, intus, vt ouū, candidam, guftanti dulcē, & ori non ingratam. Eft & alterū fatyriū erythroniū fiue erythraicon, id eft, rubrū femine linī, maiore, duro, læui, fplendente, quod fertur, nō fecus atq; fcincus, libidinem excitare. cortice radicis gracili, rufo, intus

σατυριον  
tefticul<sup>o</sup>  
facerdo-  
tis.

ερυθρον  
vior;



autē album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. in mōtosis & apricis enascitur. Aegincta. Satyrion humidum est & calidū, item flatuosum, vnde veneris appetentiam facit. Nonnulli opisthotonis cum vino austero potum salutare esse tradunt. Galenus in comētario de theriaca, trifolium ait hyacintho simile, quum aëre inturgescens, semen sylvestri cnico æquale habet: decocti ipsius ius si perfusum, phalāgii aut viperæ morsus sanare: sano idem potui datum, similem animalium horum ictibus affectum conciliare.

σατύριον  
βασιλικόν.

SATYRION basilicum Græcis nominatur, foliis nigra plumbagine maculosis, reliqua superficie cynosorchi similis. radix subest lutea, ac instar manus effigie ramosa. Cutim erugat, ad neruorū dolores, & contra noxia medicamenta datur. Semen ex vino sumptum nouem diebus comitiales sanat. In eundem effectum vinū diluitur herbæ decocto. Scobs radice propinatur in vino ad arcendā quartanam, quam & vomitione curat, paulo ante accessionem pota. Fertur & amuletum esse radix gestata. (Herbam quoque illam satyrion Indam appellauerim, Theophrasto allatam ex India: incredibili neque fanda ad libidinis motus potestate vel cōtactu: nō tamen speciē eius aut nomen aliud reddidit Theophrastus.) Habent hodie & Syri herbam simili effectū, bucheidénq; nominant,



& Indicum satyrion, radice candida & dura, commendatiore quo crassior, rugosior & al-  
bior fuerit, podagris utili.

SATYRIEA triuialis notitiæ est. gigni *βύμβρη*  
tur in asperis locis, & tenui solo, thymo fimi *Saricte*  
lis, minor tamen & tenerior. defert spicâ flo-  
rum plenam, coloris herbacei. Eadem potest  
quæ thymum, si modo cõsimili sumptitetur.  
Aptus sanis vsus. Est etiamnum quædam sati-  
ua, syluestri prorsus minor, quæ propter mi-  
torem acrimoniam, commodius in cibos re-  
cepta est. Aeg. Thymbra agrestis quidem ea-  
dem quæ thymus præstat: hortensis autem in  
omnibus quidem imbecillior, sed ad cibum  
laudatior.

SAXIPHRAGA seu saxiphrages urinã  
mouet, & calculos conterit. Aeg.

SCAMMONIA, ramos ab vna radice e-  
mittit trium cubitorum, multos, pingues, & *σκαμμο-*  
qui non nihil crassitudinis præ se ferât: foliis *νία.*  
helxing, aut hederaceis, mollioribus tamen, *Diagre-*  
hirsutis, & triangulis: flore cãdido, rotundo, *don me-*  
in calathi modum cauo, graueolente: radice *dici nũc*  
prælonga, crassitudine cubitali, candida, gra- *appellat*  
ui odore, succo grauida. Legitur ad hunc mo-  
dum succus, Capite exempto, radix in testu-  
dinis speciem cultro excuatur, quo fit vt in  
cauum confluat succus, qui conchis demum  
excipitur. Alij scrobes in terra concamerato  
fossu fodiunt, in quos, subiectis iuglandium



foliis, profundunt succum, siccaturumque extrahunt. Laudatur autem scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportatur. Nec attendere solum par est, si linguæ tactu albescat ( hoc enim euenit adulterato, quod admisto fit tithymali lacte ) sed longe magis antea narratis. item si non vehementer linguam exurat, id quod misti tithymali argumentum est. natione autem Syriacum & Iudaicum deterrima habentur, grauias, densas, erui farina & tithymalo vitiatas. Aegin. Scammonia calfacit, digerit, & biliosa extergit, magisq; eius liquor qui iam & phymata dissipat, foetus appositus corrumpit, lepras extergit, in diuturno capitis dolore cum oxyrhodino vtiliter respergitur. Radix autem tum ipsa, tum decoctum eius potum, purgat. Cum aceto & farina hordeacea decocta, coxendicum doloribus illinitur.

σκανδιξ.

SCANDIX sylvestre olus est, amarum, subacre. quod crudum coctumve manditur. stomacho & ventri vtile. Aeg. Cal. sic. 2. Vrinam

σκυλλα.

pellit, viscera obstructione liberat.

Scipoull.

SCYLLA incidit, calefacit, & desiccatur, in secundo ordine. prestat autem eam assam aut elixam sumere.

Squilla

Charpen

taire

SCOPA regia Plinio viola est violentum spirans odorem, sed hoc foliis, non floribus.



(fortassis eadem fuerit viola flammea, cuius ramuli & folia odorata describuntur, flos inodorus. Vere statim post purpuream emicat, sylvestris dūtaxat: in ordum tepidioribus locis, ubi cælum arridet clementius, nondū exacta hyme, colore cōmendabili, odore nullo semine proueniens coronis. Plurimum durat tempus. Græcis phlox & phlogion appellatur.) Diosc. bunion suum Latinis scopam regiam scribit appellari. Plinio similiter appellatur sideritis, quæ sit latissimo folio, vulneribus præcipua, quæ etiam præcisos nervos glutinare possit.

SCORDIVM in mōtibus & palustribus nascitur, foliis trifaginis, maioribus, nō sic in ambitu diuisis. aliquantū allia redolentibus, gustu amaris & astringentibus: quadrangulis caulibus: subrubro flore. inter priora effica. Ponticum natione, Creticūmq; Aeg. Variis pollet facultatibus, ut quod amarū, acerbū, & acre sit. purgat igitur simul & calfacit viscera. urinas & menstrua concitat, refrigerata omnia excalfacit, vulnera glutinat, repurgatque: aridum illitum cicatricem inducit.

SCORDION alterius generis mēthastro simile à Plinio traditur.

SCORPIOIDES herbula est, quæ semen habet ad similitudinem caudæ scorpionis, foliis paucis. illitum valet aduersus animal

σκορδιον  
Herb.

chamæ-  
dryspalu-  
stris rur.

chamara

Non est

hæc alliū

sylvestre

seu allia-

ria

σκορδιον

ἑπείρον.

σκορπιον

δένδρον.



Non est sui nominis. (Plinius herbam scorpion vocat  
calédula cavit, quanquam & aliis idem nomen con-  
nec fol tribuat.)  
sequia

SCORPIVS siue ~~nopa~~ nullum folium ha-  
bet Plinio, sed in cacumine aculeum, sub cu-  
ius extremo in carne protuberante, florem  
profert per initia cādidum, postea leniter ac-  
cedentem ad purpuram. Post æquinoctium  
autumni floret, radice singulari eadēq; bre-  
ui cohæret. Spina est in totum, asparagi cau-  
le. Nomen ab aculeo suo traxit. (Eadem ar-  
bor cum Dioscoridis trago herba. Describit  
& alium scorpion Plinius cyclamini folio,  
aconiti generibus adnumerandum.)

SEBASTI, vide Myxa.

σκοποδο-  
πρασον.

SCORODOPRASVM magnitudine  
porrum æquat, qualitatum porri & allij par-  
ticeps. vnde promiscuas sibi vires ex utroque  
vendicavit, effectus allij & porri præbens, in-  
efficacius tamen. coctum, porri modò, dul-  
cescit, & in olerum vicem transit. Aeg. Porri  
& allii mixtas habet vires, & gustatum.

Segle

SECALE Plinio farraginis genus, occari  
tantum desiderat. Taurini sub alpibus asiam  
vocant. deterrimum & tantum ad arcendam  
famam vtile, fœcunda, sed gracili stipula, ni-  
gritia triste, pondere præcipuum. Admiscent  
huic far vt mitiget amaritudinem eius, & ta-  
men sic quoque ingratissimum vëtri est. Na-  
scitur qualicunq; solo cum cetero grano,



ipsumque pro latamine est.

HEDYSARON, vnguentarij pelecini, *πλεκί*  
id est, securidacam vocant, fruticosa est, foliis *vos.*  
ciceris. semen rufum in filiquis fert, cornicu- Feue de  
lorum modò aduncis, quod ancipitem secu loup, her  
rim æmulatur, vnde nomen accepit. amarum bue ou  
gustu. Nasitur in segetibus & hordeis. Aeg. graue  
Amarum est, leuiterq; astringit, vnde potum ou cor-  
stomacho gratū redditur, viscera obstructa nuette  
repurgat.

SELAGO similis herbæ Sabinæ est. Hâc  
contra omnem perniciem habendam prodi-  
dere Druidę Gallorum, & contra omnia oeu-  
lorum vitia fumum eius prodesse.

SEMPERVIVVM magnū ideo nomi- *αἰσωνο*  
natur, quoniam perpetuò folia vireant. cuius *Iôbarde*  
caules cubiti altitudinem implent, interdum *ou Iou-*  
excedunt, pingues, crassitudine pollicari, vi- *barde*  
rentes, characiæ tithymali modo infecti: fo-  
lia pingua, carnosâ, lōgitudine pollicari, in  
cacumine linguæ similia, alia in terram con-  
uexa, alia in capite stantia inuicem, ita vt am-  
bitu effigiē imitentur oculi. nascitur in mon-  
tibus, & testaceis. supra domicilia etiam seri-  
tur. Semperuium paruum in petris, parie- *Vermicu*  
tinis, & maceriis, necnō scrobibus opacis na- *laris &*  
scitur, caulibus ab vna radice multis, tenui- *cauda*  
bus, crebrò foliatis: exilibus foliis, rotundis, *muris*  
pinguibus, mucronatis: caule à medio emi-  
cante, palmum alto, ymbellam herbidósque



Menu  
pourpier  
sauuage

flores & tenues gerente. Folia eisdem cū priore viribus prædita sunt. Tertiū videtur semperuii genus, quam aliqui andrachnen agriam, aut thelephion, vocauerunt, Romani illecebram, pusillis, crassioribúsque; foliis, hirsutis, portulacæ proximis. nascitur in saxis. Vis ei excafactoria, acris, exulcerans. illita cum axungia strumas discutit. Aeg. Aizoon vtrunque frig. 3. siccatur autem astringitque; mediocriter. Valet erysipelatis, & ad herpetas, inflammationesque ex fluxione concitatas conuenit.

ἡλίγιστον.  
Senecon

SENECIO cauliculo est cubitali, subrubro, foliis continuis, diuisura crucæ, sed minoribus multo: luteis floribus, qui celeriter dissecti vanescunt in pappos. nomē verò sibi vendicauit, quoniam flores capillorum ritu vere canescant, radice supernacua. nascitur maxime in maceriis, & circum oppida. Aegine. Mixtas habet vires, refrigerat, & modicè discutit.

ῥίσις.  
Cichorec

SERICA in Ziziphis leguntur. SERIS duūm generum est. altera syluestris, quæ picris & cichorion vocatur. altera sativa, latioribus foliis constat. stomacho quàm hortensis vtilior, quæ iterum in duas species digeritur. vna folio latiore prodit, lactucarū simillima. altera angustiore est folio, & gustu amara. Aegineta, Subamarum olus est, admodum refrigerans humectansque, cum



astriptione nonnulla.

SERPILLVM duorū generum est. Hor- ἑρπυλλον  
tense odore sampsuchum imitatur, atq; in co Serpillet  
ronas addi solet, cui à serpendo nomen indi-  
tum est: quoniam si qua eius particula terrā  
attingat, inibi radices demitter. folia & ramu-  
los organi habet, sed candidiores. in mace-  
riis multo procerius assurgit. Sylvestre, zy-  
gis appellatum, non serpit, sed in altitudi-  
nem increfcit, ramulos edens tenues, surcu-  
losos, foliis refertos longioribus quā rutæ,  
& durioribus, angustis. flores iucundè olēt,  
gustāti acres. radice nullus vsus. Nascitur in  
petris, satiuo efficacius, atque magis ex calfa-  
ciens, & ad medendi vsū aptius. Aeg. Serpil-  
lum calefacit, vt & vrinam & menstrua com-  
moueat.

SESAMA stomacho inutilis cibus. Aeg. σησαμον  
Sesamū non parum lentoris, pinguisq; obti- offic. sifa  
net: idcirco opplere, mollire, & mediocriter mum  
calefacere idoneum est.

SESAMOIDES magnū, in Anticyra el σησαμον  
leborum vocant, quoniam albo veratro in ειδὲς μέ-  
purgationibus misceatur. simile est senecio- γα.  
ni aut rutæ: longo folio: flore candido: radi-  
ce gracili, ignaua: semen gustu amaro, cæte-  
ra sesamæ simile. Ventrem detrahit. datur  
tritum ad bilis pituitæque deiectiones, quan-  
tum tribus digitis capitur, addito verati al-  
bi sesquiobolo, ex aqua mulsa.



σπασμο- Sefamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes:  
 αδις μι- folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cau-  
 κρόν. liculorum cacumine capitula, florū penè pur-  
 pureorum, medio eorū albo: semen sesamæ,  
 fuluum, amarū: radix tenuis. Detrahit bilem  
 pituitasque, semen ex aqua malsa potum di-  
 midio acetabulo. illitum ex aqua, tumores  
 ac tubercula discutit. nascitur in asperis. Aeg.  
 Sefamoides albi (aut potius parui, mendum  
 enim interpretor λευκοῦ pro λεπτοῦ.) semen  
 calefacit, detergit, & rumpit. Maius autem ve-  
 ratri vires sequitur. Galen.

τορδύ-  
 λιον.

TORDYLIVM, quod aliqui Creticum  
 seseli vocant, iuxta Ciliciam in Amano mon-  
 te nascitur, herbula furculosa, semine duplici  
 rotundo, scutulorum effigie, odorato, suba-  
 cri. Aegineta, Gordylon alii seseli appellant,  
 calidum est, urinae & mensibus educendis ha-  
 bile. Radix ipsius cum melle lincta, quæ in  
 thorace hærent, educit.

σιελι-  
 offic. &  
 herb. fa-  
 xifraga  
 maior

SESELI Massiliense folia fœniculi habet,  
 crassiora: caulem vegetiorem: umbellā an-  
 thi, in qua semen oblōgum, angulosum, de-  
 gustanti statim acre. radix longa est, iucundi  
 odoris. Aethiopicum seseli, folia habet hede-  
 ræ, minora, & ad periclymeni modum ob-  
 longa. frutex nigricat: palmitibus in bina cu-  
 bita extensis: ramis sesquipedalibus: capitu-  
 lo anethi: semine in tritici morem denso, ni-  
 gro, amaro, Massiliensī odoratiore, & acio-  
 re,



re, multum suauis. Peloponnesense folia ha πυλοπονν  
 bet cicuta. latiora, & crassiora: caulem supra νκσιακόν  
 Massiliensis magnitudinē, ferulaceum, & la-  
 tum: in cacumine umbellam, in qua semen la-  
 tius, odoratum, & carnosum pendet. Eisdem  
 viribus præditum est. nascitur in asperis, ri-  
 guis & collibus. inuenitur etiamnum in insu-  
 lis. Aeg. Sesele radix magisq; semen insigni-  
 ter calefacit, tenuisq; substantiæ est, vrinam  
 quoq; ciet, comitialibus & recta ceruice spi-  
 rantibus accommodatum.

SEVTLOMALACHON recens Græc. συντλο-  
 cia fecit olus, quasi dicas maluaceam be- μάλαχον  
 tam (fortè quod figura & denticulato semi-  
 nis habitu betam, & mollicitia malua mentu-  
 retur.)

SYCOMORVM aliqui etiam syca συνκομω-  
 minum, id est, morum vocant cuius fructus ρος.  
 sycorum etiam propter inefficacem gu-  
 stum appellatur. arbor est magna, fico simi-  
 lis, frondosa, multo lacte abundans. foliis  
 mori. pomum ter aut quater anno fert: non  
 ramis, vt ficus, sed caudice ipso, caprifico nõ  
 dissimile: dulcius grossis, sine granis interio-  
 ribus. quod nõ maturescit, nisi ungue aut fer-  
 ro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria,  
 Rhodo, locisq; non multi tritici feracibus:  
 vbi prouentu fœcundo astibilibusq; iuuamen-  
 tum adfert, cum amonæ caritas premit. Gi-  
 gnitur & in Cypro arbor genere distas, quæ



cum sit vlmus, prædita tamen est foliis sycomorî, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis. Aegin. Sycomorî fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius. Liquor arboris vi pollet emolliendi, glutinatoria vulnerû, discussoria tumorû: bibitur inungiturq; ad serpētium morsus, lienes induratos, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores.

S I D E planta lacustris est in Orchomenio lacu frequēs, papaueri similis, roseo flore, vasculo mali amplitudine, cādidiis membranis obducto: semine intus rubro, gustu triticum æmulāte. Caput & folia super vndas emicāt, mox cum defloruit inclinatur in vadum, semēnque spargit. Plin. & Theo.

σίδηρι-

tis.

Herb. &  
off. tetra-  
hil, ou  
herbe Ju  
daice.

S I D E R I T I N aliqui heracleam vocant. folia habet marrubii, sed longiora, satis ad frondē quercus, aut saluiæ accedentia, minorā tamen, & aspera. caules edit quadratos, palmum sæpe excedentes, nō iniucundi gustus, aliquantūmq; substringentis, in quibus per interstitia orbiculatæ vertebrae, vt in marrubio, spectantur, & semen in eis nigrum, nascitur in petrosis. Illita folia, suapte vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt.

Lunaria  
maior

Altera sideritis binūm cubitorum, ramulis exilibus: folio filicis, numeroso, vtrinque per oras diuiso: pediculo longo, prodeuntibus ē summo alarum sinu surculis, longis, te-



nuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen cōtinetur, quàm beta rotundius aliquāto, ac durius. Huius vis, foliorūque, ad vulnera, præcipua est. Sideritim aliam esse tradunt, quam Crateuas heracleam vocat, in maceriis & vineis nascētem, foliis coriani, à radice numerosis: dodrantalibus cauliculis, lævibus, teneris, in rubore candicantibus: flore purpureo, paruo, gustanti amaro & lento. Huius ea vis est, vt quamvis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimit. Galenus, Habet quidem & abstergēs aliquid, sed amplius humidū & mediocriter frigidum, cum adstriptione pauca, hinc inflammationib⁹ resistit, vulnera glutinat. De Achillea sideriti alibi diximus.

Mille  
feuille

**SIDERITIS** Plinii latissimo folio in scoparia regia habetur.

**SILER** frutex est, qui nonnunquam arborescat, vt baculos rustici ex eo faciāt, in aquaticis nascens quasi pumila salix, cuius etiam generibus annumerari creditur. Eius folia illita fronti capitis dolores sedant. Semen tritū in oleo phthiriasis coërcet. Serpentes hunc fruticem refugunt, baculūque ob id ex eo rustici conficiunt.

Officina  
cōfundit  
cū seseli

**SYLIBON**, lata spina est, folia ferēs chamaeleonis albi. Hæc recēs cum sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus, vomitiones ciet. Aegineta, Succum

σὺλιβων

p ij



cum mulsâ bibendum adiicit.

ἄλυσκα.  
Arinca  
gallis  
olim

**H I D E M** generi filigo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit. in panes, ut zea, cogitur. Fit quoq; è filigine crassior farina, quâ Græci crimon vocitant. Galenus, Olyrae naturam inter triticum & hordeum est media, siue ut nutrimentum consideres, siue ut medicamentum.

κερατὼν.  
vica.

**S I L I Q V A E** fructus arboris ceratoniae siccandi & (Galen. astringendi) refrigerandi virtutis, nonnullius etiam dulcedinis particeps est. Aegineta.

σύνφυτον.

τον πετρίων.

τρεῖς.

Bugle, nō  
est Cōso  
lida me-  
dia offici-  
narum.

σύνφυτον.

τον ἐπεσον.

cōsouli-

de ou cō

syre

**S Y M P H Y T O N** petraeon, id est, alus. nascitur in petris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus: capitulis thymi: surculosum totum, odoratum, gustu dulce, saluā ciens: longa radice, subrufa, digitali crassitudine. carnes autē cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & alterum symphyton quod aliqui petraeon vocant: id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, ut sonchi inanem, circa quem breni interuacante spacio, folia exeunt angusta, linguæ bubulæ proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: foliis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei, & circa caulem velut verbasci semina emicant. ram caulis quam folia, aspera lanugine horret. tactūq; pruritus concitant. Radices demittuntur foris nigrae, in-



rus candidæ, viscosæ, quarū est vsus. Carnes quoque, si concoquantur, cogunt additæ. Aegineta, Petræum contrariis cōstat viribus. habet enim aliquid quod incidat, idēoque pus in thorace & pulmonibus collectum expurget, itēque renes. Habet etiam aliquam contrahendi virtutem, qua sanguinis excreationibus medeatur. conuulsis, ruptis, mulierum fluxionibus rubris, intestinorum ramicibus. Item calida quædā humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriæ asperitates sanat. Symphytum alterum viscosum quippiam & mordax repræsentat, scillæ simile. Vtuntur eo ad quæ superiori.

**SYPHONAM**, quam alij crumphenam, Fortē hęc Plinius repræsentat alternis viridibus roseisq; genesis per caulem foliis, eamque in posca sanguinē seu heleiicientibus mederi.

sia Gall.

**SINAPI** hortense, aliqui napi vocāt. Eli-  
gi debet adultū, valde rufum, nō magnopere  
ficum, sed quod fractum internē virescat, &  
veluti quodam succo madeat, cēsum colore.  
siquidem recēs id genus, tempestiuum habetur. Aeg. Cal. sic. 4.

νάπυ,

σίγηται.

Senece

σίσαρον.

**SISER** vulgò cognitum. Cuius radix decocta origrata est, & stomacho utilis, urinā seruire, ciet, & appetentiam inuitat. Aeg. Radix cal. ou escher  
2. (aliās enim perperam legitur. 3.)

Serulle

seruile,

ou escher

uille

**SISYMBRIVM**, alii serpillū syluestre  
vocant, in solo inculto nascitur, mēthæ hor-

σίσιμ

βριον



offic. na- tensis similitudine, odoratius, latiore folio.  
 sturcium Inscritur coronis. Alterum sifymbrii genus,  
 aquaticū quod aliqui cardaminam, alii sion appellāt,  
 vulg. cres ea herba riguis gaudet, & eisdē in locis qui-  
 son. bus sion prouenit. quæ ideo nonnullis carda-  
 mina nominatur, quòd gustu cardamum, id  
 est, nasturtium representet. folia primum  
 rotunda prodeunt. adulta erucæ modo fin-  
 duntur. Galenus, Sifymbrium est subtile, dis-  
 cutit, calefacit, siccatur 3. semen eius tenue cali-  
 dūmque est, vnde cum vino ad singultus &  
 tormina exhibetur. Cardamina vero arida  
 calefacit siccatur tertio. Viridis calefacit siccatur  
 secundo.

σιων. s i s o n exiguum semen est, in Syria na-  
 Menthe tum, apio simile, nigrum, feruens, oblon-  
 aquatiq̃ gum, quo in condimentis, cum cucurbita,  
 outhym- & aceto, indigenæ vtuntur. in cacumine gra-  
 bree ou nula multa gerit. Aegineta, Sinon calidus &  
 balsami subamarus est, vrinam mouet, concoctio-  
 ta. nem adiuuat, menses educit, & viscera ob-  
 structa aperit.

σιμλαξ. s i v m, quære Lauer.  
 s m i l a x à Græcis, taxus à Latinis  
 appellatur, arbor abietis magnitudine, & fo-  
 liorum eiusdem figura, in Italia & Narbo-  
 nensi Gallia Hispaniæ contermina nascens.  
 Auiculæ quæ Italicæ taxi baccas deuorant,  
 denigrantur: & qui ederint easdem homines,



alui profluuium corripuntur. Narbone tam  
præsentis est veneni, vt si qui dormiant sub  
ea, aut in eius vmbra subsideant, lædantur,  
& sæpenumero moriantur. quare de taxo  
hæc traduntur, vt ab ea caueamus. Aeginc-  
ta, Smilax, vel cactus arbor est virosæ virtu-  
tis. (Sed pro κακὸς malim legere τᾶφος.)

σμίλαξ

κηραιός

Hortensis S M I L A X, frutex, cuius se-  
men à nonnullis lobia vocatur. folia habet  
hederæ, molliora tamen: tenues caules, &  
capreolos vicinis fruticibus circumuolutos:  
qui tantum adolescunt, vt topiarias scenas  
repræsentare videantur. filiquas fœnigræci  
profert, longiores & torosiores. in quibus se-  
mina tenum similia, sed inæquali colore re-  
cluduntur: quæ quadam ex parte fuluescunt.  
Siliqua cocta, cū semine in oleribus, aspara-  
gi modo, estur. urinā ciet, & tumultuosa so-  
mnia facit. Vide plura in Phaselis.

σμίλαξ

πραχῆια

S M I L A X aspera, folia habet peri-  
clymeni: sarmenta tenuia, multa, rubi mo-  
do, aut paliuri aculeata. arbores scandit ab  
imo ad summa perreptans, se conuoluens  
eis. fert racemos exiles, qui maturi rubescūt,  
gustūque leniter mordent. nascitur in palu-  
stribus & asperis: radice dura, crassaque.

σμίλαξ

λεῖα.

Læuis S M I L A C I S folia hederæ similitu-  
dinē habent, molliora, læuiora, tenuiora. hu-  
ius sarmenta nullis horrent spinis. conuolui.



tur arboribus, vt prior. fructum parit lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tentoria cōtra æstus molestiam faciuntur. folia per autumnum decidua. Aegin. Milax tam læuis quàm aspera, arbores amplexa, calidam acrimque facultatem possidet.

σμύλα

vioy.

Leuechia  
ou liuef-  
che

S M Y R N I V N, quod in Cilicia petroseli nū vocāt, passim in Amano monte gignitur. caulem habet apij, & stolones multos: folia latiora, suppinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia, iucunda, colore in luteum languesciente. capitibus caulium orbiculatis, vt anethi. semine brassicæ, rotundo, nigro, acri, myrrhæ sapore, ita vt alterum alterius loco cedat. radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus atque squallidis, & limitibus terrenis. Aegineta, Quidam hipposelinum, quidam apium sylvestre nominant. Cal. sic. 3. apio duntaxat fortius, petroselino inualidius. vrinæ & mensibus educendis accommodatum.

σενήρος

καταίος.

Morelle

folatrum

Hortense S O L A N V M, frutex cibus idoneus, exilis, pusillius, multis concavus alis: folio nigro, maiore quàm ocimi, & latiore: folatrum fructu rotundo, viridi, qui post maturitatem



nigricat, aut fuluescit. herba innocentis gustus. Aeg. Astringit, & frigefacit secundo.

Est & aliud SOLANVM, quod peculiaz nomine halicacabon, id est, vesicariā, aut physalida vocāt, foliis antedicto latioribus. cuius caules, posteaquam adoleuerunt, pronā terram spectant, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, vesiculis simili, rotundo, laeui. quo coronarii vtuntur, & corollas faciunt. Vim vsumq; hertensis solani habet: verū cibis nequaquam expetitur. Aegineta, Vrinæ ciendæ idoneum fructum habet, acino vix æqualem.

SOLANVM manicon, aliqui persion, alii thryon appellauere. huic folium eruce simile, maius aliquanto, satis acantho, quem pæderota vocant, accedens. caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adolentes: caput in cacumine oliuæ figura, sed vt platani pilulæ, hirsutius, verum maius, latiúsque. florem nigrum. postquam eo exiit, racemus exit rotundius, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, vt vix mollibus. radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. gignitur in montibus vento perflatis, & plantanetis. Aegineta, Intus assumptū inutile est: à foris illitum vlcera depascentia curat. Frig. sic. 2.

SOLANVM somniferum, aliqui etiam

σενχρος  
αλικακ-  
καβος.  
offic. alca-  
quengi.  
rur. cocre-  
tum.

σενχρος  
μανικός.  
offic. sola-  
trū. mo-  
relle.

σενχρος  
υπνωτι-  
κός.



her. & of. halicacabon appellât, fruticat multis ramis,  
solatrum densis, caudicosis, fractu contumacibus, pin-  
dormito. guium foliorum, cotoneæq; mali similium  
riū ouma plenis: flore grandi rubro: fructu in follicu-  
rinum. lis crocato: radice longa, subrubro cortice ve-  
stita. nascitur in saxis, non procul à mari. A-  
gineta, Radicis cortex cū vino denarii pon-  
dere potus, somnum conciliat. Semen vrinā  
mouet, frig. 3. Vnde corymbi ei<sup>9</sup> plures duo-  
decim epoti, furorem accersunt.

σόμφος. S O M P H V S cucurbitæ genus sylvestris  
est, cui nomen, quia sit inanis, digitali crassi-  
tudine, non nisi in saxosis nascens.

σόνχος. S O N C H I duo genera. sylvestrior qui-  
Lacterōs dā est, & magis spinis horret. alter teneritate  
aliis pa- quadam mollescit, cibus expetitus, angulo-  
lais au lic so caule, inani, interdū rubente: foliis in am-  
ure. nō ē bitu per interualla dissectis. Alter sonchus  
hec scari- tenerior, arboris instar, latis constans foliis.  
ola offici caulē in ramos exeūtem folia distinguunt, sed  
narum. ad eadem pollet. Aegineta, Astringit & ma-  
nifestè refrigerat, tum corpori admotus, tū  
manducatus: exarefactus autem mediocri-  
ter calefacit.

δῶα. S O R B A colorem luteum referencia pri-  
Sorbe ou us quàm maturescant, dissecta & sole siccata  
corne. manduntur, vt aluum sistant. eadem est fun-  
ctio molitorum farinæ, si polentę loco suma-  
tur. quod & decoctū eorum in potu præstat.  
Aegineta, Sorbus arbor, cuius fructus oa, à



nonnullis  $\delta\upsilon\alpha$  dicitur, adstringendi vim obtinet, sed minorem mespilo.

SPANACIAM olus recentiores Græci  $\sigma\pi\alpha\nu\alpha\kappa\iota\alpha$  dixerunt, vt putant nonnulli ab oleris raritate: vel ab aliis (vt est simile vert) nationibus Spinage. emendicato spinaceo nomine.

SPARGANION, aliqui xiphidion vocant. folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia. in summo caule veluti pilulæ prominent, in quibus semen  $\sigma\pi\alpha\rho\gamma\acute{\alpha}\nu\iota\omicron\nu$ . off. spatula foetida Contra serpentis venena, radix cum vino datur. Aegineta. Vim habet exiccantem.

SPARTION frutex est, longas ferens  $\sigma\pi\alpha\rho\gamma\acute{\iota}\omicron\nu$  virgas, sine foliis, firmas, fractu contumaces, quibus vites vinciuntur: semen lenticulæ, in folliculis phasiolorum modo nascens: florē, vt albę violæ, luteum. Aeg. Sparti & semen & flos cum mulsā instar quinq; obolorum posita, per superiora purgant veratri modo sine periculo. Semen per inferiora quoque purgat. Virgulæ ipsius ad coxendicum dolores proficiunt.

SPHONDYLIVM folia quadam tenus  $\sigma\phi\omicron\nu\delta\upsilon\lambda\iota\omicron\nu$ . platani & panacis habet. caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, Panaiç fauluage. fefeli simile, sed latius, cãdidius, & magis paleaceū, grauis odoris. flores eius albi, aut pallescentes: radice raphani, candida. nascitur in palustribus & aquosis. Aegineta, Fructus eius



& radix virtute acri & incisoria suspiriosis, comitialibus, & arquatis succurrunt. Radix autem circumrasa, fistulisque imposita, illarum callos tollit. Succus è flore ipsius expressus antiquis aurium vlceribus instillatur.

SPINA acuta, vide Acuta spina.

ἄκανθα  
λευκή.

SPINA alba nascitur in montibus & syluosis, folia fert albi chamæleonis, angustiora, & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum. in cacumine capitulū inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu cnicū, sed rotundius. Aeg. Eius radix siccatur, & modicè astringit, eoque & stomachicis, & sanguinem expuentibus, dentiumque doloribus succurrit. Semen tenue calidumque est, hinc conuulsioni quoque medetur.

ἄκανθα  
ἄραβική.

Arabicam SPINAM natura albæ spinę similem esse cōstat. ipsa siquidem stringit ad sanguinis reiectiones, mēsum abundantia, cæterasque fluxiones radix etiamnum valet.

στάχυς.

Mōtana  
& mollis  
salua herba.  
nauicula, ou  
corona  
ria herba

Prouenit in asperis. Aeg. Aegyptia vel Arabica spina astringit, siccaturque impense, vnde sanguinem, & alias defluxiones retinet.

STACHYS frutex est marrubio similis, sed longior, folia ferēs numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures virgas ab radice exeuntes, marrubio can-



didiores. nascitur in mōtibus & asperis. Vim  
habet excafactoriam & acré. foliorum deco-  
ctum potu pellit menstrua & secundas. Aeg.  
Cal. 3. menses excitat, interimit foetus, secun-  
das pellit.

STAPHYLODENDROS arbor trans σταφύλῳ-  
δένδρου  
alpes simillima aceri, alba in materia, fert si-  
liquas, & in iis nucleos sapore nucis auella-  
næ. Plinius. (Sunt qui eandem Theophrasti  
colyceam interpretantur.)

STAPHIS agria, siue herba pedicularis, σταφίς ἀ-  
γρία.  
folia habet labruscæ diuisa: & cauliculos re-  
ctos, molles nigrōsque. fert florem glasti: & offic. sta-  
folliculos virides, similes ciceri, & in his nu- phis a-  
cleum triangulum, scabrum, ex nigro subful- gria.  
uescentem, intus album, gustu acrem. Aegi-  
neta, Acris adeò est vt pituitam per os edu-  
cat, & vehementer abstergat.

STYRAX lachryma est arboris malo co σύνραξ.  
toneæ similis. Præfertur sordescēs, flauus, resi offic. sto-  
nosus, albicātibus grumis, quàm plurimum rax & Ca  
in sua odoris gratia permanens. qui dū mol- lamītha.  
latur, melleum liquorem reddit, qualis è Ca-  
thaballis, Pissidia, & Cilicia deuehitur. Dete-  
rior niger, surfurosus, friabilis, canóque situ  
obductus. Cæterū lachryma inuenitur gum-  
miū similitudine, perlucida, & myrrhē emu-  
la. verum perpauca manat. Adulteratur ligni  
scoe, quam vermiculi erodentes excusserūt,  
melle, & iridis sedimēto, & quibusdam aliis.



Alii ceram aut adipem odoribus imbutum, fragrantissimis foliis cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua vermiculos exprimunt, venundantq;. Styra- cem hunc, quoniam in vermiculorum specie contrahatur, scoleciten cognominant, quem tanquam sincerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Aeg. Styrax calefacit, emollit, & cōcoquit. Tussi, destillationi in nares, & grauedini utilis. Menses idem potus appositusve trahit.

στοιβή

Non est  
vulg. sca-  
biofa.

STOEBAE semen & folia sic. 3. ordine, principio viribus donata astrictoris, eamq; ob causam vulnera magna conglutināt. Decoctum ipsorum intestinorum torminibus, sanguinis eruptionibus, auribus purulentis auxiliatur: folia illita oculis ex ictu suffusis conferunt.

στοχάς.

STOECHAS, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis è regione Massiliæ gignitur, vnde cognomētum accepit. herba tenuibus furculis, coma thymi, lōgiore folio, subamara gustu, & aliquantū acris. Aeg. Aperit, extenuat, detergit, & confirmat viscera omnia, totūmq; corporis habitum.

σπαρτωίνης

cumī, ou-  
aneth sau-  
uage, ali-  
is asini-  
nusdauc<sup>9</sup>

STRATIOTES millefolium exiguum frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit. foliis auicularū pennas imitantibus, bre-



ui admodum dissectoque foliorum exortu. folia sylvestre cuminum simulant, præsertim breuitate atq; scabritia, breuiora paulò, densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximii vsus ad vlcera vetera, recentiaque, profluentè sanguinem, & fistulas. Aeg. Astringit, vlcera committit: nonnulli eo & ad sanguinis eruptiones, & ad fistulas vtuntur.

STRATIOTES in aquis nascens, iisdè *στρατιώτης* supernatat, & sine radice viuit: vnde cognomentum traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia. Aegineta: Humidus & frigidus est natura.

STRUTHIVM in Radicula quære.

T

AXVM arborem habes in similem descriptam.

T

TELEPHIVM herba portulacæ *τηλεφίον* similis & caule & foliis, habes gemina tubercula, à singulis radicum geniculis enascètia, vineatica cula, à singulis radicum geniculis enascètia, sc̄puiua, à quibus rami seni septémve fruticant, à radice referti cœruleis foliis, crassis, lentis, carnosiss: flore luteo, aut cādido. Nascitur in culicis, & maximè inter vites. Tempore verno folia senis horis illita albam vitiliginem faciunt: sed postea hordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto etiā in sole vitiliginem. *vineatica, cicotri- nū, faba inuersa, crassula minor, aliis re- prinse.*



nem tollunt. sed vbi inaruerunt, absterguntur. Aeg. Cal. 1. sic. 2. Est itidem absterforiū, quapropter vlcibus putredinem expertis conuenit: & vitilignes, tum leucas, tum alphas cum aceto abolet.

τέρμιν-  
θος.

TEREBINTHVS cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadem ad quæ lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaque. Aegineta, Cal. 2. viridis sic. 1. aridus sic. 2. fructus vbi inaruerit sic. 3. hac igitur ratione & vrinam mouet, & lienes adiuuat.

TESTICVLVM herbam in Orchi quære.

τένκρion  
Nō est q̃  
vul. Tuh  
sa faba.

TEVCRION, siue vt aliis placet, teucris, herba est virgæ referens effigiem, trifaginis similitudine. tenui folio, non multum à ciceræ alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissadēmque; vbertim prouenit. Aegineta, Cal. 2. siccat 3. Vi incisoria tenuique lienis medetur.

θαλίερον  
Argentine

THALIETRON folia coriandri habet, pinguiora paulò: caulem rutæ, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricē perducunt. Nascitur maximè in cāpestribus. Aeg. Siccandi vim sine rosione habet. hinc vlcera inueterata cicatrice obducit.

θαψία.

THAPSIA nomen ideo accepit, quod in Tapso eiusdem nominis insula, primum inuenta sit. tota verò natura ferulæ similis est: gra-



est: graciliore caule: foliis fœniculi: umbella  
 anethi in cacumine, à singulis furculis erūpē  
 te, flore luteo. semē quale ferulæ, latū, sed ali-  
 quāto minus. radix foris nigra, intus cādida,  
 longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis ex-  
 trahēdi ratio hæc est: Facto in ambitu scrobe  
 cortices inciduntur: aut radix in fornicis spe-  
 ciē in se excauata, cooperitur, quo merus suc-  
 cus confluat. oportet illuc sequenti die se con-  
 ferre, & congestum succum extrahere. Tun-  
 ditur etiam radix in pila, & succus organo  
 per quallū expressus fictili crasso insolatur.  
 Aliqui folium vnā terunt: sed inualidior hu-  
 iusmodi succus. Hoc autem interest, quo-  
 niam qui ab radice manauit, grauius olet, &  
 humidus permanet: è foliis autem extractus,  
 exiccatur, atque teredinum iniuriam sentit.  
 Qui succū colligit, stare debet non obuersus  
 vēto, aut potius cū dies apricus est, & à flatu  
 silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies  
 vehementer intumescit, nudāq; corpora in-  
 uadunt pustulæ: ob id prius liquido cera-  
 to & astringente, nudas partes illinunt, & ita  
 muniti accedūt. Aegineta: Tapfia acris est,  
 & valenter cum humiditate calefacit: ex al-  
 to igitur trahit insigniter, attractūque dis-  
 cutit.

THE RIONARCA inde nomen inue-  
 nit, quod serpentibus torporem inferat. fru-  
 tex est foliis subherbaceis, roseo flore. Ser-  
 pentaria



pentes necat cuicumque admota fuerit.

θυμelaία  
oliuella,  
leo rerrq,  
ou lin sau  
uage.

**T H Y M E L A E A** est, qua granum gnidiū, quod est semen ipsius, colligitur. hoc Syri apolinum vocāt, quoniā satini lini frutex suapte natura, similitudinem referat. virgas edit perpulchras, multas, tenues, trepidancas: foliis chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gummosisq; si mordeantur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia virescit, & tandem rubescit: inuolucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinantur qui coccon gnidium fructū esse chamelææ existimant, decepti quadam foliorum similitudine. Aegineta: Thymelæa, vnde granum gnidium fit, similes ei vires obtinet. Habet autem granum id acrem & adurentem facultatem, aluum cum aqua potum purgat.

θύμος.  
Thyn.

**T H Y M V M** ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus foliis, multis & angustis circūdatus capitulis in cacumine, flore purpureo refertis. Gracili solo & petroso provenit. Aeg. Calefacit, siccatur. 3. Glutinosos crassosq; humores incidit.

θλάσπι.  
Seneuc  
sauuage  
herb. na-  
sturtiū te-  
storū.

**T H L A S P I**, herbula angustis foliis, digiti tali lōgitudine, in terrā versis, suppinguibus, in cacumine diuisis: binūm dodrantū cauliculo, tenui, non sine adnascētibus ramis. fructu circa ipsum totū, ab extremo in latius sa-



pandente: semine nasturtii incluso, lenticule  
 vasis effigie, nisi quod infringitur, vnde no-  
 men accepit. flos albicat. Nascitur in semi-  
 tis, & sepibus fossisque. Alterum thlaspi **Nō ē hęc**  
 tradit Crateuas, quod aliqui Persicon sinapi **bursa pa-**  
 vocant, latis foliis, radicibus magnis. vtile **storis.**  
 ischiadicorū infusioni. Aegineta: Thlaspi se-  
 men est viribus acre, intestinos abscessus po-  
 tu rumpit, menses prouocat. ab inferioribus  
 partibus iniectū, coxarum dolores finit, cruē-  
 ta vacuat. suprā infrāq; biliosa, instar aceta-  
 buli potum, expurgat.

**THVS** in ea gignitur Arabia, quæ thu- **λίβανός**  
 rifea cognominatur. Primatum tenet in eo **τός.**  
 genere masculum, stagonias appellatum, su- **Encent.**  
 apte natura rotundum. Tale autem indiui-  
 dum est, candidū cum frangitur, intus pin-  
 gue, in suffitu statim ardens. Indicū verò ful-  
 uescit, & colore liuet, sed rotūdum industria  
 facit. nā in quadrangulares formas disse-  
 ctum fistilibus versant, donec rotunditatem  
 contrahit. verum huiusmodi thus tempore  
 flauescit, quod atomum aut syagrum appel-  
 lant. Secundum locum habet Arabicum, &  
 in Smilo nascens, quod aliqui copiscum vo-  
 cant, minus multò & fuluius. Est & genus a-  
 liud, cui ammitæ cognomen est, alioqui can-  
 didū: quod dum mollitur, mastiches more di-  
 gitis cedit. Adulteratur in itinere, pini resina  
 & gummi. quod facile deprehendi potest.

q ii



siquidem suffitum gummi flammam nō eiaculatur, & resina in fumum evanescit, thus verò statim ardet. idem maleficium odor prodit.

λίβανω-  
τοῦ  
φλοιός.

Præfertur **THURIS** cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, lævis, minime scaber, sine mēbranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice. sed horum index ignis est. siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eruāt. thuris verò cortex ardet, & cū odoris fragrantia vaporem eiaculatur.

μάννα λε-  
βάρον.

**MANNA** thuris probatur candore micarum frequētia, & puritate. Vim habet eandē quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant. sed hæc igne deprehenduntur. Neq; enim æquē suffitu aëriū vaporē, sed fuliginosum & impurum expuit, & permistū suaueolentiæ halitus virus habet. Aegineta, Lachryma thuris calfacit secundo sic. 1. Habet & modicam quandam vim leuiter astringentem. Cortex ipsius manifestò astringit, & siccat 2. absolutē, crassior thure & minus acris: hinc sangninē spuētibus, dysentericis, coeliacis, & stomachicis, tum foris impositus, tū intro assumptus salutaris est. Surculus ipsius calefacit siccat 3. atque nonihil extergit: quocirca oculorum vlcera & purgat & explet.



**TILIA** Græcis philura dicitur, folio hederaceo, molliore, & in angulum acutiorem rotundiore & prolixiore, & in orbem lentè crispo atque serrato, flore tantisper dum calyculo continetur herbaceo, ubi emersi flauo: fructus magnitudine fabæ, similis acinis hederæ, in quo semen prætenue quantum atriplicis, omnibus animalibus ingratum, cum foliorum pabulo maximè ducatur, eorumq; mira dulcedine, quæ in cortice intelligitur. Materies maris dura, nodosa, odorati- or. (Theophrasto tamen foeminæ odorati- or.) ruffior, cortex quoque crassior, ac detra- ctus inflexibilis, nec semen fert aut florem ut foemina. Tilia vertit folium confecti sideris signum. Multi corticem commanducatū vul- neribus putant vtilissimum: folia trita asper- sa pedum tumori. Humor è medulla castrate arboris effluens capillum reddit capiti illitus, defluentemque continet.

**TYPHA** foliū edit cyperidi simile: cau- lem album, læuem, æquabilem: florem in ca- cumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculam aliqui nominant. Huius herbæ flos, suillo adipe eloto exce- ptus, ambustis medetur. Gignitur in palustri- bus & aquis stagnantibus. Galenus & Aegi- neta non meminerunt.

**TYPHA** vel tipha cerealis specie filigi- ni non dissimilis, simplici culmo assurgens,

φιλύρα  
Tilet, Ti  
leul, teil.

τύφη, vel  
τίφη.  
Masses.

τύφη σι-  
τώδης.



grano multiplici, tunica velato atq; leuissimmo, radice numerosa, tritico perquam similis traditur, & in id quoq; mutari si pista setur, nec protinus, sed anno tertio.

τιθυμάλιοι.

Esurge.

Reueille  
matin.

χαρῳίας

μυρσινό

τρεῖς

παράλιος

TITHYMALI genera septem, quorum masculus characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides. Alter myrtites, qui foemina existimatur, cumque myrsiniten, aut caryiten vocant. Tertius, paralius, quem tithymalida appellarunt. Alius, helioscopius. Quintus, cyparissias. Sextus, dendroides. Septimus, platyphyllos dicitur. Characiae caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo atque acri madentes: foliis olivae circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa. pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua caueolae foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur. nascitur in asperis & montibus. Foemina, quam myrsiniten, aut caryiten vocarunt, similis suapte natura daphnoidi: foliis myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantaes. fructum fert alternis annis nuci similem, mordaci gustu. nascitur in asperis. Aliud tithymali genus dicitur paralius, quem tithymalida, aut mecona aliqui appellauere. nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum altis, quinque sive a radice exeuntibus: foliis lini, angustis,



paruis, oblongis, in versus quosdam dige-  
stis: capite in cacumine orbiculato, in quo  
semen, ut eruum, vario colore emicat. Flos  
albus. Frutex totus cum radice lacteo succo  
surget. similes ad usus reconditur. Heliosco. *ἡλίσκος*;  
pius dicitur, foliis potulacæ, tenuioribus, ro- *πιος*.  
tundioribusque: ramulis, prodeuntibus à ra-  
dice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodran-  
tali altitudine, tenuibus, lactis copiosi ple-  
nis: capite anethi: semine velut in capitulis  
incluso. Helioscopi nomē accepit, quoniam  
comas cum sole circumagat. circa oppida na-  
scitur, potissimum in ruderibus. Colligitur  
succus semenque, ut aliorum. Eadem quæ su-  
perioribus vires, non tamen usque adeo validæ.

Cyparissias in caulem exit dodrantalem, *κυνπρίσ*  
vel maiorem, subrubrum: ex quo folia piceæ *σκες*.  
similitudine exoriuntur, molliora tamen, &  
tenuiora: & in totum nascentē piceam æmu-  
latur, unde nomen traxit. candido succo ma-  
det, cui eadem vis quæ superioribus.

In petris nascens, dendroides cognomina- *πτερο-*  
tur, ampliter opacat. in cacumine fródosam *φυής,*  
spargens comam, succo lacteo pregnans, can- *δινδρεα-*  
ticulis rubentibus: foliis myrti tenuioris: fru- *δής.*  
ctu characiæ. Eiusdem effectus, cuius supe-  
riores, similique modo reconditur.

Platyphyllos, verbasco similis est. Radix, *πλατύ-*  
succus & folia per inferna trahunt aquas. Pi- *φυλλος.*  
scæ necat, tusus, & aquæ inspersus. Reli-



qua tithymalorum genera quę suprà scribuntur, idem efficiunt. Aegineta, Tithymali omnes cal. 4. acrimonię, & validę amaritudinis participes, sed radix quum sit quodammodo imbecillior, aceto incocta dentiũ erosorum dolores finit. Liquores vehemētiore donati virtute dentium cauis imponuntur, reliquũ corpus si attingant, adurunt. Quare etiã pilos modicę delitos auferunt, item myrmecias, verrucas, & huius generis alia. Cutis labe abstergunt, maligna vlcera phagedenica curant. Cæterum ex septenario ipsorum numero validissimi sunt appellati, characias, myrsinites, & qui in petris arboris modo nascitur. hos sequitur qui verbasco similis est, & cyparissias, deinde paralius, quasi dicas maritimus, postremo helioscopius.

τραγαν-  
κάνθα.

TRAGACANTHAE radix latã & lignosa, summo cespite nititur, vnde furculos humiles, robustos, latissimę fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquã tenuia exoriuntur, quę sub se spinas albas, rectas & firmas occulunt. Est etiamnum tragacantha, lachryma quę vulnerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, lævis, syncera & subdulcis. Aegineta, Tragacantha per similes gummi representat.

τραγιον.

TRAGIVM nascitur in creta tantum insula, lentisco semine, folio & ramis simile, singulis tamen minoribus. succus ei lacteus,



gummi non dissimilis. Est & alterū tragiū, Bursa pa-  
quod tragoceros aliqui vocant, folia scolo- storis esse  
pendrij habet, & radicem sylvestris rapha videtur  
ni, tenuem, candidam. Aeg. Tragiū cal. 3. at-  
trahit, discutit, cum tenui substantia. Aculos  
igitur educit, calculos comminuit, mensesq;  
citāt instar denarii potum. Sed alterū tragiū  
hoc minus (lego enim non *πικρότρονον*, sed  
*μικρότρονον*, ē Galeno) scolopendrio assimi-  
le, nascitur multis in locis, tanta astringendi  
virtute præditū, vt fluidis affectibus commo-  
dē faciat.

TRAGOPOGON, id est, hirci barbula. *τραγοπό-  
γων.*  
Nascitur in aruis sua sponte. Radice longa, *Herbape-  
tra.*  
dulci, folio croci, lōgiore, caule paruo, super  
quem calyx latus, & barbula quę summo ver-  
tice incana & proluxa funditur, vnde nomen  
accepit. Herba edendo est, flore luteo. (Quę  
vero altilis in hortis crescit, folio est latiuscu-  
lo, flore purpureo. Radices in altū agit, quę  
hybernis diebus acetaria dulcedine sua com-  
mendant.) (Apud Galenum ladanum quo-  
que *ἀπὸ τραγοπόγων* vocatur, quia colligitur  
ab hircorum barbis.) Quantum hirci barbu-  
la à senili distet, ex eius in gerontopogone  
descriptione colligitur.) Aegineta non recē-  
suit. (Est etiam superius descripta in hirci bar-  
bula.) *τραγορί-  
γων.*

TRAGORIGANVM tenuis frutex est, Mastichi  
syuestri serpillio aut origano similis, folio & na.



ramulis. quibusdam in locis lætius virentiſſ-  
que inuenitur, & latioribus foliis, ſatis glutin-  
oſum, alterum exilibus ſurculis, ac tenuibus  
foliis, quod aliqui praſium vocauere. Opti-  
mum eſt Cilicium, & Cretenſe, & Smyrneū,  
& in Chio Cooque proueniens. Aegineta,  
Origani virtutes habet, & nonnullam etiam  
aſtriſtionem.

τράγος  
τῶνδης.

**T R A G O S** quandam halicæ frugis figurā  
gerit multo minus quā zea nutrit, q̄ multū  
aceris habeat. quare ægrius cōficitur, aluūm-  
que magis emollit.

τράγος.  
Herb. iū-  
cus mari-  
nus

Eſt etiam herba **T R A G O S**, quam aliqui  
ſcorpion aut traganon vocāt, maximè in ma-  
ritimis naſcēs, palmum alta, aut amplior, fru-  
ticofa, humilis, oblonga, ſine foliis, puſillis  
circa ramos acinis, ruſis, multis, magnitudi-  
ne tritici acuto cacumine, guſtu multū aſtrin-  
gente. (Confer hāc ad ſcorpium ſiue nepam  
Plinii, ſuprà nobis commemoratam, & ean-  
dem exiſtimabis.)

τρίβολος.  
Chaulce  
treppeou  
calcetrep  
pe.

**T R I B V L I** genus vnum terreſtre, foliis  
ad effigiem portulacæ, tenuioribus viticulis,  
in terra ſtratis. ſpinis ſecundum folia rigidis,  
præduris. iuxta amnes & rudera naſcitur.

Treufle,  
ou cha-  
ſtaignes  
aquati-  
ques.

Eſt & alterum genus, aquis familiare, quod  
in fluminibus natum comam exerit, aculeos  
condens: foliis latis, & pediculo longo. caule  
parte ſumma quā ima craſſiori. capillamē-  
ta quædam indidem exorta ſpicantur. ſemen



durum, ab altero non abhorres. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virenti tribulo equos saginat, & è dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt. Aeg. Aquaticus mediocriter refrigerat: terrestris autem siccando valentior est, alter etiam humectat leuiter. Vterque contra inflammationum generationes, omnesque influxus conuenit. Terrestris fructus cum tenuis existat renum calculos conterit. Trichomanes, in fidicula descriptum est.

TRIFOLIUM, Græci triphyllon, alii *τριφυλλον* oxy triphyllon, alii menyantes, alii asphal. *λόν*. *Treuffle.* tion vocant. frutex supra cubiti altitudinem *herb. tri-* attollitur, virgas habens tenues, iunceas & ni *foliū aci-* gras, vnde ramulares enascuntur appendicu *dū. vulg.* læ, in quibus terna singulis germinationibus *pain de* exeunt folia, loto arbori similia. iis recenter *cucule* enatis rutæ odor inest. vbi autem adoleuerunt, *offi. alle-* bitumen olent. floré ædit purpureum, semen *luya* quadam tenuis latū, subhirsutū, ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculū gerēs. radix tenuis, longa, valida. Gal. Trifolium, asphaltiū & oxytriphyllon appellatur, ob res quas ei contigisse apparet. Menyāthes autem & cnicion haud scio vnde. Vis eius est calida & sicca instar bituminis, cuius odorem imitatur. Vtrūq; vero præstat abscessu tertio, ideóq; laterum ex obstructione dolores potu iuuat, vrinas ac menses ducit.



τριπό-  
λιον.  
Curbit

TRIPOLIVM in marinis nascitur locis, quæ allidit vnda, recedensq; dimittit, neque in mari, neque in sicco: folio glasti crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius vt tradunt, flores colorem ter die mutât, mane cãdidi, meridie purpurei, sero punicei cõspiciũtur. radice alba, odorata, calidi gustus. Aeg. Radix eius cal. 3. acris est.

χαμαι-  
δρύς.  
Chesnet-  
te & ferra  
tula ou-  
german-  
dree

CHAMAEDRYΣ Græcis, aliis chamædrops, Latinis trisago dicitur. sunt qui eam teucrion appellauere, propter eam quã cum teucurio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis. frutex dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnaus. Aeg. Cal. sic. 3. Lienes igitur consumit, vrinas & menstrua elicit, viscerum obstructions expurgat.

πυρήν.

TRITICVM cal. i. medium inter sic. & humid. nonnihil etiã glutinosum & obstruendi efficax obtinet. Elixum coctu difficile est, & inflationes creat: concoctum tamẽ alimentum præbet valentissimum. in panẽ autem coactũ, minus inflat, minúsq; ægrè concoquitur, vtpote fermenti & salis particeps.

TVBERA rotundæ radices sunt, sine caule, sine foliis flauescentes. vere fodiuntur. cruda & cocta eduntur. Aegineta, Terrestris constant substantia cum modica quadam virtute tenui.



**T V S S I L A G I N I** folia sunt maiuscula *θύχιον.*  
quàm hederæ, sex aut septem à radice, subal offic. &  
bida à terra, supernè virentia, in plures angu herb. vn̄  
los exeuntia: caulis palmū altus, flos luteus. gula ca  
in vere, flore & caule cōfestim exuitur. inde ballina,  
nonnulli his vacare existimauerūt. radix te- & vulg.  
nuis est & superuacua. nascitur in amœnis & pata equi  
riguis. Aegin. Iuuat tusses suffitu, & recta cer- na.  
uice spirantes. Constat ex calida aquosaque  
substantia.

## V

**V** **E N E R I S** pecten herba repræ- off. herb.  
sentatur radice candida, colicu rura, ra-  
lis semipedē altis, aut paulo ma stellū ou  
ioribus, foliis pastinacæ, sed tenuioribus, flo falcetum  
re albo, exili, depēdentibus summatim com-  
pluribus rostellis, in mucronem turbinatis,  
& pectinatim inter se disjunctis, inde nomē.  
Radix cum malua tusa, omnia corpori infi-  
xa extrahit.

**H E L L E B O R V M** album, Latini vera. *ἡλίβο-  
trum album vocāt, fert folia plantaginis aut πορ λευ-  
betę syluestris similia, sed breuiora, & nigri- κός.  
ora, rubescētia: caulem cauum, quadrantalē, verart ou  
tunicis conuolutum cum arescere cœpit. radī ellebore  
cibus nititur multis, tenuibus, ab oblōgo & blane.  
exiguo capite exeuntibus, ceparum modo  
fibratis. nascitur in montibus & asperis. radi-  
ces messibus colligendæ. Optimum habetur*



candidum, friabile, carnosum, modicè exten-  
tum, nec tamen iunci modo mucronatum,  
quod frangēdo puluerem emittit, & tenuem  
habet medullam, gustu non admodum fer-  
uens, neq; saluam subinde ciēs. huiuscemodi  
autem strangulat. primatum Cyrenaicum te-  
net. Galaticum autem & Cappadociciū, can-  
didiora & puluere quodā obfita, celerius strā-  
gulatus mouent.

ἑλλεβο-  
ρος μέλας  
Allebore  
noir

HELLEBORVM nigrum, appellatur  
melampodion, quoniam caprarum pastor,  
nomine Melampus, furentes in se Prætidæ,  
primus purgasse & sanasse fertur. folia ei viri-  
dia, platani similia, minora, foliis sphondylii  
proxima, subaspera, nigriora, pluribus diui-  
suris incisa: capillis asperis: flores purpurei, can-  
didi, racematim cohærentes: semen cnici,  
quod in Anticyra fesamoides vocāt: quo de-  
iectiones moliuntur. radicibus coheret nigris,  
tenuibus, à capitulo cepæ simili confibratis.  
quarum est vsus. in collibus, asperis, & sitien-  
tibus locis enascitur. Optimum est quod ex  
huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Ni-  
grum inibi probatissimū gignitur. Eligi de-  
bet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit  
medulla, acre gustu, feruensque: cuiusmodi  
est in Helicone, Parnaso, & Actolia natum.  
attamen Heliconium præcellit. Aegin. Vera-  
trum vtrunque cal. sic. 3. item acre est abster-  
sorium, vnde etiam ad leprosa cutis vitia cō-



uenit. Nigrū vero si fistulis inferatur, tribus diebus callum exierit.

VERBASCUM differentias summas habet duas, hoc nigrum, illud albū. in quo mas & foemina intelligitur. Foeminæ igitur folia sunt brassicæ pilosiora multo, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior: subhirsutus: flores albi, aut ex luteo pallefcētes: semen nigrū radix lōga, gustu acerba, crassitudine digiti: nascitur in cāpestribus. Verbasum, qui mas appellatur, oblongius, albis foliis, & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latiorēq; cōstaret folio. Syluestre, folia fert salua, altas virgas & lignosas, & circa eas ramulos quales marrubiū: flores luteos, auri æmulos. Sunt & phlomidēs duæ, hirsutæ, rotundis foliis humiles. Tertia lychnitis appellatur, ab aliis autem thryallis, foliis ternis aut quaternis, vel paulò pluribus, asperis, crassis, pinguibusq;: apta ad lucernarum lumina. Aeg. Verbasci genera plura sunt, inter quæ est & dicta thryallis. Cæterum folia omniū siccātem & mediocriter astringentiam vim referunt, præcipuè eius quod aurei coloris est, & acerbū: fluidis conferunt affectibus. nonnulli & dentes eis colluunt.

VERBENACA. vide Peristercon.

VERBENACAE genus alterum. vide Særa herba.

φλόμος  
Boulion  
off. taxus  
barbatus



VIBURNI mentionem fecit Virgilius,  
quantum lenta solent inter viburna cu-  
pressi.

VIOLA flammea in Scopa regia con-  
tingitur.

Ἰονμείλαν VIOLEA purpurea foliū habet hedera mi-  
Violette nus, tenuius ac nigrius, nec multo dissimile.  
de mars cauliculus à radice medius prodit, in quo flo-  
sculus, suauiter olens, purpureus. opacis & a-  
speris nascitur. Aeg. Violæ folia aquea frigi-  
daque substantia præpollenti constant.

Ἰξός. VISCVM optimum est recens, intus por-  
Du gluy raceum, extrà fuluum, quod asperi nihil, aut  
furfurosi conceperit. Fit acinis in robore na-  
scentibus, buxco fruticis folio. contusum aci-  
num lauant, & postea in aqua decoquūt. sunt  
qui commanducando ipsum efficiant. gigni-  
tur quoque in malo, pyro & plerisq; aliis ar-  
boribus, quin etiam inuenitur in quorūdam  
fruticum radicibus. Aegineta. Calefacit cum  
acrimonia, humores ex alto validè elicit, &  
thapsiæ modo discutit, hac tamen multo est  
ignauius.

ἄγνος. VITEX, siue lygos, frutex est in arborē  
Herb. assurgēs, nascitur in fluminum ripis, asperis-  
agnus ca que locis, ac torrentium alueis. ramos gerit  
stus. prælongos, fractu peruiaces: folia oliuæ, sed  
molliora. Duo genera eius. vna harū album  
floreem mittit, cum purpureo: altera tantum  
purpureum, & semen, vt piper. Aegin. Agnus



calefacit, siccatur tertio. Substantia tenuis est, eoque flatus abolet. Ad castitatem conservandam conferre creditur, non modò comman- ducatus potúsque, verumetiã in cubile sub- stratus. Semen ipsius iecori lienique obstru- ctis succurrit. Fructus vitex minus inflat, & fa- cile digeritur.

VITEM albam aliqui bryoniam vocat. ἀμπέλως. Folis, viticulis, pampinisque, sativam vitem λευκή. imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. ea quos offic. & prope se nacta sit frutices, suis claviculis com herb. bry- plectitur. fructus rubés in vva dependet, quo onia & vi- coria pilis spoliatur. Ex ea asparagi, qui pri tis alba. ma germinatione exeūt, decocti in cibo, al- vulgo uum & urinam ciēt. Succus è radice vere ex- couleu- primitur. Aegin. Appellāt & psilothium. ger uree. mina sanè ceu stomacho grata eduntur, vri- nãq; ciendæ sunt. radix abstergit, tenuis na- turæ, mediocriter calida, vnde fit vi lienes e- tiam potu consumat, extrinsecus autem cum ficis illita scabiei & lepræ medetur.

Nigra vitis, quam aliqui nigrã bryoniam ἀμπέλως. vocant, folia fert hederæ, sed maiora, smila- μέλαινα. ceis proxima: caules etiam cognatos. capreo- Tamarū lis suis arbores, quasi adminicula, comprehē- ou hou- dit. fructus racematim coherēt, qui inter prin blon cipia virent, & post maturitatem nigrescunt. radix foris nigra, intus bux eo colore nitet. viticulæ, quæ primo germinum partu etum- punt, in olera recipiuntur. Aegin. Hæc etiam



bryonia appellatur: superiori consimilis est, sed inefficacior.

**ἄμπλος** **ἄγρία.** **Vigne** **sauuage** **viorne ou** **hardie**  
**VITIS** sylvestris sarmenta vitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, foliis hortensis solani, longioribus ac latioribus: muscoso flore, & capillaceo, fructu exiguis vuis simili, post maturitatem rubete. rotunda est acinorum facies. Enascētes viticulæ cibi gratia sale cōdiuntur.

**ἄμπλος** **VITIS** sativæ facultas respondet sylvestri, sed imbecillior est.

**πτελέα.** **Orme.** **VLMS** siccare valet, & abstergere, vulnera glutinare: præcipuè cortex, si recens fasciolæ modò vulneribus circūdetur: idem cū aceto lepras tollit. Ossā fracta radicū decocto perfusa, solidantur.

**κοτυλη.** **δών.** **offi. Vm.** **bilicus** **veneris**  
**COTYLEDON**, siue umbilicus Veneris folio est in acetabuli formā tornato, ineuidenter cōcauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotūda.

**κοτυλη.** **δών.** **ἰτί-** **σα.**  
 Est & alterum genus eiusdem, cymbalion aliqui vocant, pinguibus foliis, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem mediū oculi ambitū describētibus vt in maiore semper uiuo, astringentis gustus. cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadem quæ semperuiuum. Aeg. Refrigerat, repellit, abstergit, & dissipat. folia ipsius cum radice commāducata calculos comminuere, & vrinam ciere creduntur.



Duo VRTICAE genera. sylvestris, aspe- ἄκαλήφῃ  
rior, latioribus nigrioribúsq; foliis: semine Vrtic  
lini, sed minore. altera non æquè aspera, mi-  
nuto semine. Aeg. Vrticæ & fructus & folia  
tenuem habet substantiam, citràque rosionē  
ficcant, tumores discutiunt, abstergunt, ven-  
trem subducunt, mediocriter flatulenta, qua-  
re etiam ad Venerem incitant. (Aeg.

V V A passa cōcoquit, astringit. leuiter dis- ἀσαφίς.  
cutit.

## X

ANTHIVM nascitur leto & pin Herb. lap  
X gui solo & lacubus exiccatis, cau- pa minor  
le cubitali, anguloso, pingui, pro- aut inuer  
deutibus ex eo crebris alis. folia atriplicis ha- sa.  
bet, insecta, nasturtium odore imitantia: fru-  
ctum grandis oliuæ modo, rotundum, & ut  
platani pilula, spinosum, qui contactu vesti-  
bus adhærescit. Aeg. Xanthiū, phasganiūm- ξάνθιον,  
ve fructum fert discutientem.

XYLON, quem aliqui gossipion nomi-  
nāt, frutex est exiguus, laniger, palmæ folio, ξύλον.  
similem barbatae nuci gignens fructū, cuius cottonū  
in exteriori bombyce lanugo netur in linum ou cotton  
candidissimū mollissimūmq;. Gignitur & in  
quadam arbore, cuius folia ni maiora essent,  
vitium planè poterāt videri, cucurbitis coto-  
nei mali amplitudine, quæ maturitate osten-  
dūt lanuginis pilas, ex quibus vestes precio-  
so linteo textūt. Theophrast. lanigeras Indiæ



arbores demonstrat mori folio, corpore autē cynorrhodi. foliorum succus medetur infantiū torminibus, semen tussi & pectoris vitiis. oleo eius emaculantur lentigines.

*Supis.*

*offic. &*

*herb. iris*

*sylyestris*

*sur. glau*

*faulnage*

**X Y R I S**, folia habet iridis, latiora & in turbinem mucronata: quorum medio caulis erūpit crassus, cubitalis, ex quo siliquæ triangulares pendēt, in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis, simile fabis: rotundum, rubrum, acre: radix lōga, geniculata, rufa. Aeg. Xiris. aut xyris, naturæ tenuis est, discussoriæ & extrahentis, ac nimirum siccatoriæ, præcipue semen, quod & vrinam cit, & lieni indurato medetur.

**Z**

*Exdovex*

*offic. &*

*med. ze-*

*doaria*

**Z**

**A D V R A**, aliis ziduara, radix est teres, aristolochiæ nō absimilis, sapore & colore gingiberis. Hāc ad nos India mittit. Cal. sic. 2. Corpus latiore sagina reficit, flatus discutit. graue virus animæ quod alliū, cepa, vel vinum excitauit, abigit. venenatis moribus opitulatur. Crassiorē ventris spiritū digerit: aliū retinet, abscessus vteri soluit: vomitiones cohibet, & colicos mulcet cruciatus (Nunc ferè nostræ ætatis medici contra pestilentis cœli contagia vtuntur.

*Exz.*

*ispeltre*

**Z A R N A B V M**, vel zarnabadium, est Arnabo.

**Z E A** duorū generum est. vna simplex, altera in geminis putaminib⁹ grana bina iun-



Et gerit. ob id dicoccos appellat. plus quam hordeū alit. ori grata. digeritur in panificia, winus quam triticum alens. Aeg. Zea tritico viribus respondet, medium inter calorem & siccitatem obtinens, leuiter exiccat, nec non obstruit.

ZIZIPHA Pampinius Italiae primus inuexit, baccis similia quam malis, & intacta iam syluae ascendunt, flore oleae, sed odorato magis, corni baccis simile pomum. Quo amplius & maturius, eo innocentius, cū alioqui difficile perficiatur, & lienem offendat. itaq; decocto potius vtendum cēsent. Aedescina vocant quam grādiffima, calore & humore temperata, teste Aetio: idē sanguinis acrimoniam edomant, probum succum creant, serosum sanguinis humorem eliciunt. Decoctum eorum tussim & difficultatem spirandi lenit: pectori, renibus vesicae prodest. Vomitionem acri concitatam humore sedant. Serica ea vocat Galenus, parui succi poma, nec concoctioni, nec stomacho facilia. Nanque, vt idē testatur, insolentibus & effrenatis pueris & mulieribus cibi gratia tantum expetuntur, exiguumque praebent alimentum. Rutilum & album ziziphum probatissimum ad apum pastiones Columella scripsit.

ξίζιφα  
off. iuu-  
bes ou-  
guindo-  
les.

PLANTARVM HISTORIAE  
F I N I S.



PARISIIS  
EXCVDEBAT IOANNES LODOI-  
CVS TILLETANVS.

M. D. XII.



